TELEPROMPTER · Aula #11 — Via aérea: competência de toda a Odontologia

0 · Olho no olho — câmera aberta, sem slide (00:00–03:00)

Bom dia. Na Aula #10, falamos sobre o planejamento estratégico para 2027. O link está na descrição.

Hoje eu começo por uma cena de ontem.

Sedei um paciente para a manutenção das próteses protocolo sobre implante. Na indicação, o nosso olhar estava voltado para quatro variáveis: a complexidade do procedimento, o tempo de duração, o comprometimento sistêmico e o grau de ansiedade.

O procedimento era simples, com cerca de quarenta minutos. Mas o paciente era ASA III e extremamente ansioso. Simples para o procedimento, não para o paciente.

E esse paciente é cada vez mais o nosso paciente: Kishimoto e colaboradores, em 2023, mostraram que, com o envelhecimento da população, cresce o número de hipertensos e diabéticos que desenvolvem emergências na cadeira odontológica.

Eu revisava o checklist, item por item, para gravar e entregar a vocês. Um checklist não é burocracia. Zouaidi e colaboradores revisaram, em 2024, o seu uso na Odontologia: em cinco de seis estudos, os incidentes diminuíram.

Posicionei o estetoscópio pré-traqueal. O paciente fez uma pausa na respiração. Muito breve. E, antes de qualquer pensamento, as minhas mãos já estavam aspirando, revisando secreção, protegendo a via aérea.

Não foi por acaso que o estetoscópio me avisou primeiro. Boriosi e colaboradores, em 2019, mostraram que ele é o primeiro monitor a perceber o evento adverso em 64% dos casos. O oxímetro, em apenas 15%.

(pausa)

Eu não decidi fazer aquilo. Eu simplesmente fiz. E me perguntei: em que momento esse gesto se tornou automático em mim?

A resposta tem nome: treino. No estudo de Manton e colaboradores, de 2021, todos os profissionais treinados com simulação foram aprovados no exame prático. Entre os que tiveram apenas aulas expositivas, nenhum.

(pausa)

E eu voltei no tempo. Ano 2000. Eu tinha acabado de concluir uma certificação em Suporte Básico de Vida e já carregava mais de quinze anos de Odontologia. Foi ali que me fiz a pergunta mais desconfortável da minha carreira:

como eu nunca tinha percebido os riscos que nós mesmos provocamos na nossa rotina?

E eu não estava sozinha. Em 2014, Stafuzza e colaboradores encontraram, num hospital da USP, 87% dos dentistas treinados em Suporte Básico de Vida, mas só 43% seguros para executar as manobras. Quatro anos antes, Arsati e colaboradores já mostravam que apenas 41% dos dentistas brasileiros se julgam capazes de diagnosticar a causa de uma emergência.

Treinados, mas não preparados.

(pausa)

É dessa distância que trata a aula de hoje.

Tudo o que eu trouxer está ancorado na literatura, e todas as referências estão na descrição desta aula.

1 · Capa (03:00–03:20)

[Slide 1 — Capa]

Esta é a Aula #11 do Projeto Cultura de Segurança. E o tema de hoje é uma premissa: a via aérea é competência de toda a Odontologia. Para entender por quê, eu vou montar com vocês um dominó de cinco peças.

2 · O efeito dominó (03:20–05:00)

[Slide 2 — O efeito dominó]

O risco na cadeira odontológica se comporta como um efeito dominó.

Quando eu não afiro os sinais vitais, o estresse do meu paciente fica invisível. Esse estresse me leva a usar mais anestésico local. O excesso de anestésico pode

excitar ou deprimir o sistema nervoso central, e daí vêm a convulsão, a crise hipertensiva ou hipotensiva, a taquicardia, a bradicardia. Um paciente em crise pode engasgar, aspirar um corpo estranho ou perder a proteção da própria via aérea. E, em poucos segundos, a consulta de rotina se transforma em deterioração clínica.

As duas pontas desse dominó estão documentadas. Atherton e colaboradores ouviram, em 1999, clínicos gerais britânicos: as duas emergências mais frequentes foram a convulsão e o corpo estranho deglutido. E Fukayama e Yagiela, em 2006, lembram que a monitorização permite enxergar as tendências antes que a emergência se instale.

(pausa)

Repare em cada peça. Nenhuma delas é sedação. Este efeito dominó está na rotina clínica de toda a Odontologia.

3 · Peça 1 · Sinais vitais e estresse (05:00–06:15)

[Slide 3 — Peça 1 · Sinais vitais e estresse]

A primeira peça tem nome: adrenalina. E não é só a do tubete.

Taggart e colaboradores mediram, ainda em 1976, a adrenalina plasmática de pacientes durante o atendimento odontológico. Ela sobe, elevada pela carga emocional. É o estresse que eu não enxergo quando não afiro os sinais vitais.

E o que reduz essa resposta? A anestesia eficaz. Cioffi e colaboradores, em 1985, mostraram que, alcançada uma anestesia local adequada, a resposta simpática é mínima. E Niwa e colaboradores, em 2000, fizeram uma comparação que surpreende: dois tubetes com adrenalina produziram um efeito hemodinâmico menor que o de uma caminhada leve.

Ou seja: o problema raramente é o tubete bem indicado. O problema é a dor e o medo que eu não controlei.

4 · Peça 2 · Uso irracional de anestésico local (06:15–08:15)

[Slide 4 — Peça 2 · Uso irracional de anestésico local]

E é aqui que cai a segunda peça: o uso irracional de anestésico local.

O limite fundamental é o do sal anestésico, e não o da adrenalina. Cannell já propunha, em 1996, que o limite de segurança se baseasse no nível circulante do anestésico, e não na adrenalina do volume injetado. Para a lidocaína com adrenalina e para a articaína, Ucer e colaboradores, em 2026, reafirmam a dose máxima de 7 miligramas por quilo.

No paciente ASA II, coexistem dois limites. O primeiro é a dose máxima do sal, reduzida e individualizada, porque fatores do próprio paciente diminuem o limiar tóxico efetivo. E lembrem: a articaína 4% contém o dobro de sal por tubete. O segundo é a dose máxima de adrenalina. Na cardiopatia controlada, 0,04 miligrama, cerca de 2,2 tubetes de 1:100.000 ou 4,4 de 1:200.000, como calcularam Hashemi e colaboradores em 2016. A revisão sistemática de Seminario-Amez e colaboradores, de 2021, confirma: um a dois tubetes nos hipertensos e coronariopatas controlados. Prevalece sempre o limite mais restritivo.

(pausa)

E um alerta. A ausência de vasoconstritor não amplia a dose máxima. O limite passa a depender exclusivamente do sal e tende a ser atingido precocemente. Na metanálise de Guimaraes e colaboradores, de 2021, os cardiopatas anestesiados sem vasoconstritor tiveram mais dor e mais sangramento. E a mepivacaína 3%, segundo Chin e colaboradores, tem toxicidade por volume cerca de uma vez e meia superior. Menor eficácia significa mais volume e, de novo, mais adrenalina endógena.

5 · O cenário clínico (08:15–09:30)

[Slide 5 — O cenário clínico]

Agora, imagine a cena.

Um implante. Paciente ASA II, hipertenso controlado. Você já administrou dois tubetes de 1:100.000, e está próximo do limite. Acabou de passar a primeira fresa, e ele diz: ‘estou sentindo dor’.

(pausa)

Qual é a sua alternativa?

Injetar mais anestésico, ultrapassando o limite? Seguir com dor, e deixar que a adrenalina do próprio paciente faça o que o limite queria evitar? Ou interromper, com o leito ósseo já exposto?

(pausa)

Sem um protocolo de redução de estresse, com técnica anestésica planejada e controle da ansiedade, você está sem alternativa. E a literatura mostra o caminho: com anestesia eficaz, a resposta simpática é mínima, como vimos em Cioffi; e a sedação atenua a resposta ao estresse cirúrgico, como Dionne e colaboradores já mostravam em 1984.

O que muda essa equação é o planejamento, não o improviso. E isso é farmacologia e fisiologia de qualquer paciente, em qualquer especialidade.

6 · Peça 3 · SNC e hemodinâmica (09:30–11:00)

[Slide 6 — Peça 3 · SNC e hemodinâmica]

A terceira peça é a variação hemodinâmica. E aqui está o nosso maior distanciamento.

Otero e colaboradores, em 2025, encontraram apenas 40,5% de dentistas que aferem a pressão no consultório. E Christensen e Shipp, em 2026: até 87% não calculam corretamente a dose de anestésico local.

Agora, imagine. O paciente empalidece e perde a consciência. Bradicardia. Hipotensão.

(pausa)

É um reflexo vasovagal, a síncope, a emergência mais frequente na cadeira, como descrevem Yamashita e colaboradores em 2025? Ou é uma sobredosagem de anestésico local, num espectro que, segundo Rhee e colaboradores, vai da tontura à inconsciência e das arritmias à parada cardíaca?

(pausa)

Os dois começam de forma parecida. Um costuma se resolver com posicionamento e observação. O outro exige suporte avançado de vida. E o que os diferencia não está no momento da crise: está no que foi registrado antes. Quantos tubetes, em quanto tempo, para qual peso. Qual era a pressão de base.

Sem sinais vitais e sem dose registrada, não há diagnóstico diferencial. Há palpite.

7 · Peça 4 · Via aérea obstruída (11:00–12:15)

[Slide 7 — Peça 4 · Via aérea obstruída]

E o dominó chega à via aérea. Aqui, a obstrução acontece em toda a Odontologia.

Na prótese, Tiwana e colaboradores revisaram dez anos de uma faculdade americana, em 2004: a cimentação de coroas unitárias foi o momento de maior chance de aspiração. Na endodontia, Susini e colaboradores analisaram onze anos de dados de seguradoras francesas e registraram 44 aspirações, que exigiram hospitalização com frequência significativamente maior que as deglutições. E, na implantodontia, Araujo e colaboradores descreveram, em 2021, aqui no Brasil, a aspiração de uma chave de implante para a via aérea inferior.

E um dado que merece atenção: Hisanaga e colaboradores, em 2014, observaram esses eventos com mais frequência entre profissionais de um a sete anos de formados.

8 · Ortodontia (12:15–13:00)

[Slide 8 — Ortodontia]

Agora, a especialidade que menos se associa à via aérea.

Varho e colaboradores ouviram os ortodontistas da Finlândia, em 2015. Um em cada cinco já tinha atendido um paciente que aspirou ou ingeriu parte do aparelho. E a revisão de Karamani e colaboradores, de 2022, aponta os dispositivos mais implicados: bandas, segmentos de fio e chaves de expansor.

São peças pequenas, soltas, na entrada da via aérea, muitas vezes com uma criança reclinada na cadeira. Na Aula #12, voltaremos à ortodontia por outra porta: o sono.

9 · Ingestão ou aspiração? (13:00–14:15)

[Slide 9 — Ingestão ou aspiração?]

Considere o cenário. Durante a instalação, a coroa sobre implante se desprende e não é mais visualizada na cavidade oral. Velapati e colaboradores, em 2026, mostraram que esses são exatamente os itens mais aspirados: próteses, coroas e chaves de implante.

O paciente tem uma tosse súbita e vigorosa. Em seguida, a tosse cessa.

(pausa)

Houve ingestão ou aspiração? E a cessação da tosse indica resolução, ou progressão para obstrução completa?

A tosse vigorosa indica que ainda há fluxo aéreo. A interrupção, sem expulsão do corpo estranho, pode indicar o contrário. Por isso, a recomendação de Xie e colaboradores, em 2026, é clara: diante de um componente perdido, primeiro descartar a via aérea, antes de presumir a ingestão.

Na obstrução, o silêncio não indica resolução. Pode significar ausência total de fluxo aéreo.

(pausa)

E assim cai mais uma peça do nosso dominó.

10 · Peça 5 · Deterioração clínica (14:15–15:30)

[Slide 10 — Peça 5 · Deterioração clínica]

A quinta peça é a deterioração clínica. E ela não é teórica.

Müller e colaboradores acompanharam, em 2008, cerca de 1,28 milhão de atendimentos odontológicos na Alemanha, ao longo de um ano: 42 eventos graves, com risco de vida.

Tokede e colaboradores foram além, em 2024. Eventos adversos ocorreram em 1,4% dos pacientes odontológicos, e ao menos dois terços eram evitáveis.

E por que acontecem? Lo e colaboradores, em 2025, identificaram a causa mais comum: a falta de protocolo. E Khattak e colaboradores, em 2026, encontraram apenas 44,5% de consultórios com um protocolo de emergência definido.

11 · O abismo entre saber e fazer (15:30–16:30)

[Slide 11 — O abismo entre saber e fazer]

E quanto sabemos sobre isso?

Lembram do início? Stafuzza e colaboradores: 87% treinados em Suporte Básico de Vida, 43% aptos a executar. E não é um dado isolado. Shaath e colaboradores, em 2023, encontraram apenas 36% de dentistas que acertam a conduta diante da

aspiração de um corpo estranho. E, num estudo brasileiro de 2026, de Aquino e colaboradores, 82% dos acadêmicos não se sentem preparados para uma emergência.

Saber não é o mesmo que conseguir fazer sob pressão. A certificação não garante o resgate.

12 · Red flag (16:30–17:30)

[Slide 12 — Red flag]

Isso é uma red flag. E a norma confirma o que a literatura já vinha mostrando.

A RDC 1002/2025, da ANVISA, estabelece o Plano de Segurança do Paciente no serviço odontológico. Ela precisa ser revisada? Sem dúvida. Mas, antes, precisa ser estudada e apreciada. E a Resolução CFO 295/2026 estabelece que o cirurgião-dentista deverá estar apto a prevenir, reconhecer, manejar e resgatar.

(pausa)

Será, então, a via aérea um tema exclusivo de uma academia de sedação? Não. A sedação aumenta o risco, mas não é ela que cria a via aérea.

Toda grande mudança na segurança começa questionando aquilo que, durante anos, aprendemos a considerar seguro. Foi assim com a Lei Seca e com os EPIs, e é disso que vamos falar na Aula #13.

(pausa)

E cai a última peça do nosso dominó.

13 · O bloqueio da cascata (17:30–18:30)

[Slide 13 — O bloqueio da cascata]

Mas o dominó pode ser interrompido. Para a sua próxima consulta, quatro atitudes.

Primeira: aferir a pressão arterial. Ela estratifica o risco cardiovascular e orienta a escolha e a dose do anestésico.

Segunda: investigar ronco e apneia, com o STOP-Bang, antes de reclinar a cadeira.

Terceira: examinar a orofaringe e aplicar o SARI, o índice simplificado de risco de via aérea.

Quarta: garantir uma aspiração eficaz. A função da bomba a vácuo não é desobstruir: é manter um fluxo contínuo de aspiração de sangue, saliva e secreção durante todo o atendimento. E o fluxo importa. Holliday e colaboradores, em 2021, e Graetz e colaboradores, em 2022, diferenciam: a aspiração de baixo volume, como a de muitas bombas portáteis, opera em torno de 40 litros por minuto; a referência de segurança é de 150 a 300.

14 · A nova premissa clínica (18:30–18:50)

[Slide 14 — A nova premissa clínica]

(fale devagar, olhando para a lente)

Na Odontologia, a cavidade oral é o nosso campo de trabalho. Mas a via aérea é a nossa responsabilidade. Dominar sua anatomia e fisiologia é o que transforma o risco iminente em segurança clínica.

15 · Próximos passos e convite (18:50–19:45)

[Slide 15 — Próximos passos e convite]

Este é o nosso percurso: três aulas, quatro verbos. Hoje, reconhecemos o risco. Na próxima quinta, 19 de novembro, vamos prevenir: avaliar a via aérea em dois minutos, com o STOP-Bang, o Mallampati e o SARI. E, no dia 26, reconhecer, manejar e resgatar, com o PSP, o SBV e o SAVO.

E, para quem já tem a sedação na rotina: a avaliação de vias aéreas, a monitorização, o SBV e o SAVO estão reunidos na Trilha 295, rumo à Habilitação Básica em Sedação. São 104 horas online, ao vivo, e a turma presencial acontece de 5 a 9 de dezembro, no Rio de Janeiro. A condição de Black Friday vai até segunda-feira, 16 de novembro. Para conhecer os percursos, envie TRILHA no WhatsApp, ou acesse o link na descrição.

Como sempre: nenhum curso habilita, inclusive o nosso. Quem habilita é o Conselho.

(pausa)

As referências completas estão na descrição. Até a próxima quinta, às 11h11.