

## Chapter 5 The Discrete-Time Fourier Transform

### 5.1 THE DISCRETE-TIME FORURIER TRANSFORM

- Development
- Convergence Issues
- Examples

### 5.2 PROPERTIES OF THE DISCRETE-TIME FORURIER TRANSFORM

### 5.3 THE CONVOLUTION PROPERTY AND FREQUENCY RESPONSE

### 5.4 LINEAR CONSTANT-COEFFICIENT DIFFERENCE EQUATION

### 5.5 DISCRETE-TIME PROCESSING OF CONTINUOUS-TIME SIGNALS

## 5.1 THE DISCRETE-TIME FOURIER TRANSFORM

- **Development**
- **Convergence Issues**
- **Examples**

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

基本信号  $e^{j\omega n}$   
关于  $\omega$  以  $2\pi$  为  
周期

$X(e^{j\omega})$  **is periodic with period  $2\pi$**

- $X[e^{j(\omega+2\pi k)}] = X(e^{j\omega})$

注：低频出现在  $\pi$  的偶数倍，高频出现在  $\pi$  的奇数倍

- $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$

注：上式积分区间为任何长度为  $2\pi$ ，例：  $(-\pi, \pi)$  或  $(0, 2\pi)$




图 1.27 对应于几个不同频率时的离散时间正弦序列

## 5.1 THE DISCRETE-TIME FOURIER TRANSFORM

- Development
- Convergence Issues
- Examples

$\sum_n x[n]e^{-j\omega n}$  will converge either if  $x[n]$  is absolutely summable

or has finite energy

- 能量有限

$$\sum_n |x[n]|^2 < \infty$$

- 绝对可和


$$\sum_n |x[n]| < \infty$$

## 5.1 THE DISCRETE-TIME FOURIER TRANSFORM


- Development
- Convergence Issues
- Examples

## ① Exponential Signal

$$x[n] = \alpha^n u[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}} \quad |\alpha| < 1$$



(a)  $\alpha > 0$



(b)  $\alpha < 0$



附：等比级数求和公式

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} a^n = \begin{cases} \frac{a^{n_1} - a^{n_2+1}}{1-a}, & a \neq 1 \\ n_2 - n_1 + 1, & a = 1 \end{cases}$$

①  $n_1 = 0, n_2 = \infty$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}, |a| < 1$$

②  $n_1 = n_1, n_2 = \infty$

$$\sum_{n=n_1}^{\infty} a^n = \frac{a^{n_1}}{1-a}, |a| < 1$$

### ② Unit Impulse

$$x[n] = \delta[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega}) = 1$$

### ③ Dc Signal

$$x[n] = 1 \leftrightarrow X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta[\omega - 2\pi l]$$

注:  $X(e^{j\omega})$  以  $2\pi$  为周期


Proof :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 2\pi \sum_l \delta(\omega - 2\pi l) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 2\pi \delta(\omega) e^{j\omega n} d\omega = 1 \end{aligned}$$

### ④ Rectangular Pulse

$$x[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq N_1 \\ 0, & |n| > N_1 \end{cases} \leftrightarrow \frac{\sin \omega(N_1 + \frac{1}{2})}{\sin(\omega / 2)}$$

⑤  $\frac{\sin Wn}{\pi n} \leftrightarrow X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq W \\ 0, & W < |\omega| \leq \pi \end{cases}$  注:  $W < \pi$



## 5.2 PROPERTIES OF THE DISCRETE-TIME FOURIER TRANSFORM

- Periodicity
- Linearity
- Time Shifting and Frequency Shifting
- .....

### •Periodicity

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$$

Example:

Suppose:  $X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta(\omega - \frac{\pi k}{2})$

Determine:  $x[n]$

提示：在 $(-\pi, \pi]$ 内， $X(e^{j\omega}) = -\delta(\omega + \frac{\pi}{2}) + \delta(\omega) - \delta(\omega - \frac{\pi}{2}) + \delta(\omega - \pi)$

### •Linearity

$$x_1[n] \leftrightarrow X_1(e^{j\omega}) \quad x_2[n] \leftrightarrow X_2(e^{j\omega})$$

$$ax_1[n] + bx_2[n] \leftrightarrow aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$$

### •Time Shifting and Frequency Shifting

$$x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$$

$$x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X[e^{j(\omega - \omega_0)}]$$

Example:  $x[n] = \alpha^n \cos \omega_0 n \cdot u[n], \quad |a| < 1$

$$x[n] = \alpha^n u[n] \cdot \frac{e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}}{2}$$

$$\therefore \alpha^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$$

$$\therefore x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{1 - \alpha e^{-j(\omega - \omega_0)}} + \frac{1}{1 - \alpha e^{-j(\omega + \omega_0)}} \right]$$

$$= \frac{1 - \alpha \cos \omega_0 e^{-j\omega}}{1 - 2\alpha \cos \omega_0 e^{-j\omega} + \alpha^2 e^{-j2\omega}}, \quad |a| < 1$$

Example:  $X(e^{j\omega}) = \sin^2 3\omega$

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sin^2 3\omega \\ &= \frac{1 - \cos 6\omega}{2} = \frac{1}{2} - \frac{e^{j6\omega} + e^{-j6\omega}}{4} \\ &\leftrightarrow \frac{1}{2} \delta[n] - \frac{1}{4} (\delta[n+6] + \delta[n-6]) \end{aligned}$$



About Time Expansion:

- Continuous-time signal

$$x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$$

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\frac{\omega}{a})$$

- Discrete-time signal



$$x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega}) \quad x[an] \leftrightarrow X_a(e^{j\omega})$$

$X_a(e^{j\omega})$ 与 $X(e^{j\omega})$ , 则不一定有如上确定关系



### •Time Expansion

$$x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$$

Defination:


$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & \text{当 } n \text{ 为 } k \text{ 的整数倍} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 不为 } k \text{ 的整数倍} \end{cases} \leftrightarrow X_{(k)}(e^{j\omega})$$

$$X_{(k)}(e^{j\omega}) = X(e^{jk\omega})$$

注：  $x_{(k)}[n]$  是在  $x[n]$  的相邻样本点插入  $(k-1)$  个零，相对于  $x[n]$  来说是“时域展宽”

$X_{(k)}(e^{j\omega})$  的重复周期变为  $2\pi/k$ ，相对于  $X(e^{j\omega})$  是“频域压缩”

Example:  $x[n]$  与  $x[n/2]$



## •Time Reversal

$$x[-n] \leftrightarrow X(e^{-j\omega})$$

### •Conjugation and Conjugate Symmetry

$$x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$$

$$x^*[n] \leftrightarrow X^*(e^{-j\omega})$$

If  $x[n]$  is real valued

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \quad \text{—Conjugate Symmetry}$$

$$\textcircled{1} \quad X(e^{j\omega}) = \text{Re}[X(e^{j\omega})] + jI_m[X(e^{j\omega})]$$

$$\text{Re}[X(e^{j\omega})] = \text{Re}[X(e^{-j\omega})]$$

$$I_m[X(e^{j\omega})] = -I_m[X(e^{-j\omega})]$$

$$\textcircled{2} \quad X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})| e^{j\angle X(e^{j\omega})}$$

$$|X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})|$$

$$\angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega})$$

③  $x[n]$  real and even  $\leftrightarrow X(e^{j\omega})$  real and even

$x[n]$  real and odd  $\leftrightarrow X(e^{j\omega})$  purely imaginary and odd

$$x_e[n] = \frac{1}{2}[x[n] + x[-n]] \leftrightarrow \text{Re}[X(e^{j\omega})]$$

$$x_o[n] = \frac{1}{2}[x[n] - x[-n]] \leftrightarrow jI_m[X(e^{j\omega})]$$

### • Differencing and Accumulation

$$x[n] - x[n-1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$$
$$\sum_{m=-\infty}^n x[m] \leftrightarrow \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

Example :  $\because u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m]$

$$\delta[n] \leftrightarrow 1$$

$$\therefore u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

### • Differentiation in Frequency

$$nx[n] \leftrightarrow j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

Example: 已知  $x[n] = n(\frac{1}{2})^{|n|}$ , 求其傅里叶变换  $X(e^{j\omega})$

设  $x_1[n] = (\frac{1}{2})^{|n|}$

$$\begin{aligned} \leftrightarrow X_1(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{-1} (\frac{1}{2})^{-n} e^{-j\omega n} + \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{2})^n e^{-j\omega n} \\ &= \frac{\frac{1}{2} e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{j\omega}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} = \frac{\frac{3}{4}}{(\frac{5}{4} - \cos \omega)} \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= j \frac{dX_1(e^{j\omega})}{d\omega} \\ &= -j \frac{\frac{3}{4} \sin \omega}{(\frac{5}{4} - \cos \omega)^2} \end{aligned}$$



### •Parseval's Relation

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

$\therefore$  在 $2\pi$ 区间对每单位频率上的能量  $\frac{|X(e^{j\omega})|^2}{2\pi}$  积分等于信号 $x[n]$ 的总能量

$\therefore |X(e^{j\omega})|^2$  称为能谱密度

## 5.3 THE CONVOLUTION PROPERTY AND FREQUENCY RESPONSE

- **Convolution Property**
- **Frequency Response**

$$x_1[n] \leftrightarrow X_1(e^{j\omega}) \quad x_2[n] \leftrightarrow X_2(e^{j\omega})$$

$$x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(e^{j\omega}) \cdot X_2(e^{j\omega})$$

Example:  $\sum_{m=-\infty}^n x[m] = x[n] * u[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega}) \cdot \left[ \frac{1}{1 - e^{j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k) \right]$


$$= \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{j\omega}} + \pi \sum_k X(0) \delta(\omega - 2\pi k)$$

Exercise:  $x_1[n] = \alpha^n u[n] \quad x_2[n] = \beta^n u[n]$

*Determine*  $y[n] = x_1[n] * x_2[n]$

## 5.3 THE CONVOLUTION PROPERTY AND FREQUENCY RESPONSE

- Convolution Property
- Frequency Response



$$y[n] = x[n] * h[n]$$

设  $x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$     $y[n] \leftrightarrow Y(e^{j\omega})$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_n h[n] e^{-j\omega n}$$

—frequency response

存在条件:  $\sum_n |h[n]| < \infty$    —系统稳定

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) \qquad H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})}$$

- 1)  $H(e^{j\omega})$ 可完全描述一个（稳定的）LTI系统
- 2)  $H(e^{j\omega})$ 一般为复数

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\angle H(e^{j\omega})}$$


物理意义：给出任意频率分量经过LTI系统后幅度和相位的改变量

注：

- 频谱的周期性
- 低频/高频分量

## Signal and System

Example:



$$H_{hp}(e^{j\omega}) = H_{lp}(e^{j(\omega-\pi)})$$

$$h_{hp}[n] = e^{jn\pi} h_{lp}[n] = (-1)^n h_{lp}[n]$$

### 附: Multiplicaton Property

$$x_1[n] \leftrightarrow X_1(e^{j\omega}) \quad x_2[n] \leftrightarrow X_2(e^{j\omega})$$


周期卷积!

$$x_1[n] \cdot x_2[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$



Example:  $x_1[n] = \frac{\sin(3\pi n / 4)}{\pi n}$      $x_2[n] = \frac{\sin(\pi n / 2)}{\pi n}$

$$x_1[n] \cdot x_2[n] \leftrightarrow ?$$





取 $X_1(e^{j\omega})$ 的主周期  
将周期卷积转换为非周期卷积



### 5.4 LINEAR CONSTANT-COEFFICIENT DIFFERENCE EQUATION

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega}}$$

Example: 
$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n]$$

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{2}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}} \\ &= \frac{2}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})} \end{aligned}$$


$$H(j\omega) = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

Expanded by  
the method of  
partial fractions

$$h[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$


### 5.5 DISCRETE-TIME PROCESSING OF CONTINUOUS-TIME SIGNALS

——将连续时间信号转换成离散时间信号，经离散时间系统处理后再转为连续时间信号。



### ■ C/D和D/C转换

#### 1. C/D转换




- 1) 取样—满足取样定理，不产生频谱混叠
- 2) 冲激串到离散时间序列的转换

注：用于实现C/D转换的器件——模拟数字（A/D）转换器

✓ 关于冲激串(impulse train)到离散时间序列(D-T sequence)的转换

- 时域:  $x_d[n] = x_c[nT]$ , 即除以T



- 频域:

连续时间信号的频率为 $\omega$ , 离散时间信号的频率为 $\Omega$

$$\because x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT)\delta(t-nT)$$

$$\therefore X_p(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT)e^{-j\omega nT}$$

$$\begin{aligned}\text{又 } X_d(e^{j\Omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n]e^{-j\Omega n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c[nT]e^{-j\Omega n}\end{aligned}$$

当  $\Omega = \omega T$  时


$$X_p(j\omega) = X_d(e^{j\Omega})$$

注: 时域除以T, 频域乘以T  
——时域和频域的对偶特性!

## Signal and System

$$\therefore X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum X_c(j(\omega - k\omega_s)) \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$


$$\therefore X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \sum X_c(j(\Omega - k2\pi)/T)$$




频域的归一化过程



### 2. D/C转换



### ■ 冲激响应不变法




若， 1) 离散时间系统是线性和时不变的

2) 输入信号是带限的，且采样频率足够高

则，上述整个系统就等效为一个频率响应为  $H_c(j\omega)$  的连续时间系统

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} H_d(e^{j\omega T}), & |\omega| < \frac{\omega_s}{2} \\ 0, & |\omega| > \frac{\omega_s}{2} \end{cases}$$



$$\because H_d(e^{j\Omega}) = H_c(j\omega), \quad |\omega| < \frac{\omega_s}{2}$$

$$H_d(e^{j\Omega}) \leftrightarrow h_d[n] \quad H_c(j\omega) \leftrightarrow h_c(t)$$

若设 $h_d[n]$ 是 $h_c(t)$ 采样获得

$$\text{考虑到 } x_d[n] = x_c(nT) \text{ 时, 有 } X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \sum X_c[j(\omega - k\omega_s)]$$

$\therefore$

$$h_d[n] = Th_c(nT)$$

——冲激响应不变法

# Q & A



Homework Due:

<https://oc.sjtu.edu.cn/login/canvas>

