Plan de alimentación y deglución al alta

Indicaciones para la persona y quienes la acompañan. El profesional completa y explica este plan según la evaluación. Aplicar solo las opciones marcadas.

Nombre _____ Fecha _____ Cuidador/a _____

1 Vía de alimentación y ayuda necesaria

□ Oral exclusiva □ Oral y apoyo por sonda □ Solo sonda u ostomía □ Otro plan: _____

Por boca se permite: □ Alimentos □ Líquidos □ Medicamentos □ Nada por boca

Apoyo: □ Independiente □ Supervisión □ Asistencia completa Responsable: _____

Si usa sonda u ostomía, adjuntar plan de nutrición, agua, medicamentos y cuidados del dispositivo.

2 Alimentos y líquidos indicados

Alimentos: nivel IDDSI _____ Textura _____ Ejemplos _____

Líquidos: nivel IDDSI _____ Consistencia _____ Bebidas permitidas _____

Si requiere espesante: producto _____ Cantidad _____ por _____ mL Espera _____ min

Preparación y verificación enseñadas: _____

Meta diaria de líquidos definida por el equipo: _____ mL Vía(s): _____ Registro a cargo de: _____

Suplemento y horario, si corresponde: _____

3 Durante la alimentación por boca

Ofrecer solo cuando esté despierto/a y atento/a. Si se duerme o pierde la atención, detener la ingesta. Acomodar el cuerpo con apoyo y reducir distractores. Respetar su ritmo y no forzar.

Postura indicada _____ Tiempo en esa posición después _____

Volumen por bocado o sorbo _____ Utensilio _____ Bombilla: □ Sí □ No □ No indicada

Maniobra o estrategia entrenada _____ □ No requiere maniobras

No agregar agua, alternar consistencias ni aplicar mentón al pecho salvo indicación individual.

4 Higiene oral y medicamentos

Cepillar dientes, encías y lengua al menos dos veces al día. Limpiar las prótesis y retirar restos después de comer. Mantener higiene oral aunque no coma por boca; usar la técnica enseñada.

Apoyo o adaptación para higiene oral: _____

Medicamentos: seguir la pauta adjunta revisada por medicina o farmacia. No triturar, abrir cápsulas ni mezclar con espesante sin confirmación para cada medicamento.

5 Cuándo detener la ingesta y pedir ayuda

Detener la ingesta ante atoros, tos repetida, voz húmeda nueva o somnolencia. Contactar al equipo si persisten o aparecen en forma repetida. La ausencia de tos no garantiza una deglución segura.

Consultar el mismo día por fiebre, menor ingesta, poca orina, rechazo persistente de líquidos o deterioro general. Solicitar reevaluación por pérdida de peso o comidas cada vez más prolongadas.

Emergencia: si no puede respirar, hablar o toser, o pierde la conciencia, activar el servicio de urgencia de inmediato.

6 Seguimiento y verificación antes de salir

Próximo control: fecha _____ Profesional/centro _____ Contacto _____

Objetivo de reevaluación o cambio del plan: _____

□ Persona/cuidador demuestra preparación y ayuda □ Comprende alarmas □ Cuenta con insumos

Preferencias y acuerdos con la persona: _____

Fonoaudiólogo/a _____ Firma _____ Contacto _____