

Простуда: что делать сегодня

Большинство лёгких вирусных инфекций проходят самостоятельно. Задача самопомощи - облегчить симптомы, поддержать восстановление и вовремя заметить изменение течения болезни.

Похожие симптомы бывают при гриппе и COVID-19.

Если вы в группе риска, свяжитесь с врачом в начале болезни: специфическое лечение наиболее полезно рано.

Сегодня

- Отдохните и оставайтесь дома, если есть температура или вы плохо себя чувствуете.
- Пейте достаточно, чтобы не испытывать выраженную жажду и нормально мочиться.
- Проветривайте помещение, мойте руки, прикрывайте кашель и уменьшите тесные контакты, особенно с уязвимыми людьми.

Чтобы стало легче

- Выберите средство под конкретный симптом и проверьте противопоказания.
- Проверьте состав комбинированных средств. Не принимайте одно действующее вещество дважды, например отдельно и в составе порошка.
- Солевой раствор, тёплое питьё, леденцы и отдых могут быть достаточными при лёгких симптомах.
- При хронических заболеваниях, беременности или постоянном приёме лекарств обсудите выбор с врачом или фармацевтом.

Чего не делать

- Не начинайте антибиотик на всякий случай: он не лечит вирусную простуду.
- Не рассчитывайте, что универсальное противовирусное вылечит любой насморк.
- Не дышите над ёмкостью с кипятком: это не устраняет инфекцию и может вызвать ожог.
- Не считайте зелёную слизь доказательством бактериальной инфекции.

Позвоните 112

- выраженная одышка или трудно дышать;
- постоянная боль или давление в груди;
- спутанность сознания, судороги или человека невозможно разбудить;
- синюшный или серый оттенок губ и кожи;
- человек не может пить или почти не мочится.

Свяжитесь с врачом

- температура сохраняется дольше 3-4 дней;
- за 10 дней не становится лучше или после улучшения снова стало хуже;
- кашель длится больше трёх недель;
- появились сильная боль в ухе, выделения из уха, односторонняя боль или отёк лица;
- ухудшилось хроническое заболевание.

Что может проходить не сразу

- Острый кашель нередко длится до 3-4 недель, но должен постепенно слабеть.
- Заложенность, покашливание и утомляемость могут отставать от общего улучшения.
- Новая температура, одышка, боль в груди, кровь при кашле или нарастающая слабость - не просто остаточные симптомы.

Если вы часто болеете: важнее не число эпизодов само по себе, а тяжёлые, длительные, необычные инфекции, повторные пневмонии и отсутствие полного восстановления между ними.

Основные источники: CDC, NHS, NICE NG120, Cochrane. Полная версия с объяснением механизма и ссылками находится на странице, откуда скачан этот файл.