


1.5 Inverse functions & logarithms

1. inverse function 反函數 $f^{-1}(x)$
2. logarithmic function 對數函數 $\log_a x$
3. inverse trigonometric function 反三角函數 \arcsin or \sin^{-1}

0.1 Inverse function

A **mapping** 映射 f from **domain** 定義域 D to **range** 值域 R has three types:

1. maps one to many 一對多 交大: 新竹, 西安, 上海, 北京, 西南。
2. maps many to one 多對一 0314/0351/0415微積分老師: 林武雄。
3. maps one to one 一對一 同時段(1GH4CD/2CD5EF/2IJ4IJ) 的教室。



A **function** 函數 f is a mapping without the type of **one to many**, and is

1. **one-to-one** (injective, an injection) 一對一 (單射)
if $f(x_1) \neq f(x_2)$ whenever $x_1 \neq x_2$. $\implies |D| \leq |R|$. (人人點不同菜。)
2. **onto** (surjective, a surjection) 映成 (滿射)
if $\forall y \in R, \exists x \in D, \ni f(x) = y$. $\implies |D| \geq |R|$. (道道菜有人點。)
3. **one-to-one & onto** (bijective, a bijection) 一對一且映成 (雙射)
 $\implies |D| = |R|$. (點好點滿。)

◆: 證明正整數, 整數, 偶數, 有理數一樣多 ($|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |2\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}|$): 找雙射。

Vertical line test: $f(x)$ is a function $\iff y = f(x)$


intersects any vertical line $x = k$ at most one point.

(是函數 \iff 任垂直線最多交一點。)

Horizontal line test: $f(x)$ is one-to-one $\iff y = f(x)$


intersects any horizontal line $y = c$ at most one point.

(一對一 \iff 任水平線最多交一點。)



Define: The **inverse function** 反函數 of a **one-to-one** function

$$f : D \rightarrow R \text{ is } \boxed{f^{-1}} : R \rightarrow D \text{ s.t. } \boxed{f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y}.$$



1. $f^{-1}(f(x)) = x, \forall x \in D.$
2. $f(f^{-1}(y)) = y, \forall y \in R.$
3. f^{-1} is one-to-one.

Attention: $f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)} = [f(x)]^{-1}.$

How to solve $f^{-1}(x)$: (A 先變再換, B 先換再變; 最好固定一種)

- A1. write $y = f(x)$; A2. become $x = g(y)$; A3. exchange x, y to obtain \curvearrowright .
 B1. write $x = f(y)$; B2. become $y = g(x)$; B3. $f^{-1}(x) = g(x).$

Skill: 怎麼變? 加對減 乘對除 幕次對開根 x 對 y D 對 R 指數對對數

天對地 雨對風 大陸對長空 山花對海樹 赤日對蒼穹

雷陰陰 霧濛濛 日下對天中 風高秋月白 雨霽晚霞紅

—《笠翁對韻》

Example 0.1 $f(x) = x^3 + 2, f^{-1}(x) = ?$

A. $y = f(x) = x^3 + 2 \xrightarrow{(-2)} x^3 = y - 2 \xrightarrow{(\sqrt[3]{})} x = \sqrt[3]{y - 2}, \text{ 交換 } x \text{ 與 } y.$
 B. $x = f(y) = y^3 + 2 \xrightarrow{(-2)} y^3 = x - 2 \xrightarrow{(\sqrt[3]{})} y = \sqrt[3]{x - 2}.$
 $\implies f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 2}.$ ■


How to draw $f^{-1}(x)$: $(y, f^{-1}(y)) = (f(x), x),$

$y = f(x)$ 與 $y = f^{-1}(x)$ 的圖形對稱於 $y = x$ (過原點 45° 直線).

Example 0.2 Draw $\sqrt{-1-x}.$

$\sqrt{-1-x} : (-\infty, -1] \rightarrow [0, \infty)$, 是 $-1-x^2$ 的反函數 (反函數是 $-1-x^2$).

Draw $y = -1-x^2$ for $x \in [0, \infty)$ (注意範圍), 再對稱 $y = x$ 畫.



0.2 Logarithms

Define: The *logarithmic function of base a* (以 a 為底的對數函數),

$$\boxed{\log_a x, a > 0, a \neq 1} : (0, \infty) \rightarrow (-\infty, \infty)$$

is the inverse function of $f(x) = a^x$. (“log(arithm) of x to the base a ”)

$$\boxed{\log_a y = x \iff a^x = y} \quad \text{對底真 = 指} \iff \text{底}^{\text{指}} = \text{真}$$

Note: a^x 要 $a > 0$, $\log_a x$ 不只要 $a > 0$, 還要 $a \neq 1$ 才有 one-to-one.
 $\log_a(a^x) = x, \forall x \in (-\infty, \infty)$ (或 $x \in \mathbb{R}$); $a^{\log_a y} = y, \forall y \in (0, \infty)$ (或 $y > 0$).

Define: *Natural logarithm* 自然對數: (“natural log(arithm) of x ”)


$$\boxed{f(x) = \ln x = \log_e x}$$

以 e 為底的對數函數 (自然指數函數 e^x 的反函數: $\ln y = x \iff e^x = y$.)

Note: $\boxed{\ln e^x = x}, \forall x \in \mathbb{R}; \boxed{e^{\ln y} = y}, \forall y > 0$.


$\log x = \log_{10} x$ common logarithm 常用對數, in science and engineering.

$\lg x = \log_2 x$ binary logarithm 二元對數, in computer science.



Attention:

ln / log 的 **l**
 (我都寫 **ℓ**)
 是小寫 **L**,
 不是大寫 **I**,
 也不是數字 **1**.



Law of logarithms 對數律: $a > 0, a \neq 1, x, y > 0$. ($a^b = x, a^c = y$)

1. 乘: $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$. ($\iff a^b \times a^c = a^{b+c}$)
2. 除: $\log_a x/y = \log_a x - \log_a y$. ($\iff a^b/a^c = a^{b-c}$)
3. 幕次: $\log_a x^r = r \log_a x$ for $r \in \mathbb{R}$. ($\iff (a^b)^r = a^{rb}$)

◆ **History:**

- 200 B.C. Archimedes(阿基米德) 發現:

$$\begin{array}{ccccccc} 1, & 10, & 100, & 1000, & \dots & & \\ 0, & 1, & 2, & 3, & \dots & & \end{array}$$

可以用第二列的加減表示第一列的乘除. $(\log_a x + \log_a y = \log_a xy)$

- 1544 Michael Stifel(斯基弗, 1487–1567) 在《Arithmetica Integra》中首次使用 exponent(指數) 這個字, 並寫道:

$$\begin{array}{ccccccccccc} \frac{1}{8}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{2}, & 1, & 2, & 4, & 8, & 16, & 32, & 64 \\ -3, & -2, & -1, & 0, & 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6 \end{array}$$

還可以用第二列的乘除代替第一列的幕次與開根. $(\log_a x^r = r \log_a x)$

- 1614 John Napier (納皮爾, 1550–1617) 發表歷史上第一張對數表. 他花了 20 年解

$$N = 10^7(1 - 10^{-7})^L \text{ for } N = 5 \sim 10^7,$$

也就是解

$$L = \text{Naplog}(N) = \log_{1-10^{-7}}\left(\frac{N}{10^7}\right) = 10^7 \log_{(1-10^{-7})^{10^7}}\left(\frac{N}{10^7}\right)$$

其中的

$$(1 - 10^{-7})^{10^7} = 0.9999999^{10000000} \approx e^{-1},$$

所以

$$\text{Naplog}(N) \approx -10^7 \ln\left(\frac{N}{10^7}\right).$$

後來他想到應該以 10 為底, 可惜命不夠長. $(\log_x y = \frac{\log_a y}{\log_a x})$

- 1620 Jost Bürgi (比爾吉, 1552–1632) 發表《Progreß Tabulen》羅列

$$(1.0001)^n \text{ for } 0 \leq n \leq 23027.$$

• 1624 Henry Briggs (1555–1631), Napier 的朋友, 繼承其遺志發表 1–20,000 & 90,000–100,000 的 14 位數對數表 (of base 10); 1627 Ezechiel de Decker with Adriaan Valcq 補上 20,000–90,000.

• 1727 Leonhard Euler (歐拉, 1707–1783) 命名 $e = 2.718281828\dots$, 1730 發表用極限定義自然指數與自然對數函數:

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \quad \& \quad \ln x = \lim_{n \rightarrow \infty} n(x^{\frac{1}{n}} - 1).$$

Change base formula 換底公式: $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1, x > 0$.

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Proof. Let $y = \log_a x \iff a^y = x$, then


$$\begin{aligned} \log_b x &= \log_b a^y \quad (\text{inverse function}) \\ &= y \log_b a \quad (\text{logarithmic law}) \\ &= \log_a x \log_b a, \\ \implies \log_a x &= \log_b x / \log_b a. \end{aligned}$$

Note: 換底的好處 — 不用對每種底做對數表:

$$\ln 2 \approx 0.7, \ln 10 \approx 2.3. \text{ Then } \log 2 = \frac{\ln 2}{\ln 10} \approx \frac{7}{23}, \lg 10 = \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx \frac{23}{7}.$$

Example 0.3 $f(x) = e^{x+1} + 2$, solve and draw $f^{-1}(x)$.


$$\begin{aligned} \text{Let } x = e^{y+1} + 2 &\iff x - 2 = e^{y+1} \iff \ln(x - 2) = y + 1 \\ \iff f^{-1}(x) = y = \ln(x - 2) - 1. & \text{ (注意括號: } \ln x - 2 \neq \ln(x - 2) \text{.)} \\ f(x) : \mathbb{R} \rightarrow (2, \infty), & f^{-1}(x) : (2, \infty) \rightarrow \mathbb{R}. \end{aligned}$$



0.3 Inverse trigonometric function

三角幾何 幾何三角 三角三角 幾何幾何

狹義



$$\sin \theta = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$$


$$\tan \theta = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{\text{鄰邊}}{\text{對邊}} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{\text{斜邊}}{\text{鄰邊}} = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\csc \theta = \frac{\text{斜邊}}{\text{對邊}} = \frac{1}{\sin \theta}$$

廣義



Trigonometric 三角函數 $f(x) \in \{\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x\}$ 是 periodic 週期函數 ($f(x + 2\pi) = f(x)$), $x \in \mathbb{R}$, 不是 one-to-one, 所以要限制定義域, 使 $f(x)$ 變成 one-to-one, 才能考慮反函數.


Define: The inverse function of restricted sine function is called the

inverse sine function, $\boxed{\sin^{-1} x}$, or the *arcsine function*, $\boxed{\arcsin x}$. (受限制的正弦函數的反函數=反正弦函數)


| function | restricted domain | range | inverse |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------|
| $\sin x$ | $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ | $[-1, 1]$ | $\sin^{-1} x = \arcsin x$ |
| $\cos x$ | $[0, \pi]$ | $[-1, 1]$ | $\cos^{-1} x = \arccos x$ |
| $\tan x$ | $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ | $(-\infty, \infty)$ | $\tan^{-1} x = \arctan x$ |
| $\cot x$ | $(0, \pi)$ | $(-\infty, \infty)$ | $\cot^{-1} x$ |
| $\sec x$ | $\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ | $\sec^{-1} x$ |
| $\csc x$ | $\left(0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ | $\csc^{-1} x$ |

Attention: $\sin^n x = (\sin x)^n$ for $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{\sin^{-1} x \neq \frac{1}{\sin x} = (\sin x)^{-1}}$.

1. **Sine** 正弦 $\sin x : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ (廣義).




$$\sin x : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$$




$$\sin^{-1} x : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$\sin^{-1}(\sin x) = x, \forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \text{ and } \sin(\sin^{-1} y) = y, \forall y \in [-1, 1].$$

2. **Cosine** 餘弦 $\cos x : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ (廣義).




$$\cos x : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$$




$$\cos^{-1} x : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

3. **Tangent** 正切 $\tan x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (廣義).




$$\tan x : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$$




$$\tan^{-1} x : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

4. **Cotangent** 餘切 $\cot x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (廣義).




$$\cot x : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$$




$$\cot^{-1} x : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$$

5. **Secant** 正割 $\sec x : \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ (廣義).




$$\sec x : [0, \frac{\pi}{2}) \cup [\pi, \frac{3\pi}{2}) \rightarrow (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$$




$$\sec^{-1} x : |x| \geq 1 \rightarrow [0, \frac{\pi}{2}) \cup [\pi, \frac{3\pi}{2})$$



6. **Cosecant** 餘割 $\csc x : \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ (廣義).



$$\csc x : (0, \frac{\pi}{2}) \cup (\pi, \frac{3\pi}{2}] \rightarrow (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$$



$$\csc^{-1} x : |x| \geq 1 \rightarrow (0, \frac{\pi}{2}] \cup (\pi, \frac{3\pi}{2}]$$




Question: 一定要限制在這些區間嗎?

Answer: 不一定, 只要能 one-to-one 就好.

Question: 為什麼要限制在這些區間?

Answer: see §3.5, §7.3.



(Fill by yourself:

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sin^{-1}(\sin n)$ | 1 | | | | | | | |
| $\cos^{-1}(\cos n)$ | 1 | | | | | | | |
| $\tan^{-1}(\tan n)$ | 1 | | | | | | | |
| $\cot^{-1}(\cot n)$ | 1 | | | | | | | |
| $\sec^{-1}(\sec n)$ | 1 | | | | | | | |
| $\csc^{-1}(\csc n)$ | 1 | | | | | | | |

hint: $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$, $\cos(-\theta) = \cos \theta$, $\tan(\pi + \theta) = \tan \theta$.)


Example 0.4 (a) $\sin^{-1} \frac{1}{2} = ?$ (b) $\tan(\arcsin \frac{1}{3}) = ?$

(a) Let $x = \sin^{-1} \frac{1}{2} \iff \sin x = \frac{1}{2}$,

$x = (2k + \frac{1}{6})\pi$ or $(2k + \frac{5}{6})\pi$, only $\frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

(b) Let $\theta = \arcsin \frac{1}{3} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \iff \sin \theta = \frac{1}{3}$,

$$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3^2 - 1^2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$



Example 0.5 Simplify $\cos(\tan^{-1} x)$.


Let $\theta = \tan^{-1} x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \iff \tan \theta = x$.

$$\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta, \sec \theta = \sqrt{1 + \tan^2 \theta} = \sqrt{1 + x^2}.$$

(負不合, $\because \theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $\sec \theta \geq 1 > 0$.)


$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{\sec \theta} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

[Another method]: See diagram.




Skill: Diagram: Inverse $\left\{ \begin{array}{l} \text{sine / tangent / secant} \\ \text{cosine / cotangent / cosecant} \end{array} \right\}$ function


$\sin^{-1} x$




$\cos^{-1} x$




$\tan^{-1} x$




$\cot^{-1} x$



$\sec^{-1} x$










$\csc^{-1} x$



◆ Additional: Answer

| A | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B | $\pi - n$ | 2.14 | 1.14 | 0.14 | -0.86 | -1.86 | -2.86 | -3.86 | -4.86 |
| C | $n - \pi$ | -2.14 | -1.14 | -0.14 | 0.86 | 1.86 | 2.86 | 3.86 | 4.86 |
| D | $2\pi - n$ | 5.28 | 4.28 | 3.28 | 2.28 | 1.28 | 0.28 | -0.72 | -1.72 |
| E | $n - 2\pi$ | -5.28 | -4.28 | -3.28 | -2.28 | -1.28 | -0.28 | 0.72 | 1.72 |
| F | $3\pi - n$ | 8.42 | 7.42 | 6.42 | 5.42 | 4.42 | 3.42 | 2.42 | 1.42 |
| G | $n - 3\pi$ | -8.42 | -7.42 | -6.42 | -5.42 | -4.42 | -3.42 | -2.42 | -1.42 |
| H | $4\pi - n$ | 11.56 | 10.56 | 9.56 | 8.56 | 7.56 | 6.56 | 5.56 | 4.56 |

| | Domain | Range |
|---------------------|---------|---|
| $\sin^{-1}(\sin n)$ | AB EF |  |
| $\cos^{-1}(\cos n)$ | A DE H |  |
| $\tan^{-1}(\tan n)$ | A C E G |  |
| $\cot^{-1}(\cot n)$ | A C E G |  |
| $\sec^{-1}(\sec n)$ | A DE H |  |
| $\csc^{-1}(\csc n)$ | AB EF |  |



How to read tables:

- Find $\cos^{-1}(\cos 5)$: Look the column of $n = 5$ in the 1st table.
- In the 2nd table $\cos^{-1}(\cos n)$ domain ADEH
 $(\because \cos 5 = \cos(2\pi - 5) = \cos(5 - 2\pi) = \cos(4\pi - 5))$:
 Look numbers in rows ADEH $\{5, 1.28, -1.28, 7.56\}$.
- $\cos^{-1}(\cos n)$ range blue($0 \sim \pi/2$) and green($\pi/2 \sim \pi$):
 Find the number of color blue or green 1.28 in the row D ($2\pi - n$).
- $\cos^{-1}(\cos 5) = 2\pi - 5$.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| $\sin^{-1}(\sin n)$ | 1 | $\pi - 2$ | $\pi - 3$ | $\pi - 4$ | $5 - 2\pi$ | $6 - 2\pi$ | $7 - 2\pi$ | $3\pi - 8$ |
| $\cos^{-1}(\cos n)$ | 1 | 2 | 3 | $2\pi - 4$ | $2\pi - 5$ | $2\pi - 6$ | $7 - 2\pi$ | $8 - 2\pi$ |
| $\tan^{-1}(\tan n)$ | 1 | $2 - \pi$ | $3 - \pi$ | $4 - \pi$ | $5 - 2\pi$ | $6 - 2\pi$ | $7 - 2\pi$ | $8 - 3\pi$ |
| $\cot^{-1}(\cot n)$ | 1 | 2 | 3 | $4 - \pi$ | $5 - \pi$ | $6 - \pi$ | $7 - 2\pi$ | $8 - 2\pi$ |
| $\sec^{-1}(\sec n)$ | 1 | $2\pi - 2$ | $2\pi - 3$ | 4 | $2\pi - 5$ | $2\pi - 6$ | $7 - 2\pi$ | $4\pi - 8$ |
| $\csc^{-1}(\csc n)$ | 1 | $\pi - 2$ | $\pi - 3$ | 4 | $3\pi - 5$ | $3\pi - 6$ | $7 - 2\pi$ | $3\pi - 8$ |

(Find by yourself:

$$\sin(\sin^{-1} 1), \cos(\cos^{-1} 1), \tan(\tan^{-1} 1), \cot(\cot^{-1} 1), \sec(\sec^{-1} 1), \csc(\csc^{-1} 1)=?)$$