高一数学期中
基础知识总复习

集合与逻辑　不等式　函数　指数函数

三节晚自习　　先回忆，再核对，补条件

今晚的复习方式

1. 看标题与回忆提示，先在纸上写出关键词、公式或步骤。
2. 点击显示知识后，用另一种颜色补上遗漏。
3. 每一部分结束，再遮住答案回忆一次。

每条知识都检查三件事：

结论是什么？　　条件是什么？　　哪里容易写错？

第一节晚自习

集合、逻辑与不等式

符号与端点　推导与否定　条件与取等

集合：概念与常用数集

先回忆　回忆集合元素的三个特点，以及五个常用数集的名称。

- 集合是一些确定的对象的全体；其中每个对象叫作元素。
- 元素具有**确定性、互异性、无序性**：是否属于要明确，重复只计一次，排列次序无关。
- $\mathbb{N}$：自然数集；$\mathbb{N}^*$：正整数集；$\mathbb{Z}$：整数集。
- $\mathbb{Q}$：有理数集；$\mathbb{R}$：实数集，且

$$\mathbb{N}^* \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

易错提醒　$0 \in \mathbb{N}$，但 $0 \notin \mathbb{N}^*$；无理数属于 $\mathbb{R}$，不属于 $\mathbb{Q}$。

集合的表示：列举法与描述法

先回忆　列举法写什么？描述法中的竖线两边各写什么？

- **列举法**：把元素逐一列出，放在花括号内；元素之间用逗号隔开。
- **描述法**：$\{x \in M \mid p(x)\}$，表示集合 M 中满足条件 $p(x)$ 的所有元素。
- 竖线左边说明**元素的形式与范围**，右边写**元素满足的条件**。
- 数集可借助数轴表示；集合关系也可借助 Venn 图表示。

易错提醒　先看集合中的元素是什么：数、点或其他对象；花括号不能省略。

元素、子集与空集

先回忆　回忆“属于”“包含”“相等”和空集各自表示什么。

- $a \in A$：元素 a 属于集合 A；$a \notin A$：不属于。
- $A \subseteq B$：A 的每个元素都属于 B。若再有 $A \neq B$，则 $A \subsetneq B$。
- $A = B \iff A \subseteq B$ 且$B \subseteq A$。
- $\varnothing$ 不含任何元素，$\varnothing \subseteq A$；若 $A \neq \varnothing$，则 $\varnothing \subsetneq A$。

易错提醒　$\varnothing$ 是集合，0 是实数，$\{0\}$ 含一个元素；三者不能混同。

区间：先看范围，再看端点

先回忆　回忆四种区间的含义，以及圆括号、方括号的区别。

设 $a < b$，则

$$(a,b) = \{x \mid a < x < b\} \qquad [a,b] = \{x \mid a \le x \le b\}$$
$$[a,b) = \{x \mid a \le x < b\} \qquad (a,b] = \{x \mid a < x \le b\}$$

- 圆括号表示不含端点，数轴上画空心点；方括号表示含端点，画实心点。
- $(-\infty, a)$ 表示 $x < a$；$[a, +\infty)$ 表示 $x \ge a$。

易错提醒　$\pm\infty$ 不是实数端点，旁边一律用圆括号。

并集与交集

先回忆　回忆并集和交集分别保留哪些元素。

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或} x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且} x \in B\}.$$

- **并集**：至少属于一个集合的元素都保留，重复元素只写一次。
- **交集**：只保留两个集合共有的元素；没有共有元素时为 $\varnothing$。
- 有 $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$；若 $A \subseteq B$，则 $A \cap B = A$，$A \cup B = B$。

易错提醒　区间运算先画同一条数轴；每个分界点都要单独检查是否保留。

补集：必须先确定全集

先回忆　回忆补集与全集的关系，以及交、并的补集公式。

设 $A \subseteq U$，则

$$\complement_U A = \{x \mid x \in U \text{ 且 } x \notin A\}.$$

- 补集保留全集 U 中不属于 A 的元素。
- $A \cup \complement_U A = U$，$A \cap \complement_U A = \varnothing$。
- 当 $A, B \subseteq U$ 时，

$$\complement_U(A \cup B) = \complement_U A \cap \complement_U B, \qquad \complement_U(A \cap B) = \complement_U A \cup \complement_U B.$$

易错提醒　全集不一定是 $\mathbb{R}$；先在全集内取补集，再检查有限端点是否保留。

充分条件与必要条件：检查两个方向

先回忆　回忆“充分”“必要”分别对应哪一个推导方向。

- $p \Rightarrow q$：p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件。
- $p \Rightarrow q$ 且 $q \nRightarrow p$：p 是 q 的充分不必要条件。
- $q \Rightarrow p$ 且 $p \nRightarrow q$：p 是 q 的必要不充分条件。
- 两个方向都能推出：充要条件；两个方向都不能推出：既不充分也不必要条件。

易错提醒　先认清“谁是谁的条件”，再分别判断正向、反向；否定某一方向，给一个反例即可。

量词命题及其否定

先回忆　回忆全称、存在量词的含义，以及命题否定的写法。

- $\forall$ 表示“任意一个、所有”；$\exists$ 表示“存在、至少一个”。
- 否定时，**改变量词，否定结论，保留变量范围**：

$$\neg\big(\forall x \in M,\ p(x)\big) \iff \exists x \in M,\ \neg p(x),$$

$$\neg\big(\exists x \in M,\ p(x)\big) \iff \forall x \in M,\ \neg p(x).$$

- $>$ 的否定是 $\leq$；$\geq$ 的否定是 $<$；$=$ 的否定是 $\neq$。

易错提醒　全称命题为假，只需一个反例；存在命题为真，只需一个满足条件的对象。

不等式性质：乘除前先判断符号

先回忆　回忆不等式何时保持方向，何时改变方向。

- 作差比较：$a-b>0 \iff a>b$；$a-b=0 \iff a=b$；$a-b<0 \iff a<b$。
- 两边加减同一个实数，方向不变：$a>b \iff a+c>b+c$。
- 两边乘除同一个正数，方向不变；乘除同一个负数，**方向改变**。
- 若 $a>b,\ c>d$，则 $a+c>b+d$；若再有 $b>0,\ d>0$，则 $ac>bd$。

易错提醒　符号未知的式子不能直接乘除；两条不等式不能随意相减或相除。

二次不等式：两个不相等的实根

先回忆　回忆开口向上、两个不同实根时，图像与不等式解集的联系。

设 $a > 0$，$\Delta = b^2 - 4ac > 0$，方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根为 $x_1 < x_2$。

不等式	解集
$ax^2 + bx + c > 0$	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$
$ax^2 + bx + c < 0$	(x_1, x_2)

- 开口向上时，两根外侧图像在 x 轴上方，两根之间在下方。
- 不等号含等号时，将对应的两个实根补入解集。

易错提醒　若 $a < 0$，可先两边同乘 -1，同时改变不等号方向；不能直接套上表。

二次不等式：重根与没有实根

先回忆　回忆开口向上时，判别式为零或小于零意味着什么。

以下均设 $a > 0$，$\Delta = b^2 - 4ac$。

- $\Delta = 0$：令 $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$，则

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2 \geq 0.$$

  大于零的解集为 $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$；大于等于零的解集为 $\mathbb{R}$。
- 此时小于零的解集为 $\varnothing$；小于等于零的解集为 $\{x_0\}$。
- $\Delta < 0$：对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $ax^2 + bx + c > 0$，图像始终在 x 轴上方。

易错提醒　“方程无实根”不表示“不等式无解”；必须结合开口与不等号判断。

分式不等式：分母为零的点始终排除

先回忆　回忆分式如何化为乘积不等式，以及必须保留的限制。

- 先移项、通分，使一边为零；记录原分母不为零。
- 设 $Q(x) \neq 0$，两边同乘正数 $Q(x)^2$，有

$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0 \iff P(x)Q(x) > 0,$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \iff \begin{cases} P(x)Q(x) \geq 0, \\ Q(x) \neq 0. \end{cases}$$

- 对 $<$、$\leq$ 同理；按各因式零点分段判断乘积符号。

易错提醒　不能直接乘符号未知的分母；约分以后，原分母的限制仍要保留。

基本不等式：公式与等号条件

先回忆　回忆基本不等式的条件、公式和等号成立条件。

- 对 $a, b \geq 0$，有

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \qquad \text{即} a+b \geq 2\sqrt{ab},$$

  当且仅当 $a = b$ 时取等号。
- 平方形式：对任意实数 a, b，有

$$a^2 + b^2 \geq 2ab,$$

  当且仅当 $a = b$ 时取等号。

易错提醒　含根号的公式要检查非负条件；等号条件必须能与原条件同时成立。

基本不等式求最值：定值与取等缺一不可

先回忆　回忆“定积求和的最小值”“定和求积的最大值”各自的条件。

设 $a, b > 0$。

- 若 $ab = p$ 为定值，则 $a + b \geq 2\sqrt{p}$；当且仅当 $a = b = \sqrt{p}$ 时，和取最小值。
- 若 $a + b = s$ 为定值，则 $ab \leq \dfrac{s^2}{4}$；当且仅当 $a = b = \dfrac{s}{2}$ 时，积取最大值。
- 使用前依次检查：**比较量为正；和或积为定值；等号能够取到**。

易错提醒　只得到一个上界或下界，还不能宣布最值；必须写出可取到等号的条件。

第一节回忆：符号、端点与条件

先回忆　遮住前面的知识，独立写出关键内容，再回看补漏。

1. 属于、包含、交、并、补分别怎样表示？
2. 区间端点怎样决定开闭？补集为什么要看全集？
3. 充分与必要怎样看推导方向？量词命题怎样否定？
4. 二次不等式怎样结合开口与判别式？分式有什么限制？
5. 基本不等式使用前检查什么？等号什么时候成立？

回看补漏：圈出自己漏掉的条件，补写完整。

第二节晚自习

函数的概念与性质

定义域与值域　单调性与奇偶性　基本图像

函数：每个输入都有唯一确定的输出

先回忆　函数的“任意一个”“唯一确定”分别约束什么？

- 设 A, B 是非空实数集。对 A 中**任意一个**数 x，按对应关系 f，在 B 中都有**唯一确定**的数 y 与它对应。
- 记作 $y = f(x)$。定义域是输入 x 的集合；值域是**实际得到**的函数值的集合。
- 三要素：**定义域、对应关系、值域**。
- 判断相同函数：看**定义域与对应关系**是否分别相同。

易错提醒　不同的输入可以得到相同输出；值域不一定等于集合 B。

定义域：先保证整个解析式有意义

先回忆　分式、偶次根式、指数式分别有哪些输入限制？

- 分式：**分母不等于零**。
- 偶次根式：**被开方数大于或等于零**。
- 整式通常对任意实数有意义；$a^{g(x)}$ 在 $a>0$ 时，需先保证 $g(x)$ 有意义。
- 多个限制同时出现：把全部条件联立，**取交集**；实际问题还要符合实际意义。

易错提醒　题目已经给出定义域或自变量范围时，还要保留该范围。

函数表示与分段函数求值

先回忆　看见分段函数时，代入以前要先做什么？

- 三种常用表示方法：**解析法、图象法、列表法**。
- 分段函数：在定义域的不同部分，用不同的解析式表示**同一个函数**。
- 求值步骤：**先看输入落在哪一段，再选对应的式子，最后代入计算**。
- 出现 $f(f(x))$：先求里面的 $f(x)$，再把所得结果作为新的输入，重新选段。

易错提醒　分界点属于哪一段，由条件中的等号决定；第二次输入可能换段。

值域：收集实际能够取得的函数值

先回忆　定义域看输入，值域看什么？端点能否取得怎样判断？

- 值域是 $\{f(x) \mid x \in D\}$，其中 D 是定义域。
- 从图象读值域：看图象在**竖直方向**覆盖了哪些数值。
- 从解析式求值域：结合输入范围，利用配方、单调性或基本函数性质。
- 写区间前检查：边界值**能否由定义域中的某个输入取得**；$\pm\infty$ 一律用圆括号。

易错提醒　找到一个上界或下界，还要检查它是否为实际边界、能否取到。

单调性：在指定区间内比较大小

先回忆 “任意 $x_1 < x_2$”时，递增和递减分别对应什么大小关系？

设 I 是定义域内的一个区间。**对任意** $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$，若都有下面的大小关系，则有对应的单调性：

$$f(x_1) < f(x_2) \quad \Longrightarrow \quad f \text{在} I \text{上严格递增;}$$
$$f(x_1) > f(x_2) \quad \Longrightarrow \quad f \text{在} I \text{上严格递减.}$$

- 读图：**从左往右**看，图象上升为递增，下降为递减。
- 单调区间写**横坐标的范围**，并检查区间是否在定义域内。

易错提醒 分别在两个区间上递增或递减，不能直接合并成一个结论。

用定义证明单调性：任取、作差、定号

先回忆　定义证明中，怎样体现结论对区间内所有输入都成立？

1. **任取** $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$。
2. **作差**：写出 $f(x_1) - f(x_2)$。
3. **变形、定号**：因式分解、通分或有理化；结合 $x_1 < x_2$ 与区间条件判断差的正负。
4. **下结论**：差小于零则递增，差大于零则递减，并写明区间 I。

易错提醒　千万不要代入两个具体数字，再比较两个函数值来证明单调性。

最值：既要比较所有函数值，也要能够取到

先回忆 “始终不超过 M”为什么还不足以说明最大值是 M?

- 最大值：对所有 $x \in D$，都有 $f(x) \le M$，且**存在** $x_0 \in D$ 使 $f(x_0) = M$。
- 最小值：对所有 $x \in D$，都有 $f(x) \ge m$，且**存在** $x_0 \in D$ 使 $f(x_0) = m$。
- 二次函数在固定闭区间上求最值：**配方找顶点，检查顶点是否在区间内，比较端点及区间内顶点的函数值**。

易错提醒 最值是函数值；取得最值时的 x 是自变量，两者分开写。

奇偶性：先检查定义域，再比较函数值

先回忆　奇函数、偶函数的定义都有哪些前提？

- 定义域关于原点对称：任意 $x \in D$，都有 $-x \in D$。
- 偶函数：对定义域中任意 x，都有 $f(-x) = f(x)$；图象关于 y **轴**对称。
- 奇函数：对定义域中任意 x，都有 $f(-x) = -f(x)$；图象关于**原点**对称。
- 定义域不关于原点对称时，函数**非奇非偶**。

易错提醒　定义域对称是必要条件，仅凭定义域对称不能判断函数奇偶性。

判断奇偶性与利用奇偶性

先回忆　判断时要写哪几步？已知一侧的函数值，怎样得到另一侧？

1. 写定义域，检查它是否关于原点对称。
2. 计算 $f(-x)$，与 $f(x)$ 比较；得到 $f(-x)=f(x)$ 或 $f(-x)=-f(x)$，再下结论。
3. 定义域对称，但两种关系都不能对所有 x 成立时，判为非奇非偶。

- 偶函数：$f(-a)=f(a)$；奇函数：$f(-a)=-f(a)$，其中 $a\in D$。
- 奇函数**在 0 处有定义时**，一定有 $f(0)=0$。

易错提醒　少数输入处满足关系不能代替“任意 x”；零函数同时是奇函数和偶函数。

幂函数：自变量在底数位置

先回忆　幂函数的一般形式是什么？五个基本幂函数分别是什么？

- 一般形式：$y = x^{\alpha}$，其中 x 是自变量，α 是常数。
- 五个基本幂函数：


$$y = x, \quad y = x^2, \quad y = x^3, \quad y = \sqrt{x}, \quad y = \frac{1}{x}.$$

- 定义域由指数 α 和式子有意义的条件决定，**不能统一写成** $\mathbb{R}$。
- 指数函数 $y = a^x$ 中，自变量在**指数**位置。


易错提醒　识别幂函数要看是否符合 $y = x^{\alpha}$；式子前面的系数也要检查。

基本幂函数：$y = x$ 与 $y = x^2$

先回忆　看图回忆：定义域、值域、奇偶性、单调区间。



定义域、值域均为 $\mathbb{R}$。
奇函数；在 $\mathbb{R}$ 上递增。




定义域 $\mathbb{R}$；值域 $[0, +\infty)$。
偶函数；在 $(-\infty, 0]$ 上递减，
在 $[0, +\infty)$ 上递增。


易错提醒　$y = x^2$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上没有同一种单调性。

基本幂函数：立方函数与平方根函数

先回忆 哪个函数只允许非负输入？哪个函数的图象关于原点对称？



定义域、值域均为 $\mathbb{R}$。
奇函数；在 $\mathbb{R}$ 上递增。




定义域、值域均为 $[0, +\infty)$。
非奇非偶；在 $[0, +\infty)$ 上递增。

易错提醒 $\sqrt{x}$ 的定义域不关于原点对称；定义域和值域都包含 0。

基本幂函数：$y = \dfrac{1}{x}$

先回忆　定义域、值域为什么排除 0？单调性要怎样分段表述？



- 定义域：$\mathbb{R} \setminus \{0\}$。
- 值域：$\mathbb{R} \setminus \{0\}$。
- 奇函数；图象关于原点对称。
- 在 $(-\infty, 0)$、$(0, +\infty)$ **上分别递减**。

易错提醒　不能说它在整个定义域上递减；函数图象与两条坐标轴均无交点。

第二节回忆：输入、输出与性质

先回忆　遮住前面的知识，独立写出关键词，再回看补漏。

1. 定义域、值域分别是什么？怎样检查解析式是否有意义？
2. 分段函数求值为什么先选段？
3. 单调性定义与证明怎样体现“任意”？
4. 判断奇偶性先检查什么，再比较什么？
5. 五个基本幂函数的图像与主要性质分别是什么？

回看补漏：区间范围、端点、任意性、定义域对称、分段表述。

第三节晚自习

根式、指数幂与指数函数

根式与绝对值　运算法则　图像与性质

根与根式：奇次、偶次要分清

先回忆　奇次根与偶次根有什么不同？偶次根式表示哪个根？

- 若 $x^n = a$（$n \geq 2$ 为整数），则 x 是 a 的 n 次方根。
- n 为奇数：任意实数 a 都有唯一的实数根，记作 $\sqrt[n]{a}$。
- n 为偶数：$a > 0$ 有两个互为相反数的实数根；$a = 0$ 只有根 0；$a < 0$ 没有实数根。
- 偶次根式 $\sqrt[n]{a}$ 表示**非负的根**，要求 $a \geq 0$。

易错提醒　“偶次方根”与“偶次算术根”要分清；根式前没有 $\pm$。

开方与绝对值

先回忆　先乘方再开方，结果一定等于原来的数吗？

设 $n \geq 2$ 为整数。对任意实数 u，有

$$\sqrt[n]{u^n} = \begin{cases} u, & n \text{ 为奇数}, \\ |u|, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

$$\boxed{\sqrt{u^2} = |u|} \qquad |u| = \begin{cases} u, & u \geq 0, \\ -u, & u < 0. \end{cases}$$

去绝对值的顺序：先由条件判断内部式子的正负，再去绝对值。

易错提醒　偶次根式的结果非负；不能直接把 $\sqrt{u^2}$ 写成 u。

零指数与负指数

先回忆　零指数幂的条件是什么？负指数表示什么？

- 零指数：$\boxed{a^0 = 1 \quad (a \neq 0)}$。
- 负指数：$\boxed{a^{-r} = \dfrac{1}{a^r} \quad (a > 0,\ r > 0)}$。
- 若指数为整数，负底数也可运算，但底数必须非零。
- 0 的正指数幂为 0；本课程中 0^0、0 的负指数幂无意义。

易错提醒　负指数表示取倒数；它不表示在结果前添负号。

根式与分数指数幂互化

先回忆　分数指数的分母、分子分别对应什么？

统一在 $a>0$ 下：m,n 为正整数，且 $n>1$。

$$\boxed{a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}=(\sqrt[n]{a})^m}$$

分母 n 表示**开 n 次方**，分子 m 表示**乘 m 次方**。

$$a^{-\frac{m}{n}}=\frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}=\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}.$$

易错提醒　先检查底数条件；带负号的分数指数还要取倒数。

指数运算法则

先回忆　同底相乘、相除、幂的乘方，指数分别怎样运算？

以下统一设 $a, b > 0$，$r, s \in \mathbb{R}$：

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \qquad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s},$$

$$(a^r)^s = a^{rs}, \qquad (ab)^r = a^r b^r,$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}.$$

易错提醒　相加没有“指数相加”的法则；$(a+b)^r$ 也不能按积的乘方法则拆开。

根式与指数幂：整理顺序

先回忆　面对含根号、负指数、小数和括号的式子，先检查什么？

1. **看条件**：底数是否允许，分母是否为零，偶次根式是否有意义。
2. **先整理底数**：小数化分数，带分数化假分数，尽量化为幂。
3. **再整理指数**：根式与分数指数统一，负指数化为倒数。
4. **按顺序运算**：有括号先算括号内；先乘方，再乘除，最后加减。

易错提醒　负底数的整数次幂先看括号、再看奇偶；偶次根式化简别漏绝对值。

指数函数的定义

先回忆　指数函数中，谁是自变量？底数需要满足什么条件？

$$\boxed{y = a^x \qquad (a > 0 \text{ 且} a \neq 1)}$$


- a 是**固定的底数**，自变量 x 在指数的位置。
- 幂函数 $y = x^\alpha$ 中，自变量在底数的位置，指数 α 为常数。
- 识别函数类型时，核对**完整形式**和**条件**。

易错提醒　底数的两个条件都要写；$y = a^x$ 与 $y = x^a$ 的性质不同。


指数函数的两类图像

先回忆　底数大于 1 与小于 1，图像各怎样变化？共同经过哪里？

$a > 1$：从左向右上升



$0 < a < 1$：从左向右下降



共同性质：定义域 $\mathbb{R}$，值域 $(0, +\infty)$，图像过 $(0, 1)$。

易错提醒　图像始终在 x 轴上方，函数值永远取不到 0。

指数函数的单调性与比较大小

先回忆　相同底数时，什么时候指数较大，函数值也较大？

设 $u, v \in \mathbb{R}$，则

底数	单调性	比较规则
$a > 1$	在$\mathbb{R}$ 上递增	$a^u > a^v \iff u > v$
$0 < a < 1$	在$\mathbb{R}$ 上递减	$a^u > a^v \iff u < v$

比较步骤：先看底数，尽量化为同底，再按单调性比较指数。

易错提醒　“去掉同底幂”之前，必须判断底数在哪个范围。

指数函数：范围与对称性

先回忆　指数函数有没有最大值、最小值？两条互为倒数底数的曲线怎样对称？

对 $y = a^x$（$a > 0$ 且 $a \neq 1$），在整个定义域 $\mathbb{R}$ 上：

- 值域为 $(0, +\infty)$，没有最大值，也没有最小值。
- 是**非奇非偶函数**。
- $y = a^x$ 与 $y = a^{-x} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^x$ 的图像关于 y **轴**对称。

易错提醒　“互为倒数”是两式的关系；它不表示其中一条曲线关于 y 轴对称。

第三节回忆：指数幂与指数函数

先回忆　先遮住知识内容，独立写出下列规则的完整形式与条件。

1. 偶次根式化简时，绝对值出现在哪里？
2. 零指数、负指数、分数指数各怎样理解？
3. 同底乘除与幂的乘方，指数各怎样运算？
4. 指数函数的底数条件、定义域、值域、定点是什么？
5. 两类底数分别对应怎样的单调性？

对照前页补漏：条件、符号、括号、绝对值、增减方向。

最后十分钟：整理自己的遗漏

1. 从今晚补写的内容中，选出自己仍记不牢的几条。
2. 每条写完整：**知识结论＋使用条件＋易错位置**。
3. 遮住完整内容，再独立写一遍，随后对照修正。

考试书写检查：

范围与端点　不等号方向　分母与根号　等号与条件