

2022 年高考数学全国甲卷-文科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。


1. (5 分) 设集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x < \frac{5}{2}\}$, 则 $A \cap B =$

A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{-2, -1, 0\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{1, 2\}$

解答 答案: A

□

2. (5 分) 某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识. 为了解讲座效果, 随机抽取 10 位社区居民, 让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷, 这 10 位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图:
- 则



- A. A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70
- B. B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85
- C. C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差
- D. D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

解答 答案: B

□

3. (5 分) 若 $z = 1 + i$, 则 $|iz + 3z| =$

A. $4\sqrt{5}$ B. $4\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{2}$

解答 答案: D

□

4. (5 分) 如图, 网格纸上绘制的是一个多面体的三视图, 网格小正方形的边长为 1, 则该多面体的体积为

A. A. 8 B. B. 12 C. C. 16 D. D. 20

解答 答案: B

□

5. (5 分) 将函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$) 的图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 C , 若 C 关于 y 轴对称, 则 ω 的最小值是

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

解答 答案: C

□


6. (5 分) 从分别写有 1, 2, 3, 4, 5, 6 的 6 张卡片中无放回随机抽取 2 张, 则抽到的 2 张卡片上的数字之积是 4 的倍数的概率为

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{2}{3}$

解答 答案: C

□

7. (5 分) 函数 $f(x) = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的图像大致为



A. A. B. B. C. C. D. D.

解答 答案: A

□

8. (5 分) 当 $x = 1$ 时, 函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x}$ 取得最大值 -2 , 则 $f'(2) =$

A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

解答 答案: B

□

9. (5 分) 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角均为 30° , 则

A. A. $AB = 2AD$
 B. B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 30°
 C. C. $AC = CB_1$
 D. D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 45°

解答 答案: D

□

10. (5 分) 甲、乙两个圆锥的母线长相等, 侧面展开图的圆心角之和为 2π , 侧面积分别为 $S_{\text{甲}}$ 和 $S_{\text{乙}}$, 体积分别为 $V_{\text{甲}}$ 和 $V_{\text{乙}}$. 若 $\frac{S_{\text{甲}}}{S_{\text{乙}}} = 2$, 则 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} =$

A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{10}$ D. $\frac{5\sqrt{10}}{4}$

解答 答案: C

□

11. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{3}$, A_1, A_2 分别为 C 的左、右顶点, B 为 C 的上顶点. 若 $\overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{BA_2} = -1$, 则 C 的方程为

A. $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{16} = 1$ B. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ C. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

解答 答案: B

□

12. (5 分) 已知 $9^m = 10, a = 10^m - 11, b = 8^m - 9$, 则
 A. $a > 0 > b$ B. $a > b > 0$ C. $b > a > 0$ D. $b > 0 > a$

解答 答案: A

□

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (m, 3), \mathbf{b} = (1, m+1)$. 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m = \underline{-\frac{3}{4}}$

解答 答案: $-\frac{3}{4}$

□

14. (5 分) 设点 M 在直线 $2x + y - 1 = 0$ 上, 点 $(3, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均在 $\odot M$ 上, 则 $\odot M$ 的方程为 $\underline{(x-1)^2 + (y+1)^2 = 5}$

解答 答案: $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 5$

□

15. (5 分) 记双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 e , 写出满足条件“直线 $y = 2x$ 与 C 无公共点”的 e 的一个值 $\underline{2}$ (满足 $1 < e \leq \sqrt{5}$ 皆可)

解答 答案: 2 (满足 $1 < e \leq \sqrt{5}$ 皆可)

□

16. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, $\angle ADB = 120^\circ, AD = 2, CD = 2BD$. 当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时, $BD = \underline{\sqrt{3} - 1}$

解答 答案: $\sqrt{3} - 1$

□

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17 21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) 甲、乙两城之间的长途客车均由 A 和 B 两家公司运营, 为了解这两家公司长途客车的运行情况, 随机调查了甲、乙两城之间的 500 个班次, 得到下面列联表:

	准点班次数 未准点班次数
A	240 20
B	210 30

(1) 根据上表, 分别估计这两家公司甲、乙两城之间的长途客车准点的概率;

(2) 能否有 90

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$

$P(K^2 \geq k) | 0.100 | 0.050 | 0.010$

— | — | — | —

$k | 2.706 | 3.841 | 6.635$

解答 答案: (1) A 公司准点概率 $\frac{12}{13}$, B 公司准点概率 $\frac{7}{8}$; (2) 有 90

□

18. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $\frac{2S_n}{n} + n = 2a_n + 1$.

(1) 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列;

(2) 若 a_4, a_7, a_9 成等比数列, 求 S_n 的最小值.


解答 答案: (1) 证明见解析; (2) -78

□

19. (12 分) 小明同学参加综合实践活动, 设计了一个封闭的包装盒, 包装盒如图所示: 底面 $ABCD$ 是边长为 8 (单位: cm) 的正方形, $\triangle EAB, \triangle FBC, \triangle GCD, \triangle HDA$ 均为正三角形, 且它们所在的平面都与平面 $ABCD$ 垂直.

(1) 证明: $EF \parallel$ 平面 $ABCD$;

(2) 求该包装盒的容积 (不计包装盒材料的厚度).



解答 答案: (1) 证明见解析; (2) $\frac{640}{3}\sqrt{3}$

□

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - x, g(x) = x^2 + a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线也是曲线 $y = g(x)$ 的切线.

(1) 若 $x_1 = -1$, 求 a ;

(2) 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) $a = 3$; (2) $[-1, +\infty)$

□

21. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β . 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程.

解答 答案: (1) $y^2 = 4x$; (2) $x = 2y + 4$

□

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{2+t}{6} \\ y = \sqrt{t} \end{cases}$ (t 为参数), 曲线 C_2

的参数方程为 $\begin{cases} x = -\frac{2+s}{6} \\ y = -\sqrt{s} \end{cases}$ (s 为参数).

(1) 写出 C_1 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_3 的极坐标方程为 $2\cos\theta - \sin\theta = 0$, 求 C_3 与 C_1 交点的直角坐标, 及 C_3 与 C_2 交点的直角坐标.

解答 答案: (1) $y^2 = 6x - 2$ ($y \geq 0$); (2) C_3 与 C_1 的交点坐标为 $(\frac{1}{2}, 1), (1, 2)$; C_3 与 C_2 的交点坐标为 $(-\frac{1}{2}, -1), (-1, -2)$ $\square$

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 均为正数, 且 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$, 证明:

(1) $a + b + 2c \leq 3$;

(2) 若 $b = 2c$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$.

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) 证明见解析 $\square$