

绝密★启用前

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

理科数学

本试卷共 5 页，23 题(含选考题)。全卷满分 150 分。考试用时 120 分钟。

★祝考试顺利★

注意事项：

- 1.答题前，先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
- 2.选择题的作答：每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
- 3.非选择题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
- 4.选考题的作答：先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用 2B 铅笔涂黑。答案写在答题卡上对应的答题区域内，写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
- 5.考试结束后，请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.若 $z=1+i$ ，则 $|z^2-2z|$ =

A.0 B.1 C. $\sqrt{2}$ D.2

2.设集合 $A=\{x|x^2-4\leq 0\}$ ， $B=\{x|2x+a\leq 0\}$ ，且 $A\cap B=\{x|-2\leq x\leq 1\}$ ，则 a =

A.-4 B.-2 C.2 D.4

3.埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一，它的形状可视为一个正四棱锥。以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积，则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为




- A. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

4. 已知为抛物线 $C: y^2=2px(p>0)$ 上一点，点 A 到 C 的焦点的距离为 12，到 y 轴的距离为 9，则 $p=$

- A. 2 B. 3 C. 6 D. 9

5. 某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率 y 和温度 x (单位: $^{\circ}\text{C}$) 的关系，在 20 个不同的温度条件下进行种子发芽实验，电邮实验数 $(x_i, y_i) (i=1, 2, \dots, 20)$ 得到下面的散点图：




由此散点图，在 10°C 40°C 之间，下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是

- A. $y=a+bx$ B. $y=a+bx^2$ C. $y=a+be^x$ D. $y=a+b\ln x$

6. 函数 $f(x)=x^4-2x^3$ 的图像在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为

- A. $y=-2x-1$ B. $y=-2x+1$ C. $y=2x-3$ D. $y=2x+1$

7. 设函数 $f(x)=\cos(\omega x + \frac{\pi}{6})$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致如下图，则 $f(x)$ 的最小正周期为



- A. $\frac{10\pi}{9}$ B. $\frac{7\pi}{6}$ C. $\frac{4\pi}{3}$ D. $\frac{3\pi}{2}$

8. $(x + \frac{y^2}{x})(x+y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为

- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

9. 已知 $a \in (0, \pi)$ ，且 $3\cos 2a - 8\cos a = 5$ ，则 $\sin a =$

- A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{9}$

10. 已知 A, B, C 为球 O 的球面上的三个点， $\odot O_1$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆，若 $\odot O_1$ 的面积为 4π ，

$AB=BC=AC=OO_1$ ，则球 O 的表面积为

- A. 64π B. 48π C. 36π D. 32π

11. 已知 $\odot M: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ ，直线 $l: 2x + y + 2 = 0$ ， P 为 l 上的动点，过点 P 作 $\odot M$ 的切线 PA, PB ，切点为 A, B ，当 $|PM| \cdot |AB|$ 最小时，直线 AB 的方程为

- A. $2x - y - 1 = 0$ B. $2x + y - 1 = 0$ C. $2x - y + 1 = 0$ D. $2x + y + 1 = 0$

12. 若 $2^a + \log_2 a = 4^b + 2\log_4 b$ ，则

- A. $a > 2b$ B. $a < 2b$ C. $a > b^2$ D. $a < b^2$

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。


13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y - 2 \leq 0 \\ x - y - 1 \geq 0 \\ y + 1 \geq 0 \end{cases}$ ，则 $z = x + 7y$ 的最大值为_____。

14. a, b 为单位向量，且 $|a + b| = 1$ ，则 $|a - b| =$ _____。

15. 已知 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点， A 为 C 的右顶点， B 为 C 上的点，

且 BF 垂直于 x 轴。若 AB 的斜率为 3，则 C 的离心率为_____。

16. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 的平面展开图中， $AC=1$ ， $AB=AD=\sqrt{3}$ ， $AB \perp AC$ ， $AB \perp AD$ ， $\angle CAE = 30^\circ$ ，则 $\cos \angle FCB =$ _____。



三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

(一)必考题：共 60 分。

17.(12 分)


设 $\{a_n\}$ 是公比不为 1 的等比数列， a_1 为 a_2, a_3 的等差中项。

(1)求 $\{a_n\}$ 的公比；

(2)若 $a_1=1$ ，求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和。

18.(12 分)

如图， D 为圆锥的顶点， O 是圆锥底面的圆心， AE 为底面直径， $AE=AD$ 。 $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形， P 为 DO 上一点， $PO=\frac{\sqrt{6}}{6}DO$ 。



(1)证明： $PA \perp$ 平面 PBC ；

(2)求二面角 $B-PC-E$ 的余弦值。

19.(12 分)

甲、乙、丙三位同学进行羽毛球比赛，约定赛制如下：

累计负两场者被淘汰；比赛前抽签决定首先比赛的两人，另一人轮空；每场比赛的胜者与轮空者进行下一场比赛，负者下一场轮空，直至有一人被淘汰；当一人被淘汰后，剩余的两人继续比赛，直至其中一人被淘汰，另一人最终获胜，比赛结束。

经抽签，甲、乙首先比赛，丙轮空。设每场比赛双方获胜的概率都为 $\frac{1}{2}$ 。

(1)求甲连胜四场的概率；

(2)求需要进行第五场比赛的概率；

(3)求丙最终获胜的概率。

20.(12 分)

已知 A, B 分别为椭圆 E: $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左、右顶点, G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB}$

$= 8$ 。P 为直线 $x=6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C, PB 与 E 的另一交点为 D。

(1)求 E 的方程；

(2)证明：直线 CD 过定点。

21.(12 分)

已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - x$ 。

(1)当 $a=1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 求 a 的取值范围。

(二)选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

22.[选修 4-4：坐标系与参数方程](10 分)

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos^k t \\ y = \sin^k t \end{cases}$ (t 为参数)。以坐标原点为极点,


x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $4\rho\cos\theta - 16\rho\sin\theta + 3 = 0$ 。

(1)当 $k=1$ 时, C_1 是什么曲线？

(2)当 $k=4$ 时, 求 C_1 与 C_2 的公共点的直角坐标。

23.[选修 4-5: 不等式选讲](10 分)

已知函数 $f(x)=|3x+1|-2|x-1|$ 。



(1)画出 $y=f(x)$ 的图像;

(2)求不等式 $f(x)>f(x+1)$ 的解集。

答案

1D 2B 3C 4C 5D 6B 7C 8C 9A 10A 11D 12B

13.1

14. $\sqrt{3}$

15.2

16. $-\frac{1}{4}$

17.

【答案】: (1) $q = -2$; (2) $S_n = \left(-\frac{1}{3}n - \frac{1}{9}\right) \cdot (-2)^n + \frac{1}{9}$

18

【答案】: (1) 见解析; (2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】: (1) 不妨设 $\odot O$ 半径为 1, $OA = OB = OC = 1$

$$AE = AD = 2, AB = BC = AC = \sqrt{3}, DO = \sqrt{DA^2 - OA^2} = \sqrt{3}, PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$PA = PB = PC = \sqrt{PO^2 + AO^2} = \frac{\sqrt{6}}{2}, \text{ 在 } \triangle PAC \text{ 中, } PA^2 + PC^2 = AC^2, \text{ 故 } PA \perp PC, \text{ 同理可得}$$

$PA \perp PB$, 又 $PB \cap PC$, 故可得 $PA \perp$ 平面 PBC .

19

【答案】: (1) $\frac{1}{16}$; (2) $\frac{9}{32}$; (3) $\frac{9}{32}$.

20

【答案】: (1) $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$; (2) $(\frac{3}{2}, 0)$.

21

【答案】: (1) $f(x)$ 的单调增区间为 $(0, +\infty)$, 减区间为 $(-\infty, 0)$; (2) $a \geq \frac{7-e^2}{4}$

22

【答案】: (1) 以原点为圆心, 以 1 为半径的圆; (2) $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.