

---

## 7-3 图的矩阵表示

---

# 主要内容

---

- 邻接矩阵
- 矩阵运算的解释
- 可达性矩阵
- 完全关联矩阵

# 图的矩阵表示

---

矩阵是研究图的一种有力工具，特别是利用计算机来处理有关图的算法时，首先遇到的难题是如何识别图？在前面我们也用有向图来表示集合 $A$ 中元素的关系 $R$ ，这种图被称为关系图，表示了集合 $A$ 中元素的邻接关系，只要将集合 $A$ 中的元素进行编号，这样的邻接关系同样可以用矩阵表示。识别一个图等价于识别一个矩阵。我们要讨论前面的有关图的概念，如何在矩阵中表达出来。

# 邻接矩阵

---

我们讨论的是简单图，并令图的结点已经编号。

## 定义7-3.1

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为简单图，它有 $n$ 个结点 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，则 $n$ 阶方阵 $A(G) = (a_{ij})$ 称为 $G$ 的邻接矩阵。

其中


$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ } adj \text{ } v_j; \\ 0, & v_i \text{ } nadj \text{ } v_j, \text{ 或 } i = j. \end{cases}$$

$adj$  表示邻接， $nadj$  表示不邻接。

# 邻接矩阵

若为无向简单图，则

- $A(G)$  是对称的;
- 对角线为0;



$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 第 $i$ 行中值为1的元素数目等于 $v_i$ 的度数，第 $j$ 列中值为1的元素数目等于 $v_j$ 的度数，即

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = \deg(v_i) \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} = \deg(v_j)$$


# 邻接矩阵

---

无向简单图的邻接矩阵是对称的，那么有向图呢？

# 邻接矩阵

若为有向简单图，则



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- $A(G)$  不一定是对称的;
- 对角线为0;
- 第 $i$ 行中值为1的元素数目等于  $v_i$  的出度, 第 $j$ 列中值为1的元素数目等于  $v_j$  的入度, 即

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = \deg^+(v_i) \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} = \deg^-(v_j)$$

# 矩阵中点的入度和出度



---

- 从邻接矩阵 $A$ 中表示了图的基本概念和许多图的性质。第 $i$ 行的元素是由结点 $v_i$ 出发的边所决定的，第 $i$ 行第 $j$ 列为1的元素，表示了在 $v_i$ 和 $v_j$ 之间有边相连，即存在 $(v_i, v_j)$ ；第 $i$ 行中值为1的元素的数目等于从 $v_i$ 出发的出度；第 $j$ 列中值为1的元素的数目等于从 $v_j$ 进入的入度。
- 如果给定的图是零图，则其对应的矩阵中所有的元素都为零，它是一个零矩阵，反之亦然，即邻接矩阵为零矩阵的图必是零图。



# 邻接矩阵

- 图 $G$ 的邻接矩阵显然与结点标定的次序有关，例如在图7-3.1的两个图(b)与图(c)中的结点 $v_1$ 和 $v_2$ 的次序对调，那么新的邻接矩阵由原来的邻接矩阵的第一行和第二行对调，第一列和第二列对调而得到。




# 邻接矩阵

---

- 一般地说，我们把一个 $n$ 阶方阵 $A$ 的某些列作一置换，再把相应的行作同样的置换，得到一个新的 $n$ 阶方阵 $A'$ ，我们称 $A$ 和 $A'$ 为**置换等价**。有向图的结点，按不同次序所写出来的邻接矩阵是彼此置换等价的，今后我们略去这种元素次序的任意性，可取任何一个邻接矩阵作为该图的矩阵表示。

# 矩阵运算的解释

设有向图G, 其邻接矩阵A,



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$


$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

# $AA^T$ 矩阵的解释

## (1) $AA^T$ 中元素的意义

设  $B=[b_{ij}]=AA^T$  则 
$$b_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk}$$

当且仅当  $a_{ik}$  和  $a_{jk}$  都是1时,  $a_{ik} \cdot a_{jk}=1$ 。 $a_{ik}=1$  和  $a_{jk}=1$  表示存在边  $\langle v_i, v_k \rangle$  和  $\langle v_j, v_k \rangle$ 。于是, 从结点  $v_i$  和  $v_j$  两点引出的边, 如果能共同终止于一些结点, 这些终止结点的数目就是  $b_{ij}$  的值; 当  $i=j$  时, 对角线上的元素  $b_{ii}$  就是结点  $v_i$  的引出次数(出度)。




$$AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

# $A^T A$ 矩阵的解释

## (2) $A^T A$ 中元素的意义

设  $B = [b_{ij}] = A^T A$  则  $b_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj}$

当且仅当  $a_{ki}$  和  $a_{kj}$  都是1时,  $a_{ki} \cdot a_{kj} = 1$ 。  $a_{ki} = 1$  和  $a_{kj} = 1$  表示存在边  $\langle v_k, v_i \rangle$  和  $\langle v_k, v_j \rangle$ 。于是, 从一些结点引出的边, 如果同时终止于  $v_i$  和  $v_j$ , 则这些结点的数目就是  $b_{ij}$  的值; 当  $i = j$  时, 对角线上的元素  $b_{ii}$  就是结点  $v_i$  的引入次数。



$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

# 矩阵运算的解释

---

思考：

- $A^n$  中元素的含义？
- $A + A^2 + A^3 + \dots + A^n$  中元素的含义？

# 结点间的路

用图形表示图的方法，关于结点间的路很容易在图形中看出来，但在邻接矩阵中就需经过计算。设有向图 $G$ 的结点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，它的邻接矩阵为： $A(G)=(a_{ij})_{n \times n}$ ，现在我们来计算从结点 $v_i$ 到结点 $v_j$ 的长度为2的路的数目。注意到每条从结点 $v_i$ 到结点 $v_j$ 的长度为2的路的中间必经过一个结点 $v_k$ ，即 $v_i \rightarrow v_k \rightarrow v_j (1 \leq k \leq n)$ ，如果图中有路 $v_i v_k v_j$ 存在，那么 $a_{ik}=a_{kj}=1$ ，即 $a_{ik} \cdot a_{kj}=1$ ，反之如果图 $G$ 中不存在路 $v_i v_k v_j$ ，那么 $a_{ik}=0$ 或 $a_{kj}=0$ ，即 $a_{ik} \cdot a_{kj}=0$ ，于是从结点 $v_i$ 到结点 $v_j$ 的长度为2的路的数目等于：

$$a_{i1} \cdot a_{1j} + a_{i2} \cdot a_{2j} + \dots + a_{in} \cdot a_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot a_{kj}$$

# 结点间的路

按照矩阵的乘法规则，这恰好是矩阵  $(A(G))^2$  中的第*i*行，第*j*列的元素。

$$(a_{ij}^{(2)})_{n \times n} = (A(G))^2 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$



# 结点间的路

---

- $(a_{ij}^{(2)})$  表示从结点  $v_i$  到结点  $v_j$  的长度为2的**路的数目**。
- $(a_{ii}^{(2)})$  表示从结点  $v_i$  到结点  $v_i$  的长度为2的**回路的数目**。

# 结点间的路

---

- 那么图中长度为3的路如何计算？
- 从结点 $v_i$ 到结点 $v_j$ 的一条长度为3的路，可以看作从结点 $v_i$ 到结点 $v_k$ 的长度为1的路，在联结从结点 $v_k$ 到结点 $v_j$ 的长度为2的路，故从结点 $v_i$ 到结点 $v_j$ 的一条长度为3的路的数目：

$$a_{ij}^{(3)} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \bullet a_{kj}^{(2)}$$

# 结点间的路


即  $(a_{ij}^{(3)})_{n \times n} = (A(G))^3 = (A(G)) \bullet (A(G))^2$  。

一般地有

$$(a_{ij}^{(l)})_{n \times n} = (A(G))^l = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \underbrace{\cdots}_{l-2} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

上述这个结论对无向图也成立。

# 结点间的路



在上图中， $v_2$ 到 $v_1$ 有两条长度为2的路径，且它们之间距离为2； $v_3$ 到 $v_3$ 有1条长度为3的回路。 $v_4$ 到 $v_3$ 没有长度为2的路径。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

# 结点间的路

---

**定理7-3.1** 设 $A(G)$ 为图 $G$ 的邻接矩阵，则 $(A(G))^l$ 中的 $i$ 行 $j$ 列元素等于 $G$ 中联结 $v_i$ 与 $v_j$ 的长度为 $l$ 的路的数目。

证明 对 $l$ 施归纳法

当 $l=2$ 时，由上得知是显然成立。

设命题对 $l$ 成立，由  $(A(G))^{l+1} = A(G) \bullet (A(G))^l$

故

$$a_{ij}^{(l+1)} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot a_{kj}^{(l)}$$

# 结点间的路

---

$$a_{ij}^{(l+1)} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot a_{kj}^{(l)}$$

根据邻接矩阵的定义 $a_{ik}$ 表示联结 $v_i$ 与 $v_k$ 长度为1的路的数目，而是联结 $v_k$ 与 $v_j$ 长度为 $l$ 的路的数目，上式的每一项表示由 $v_i$ 经过一条边到 $v_k$ ，再由 $v_k$ 经过长度为 $l$ 的路到 $v_j$ 的，总长度为 $l+1$ 的路的数目。对所有的 $k$ 求和，即是所有从 $v_i$ 到 $v$ 的长度为 $l+1$ 的路的数目，故命题对 $l+1$ 成立。

# 结点间的路

---

例1 给定一图 $G = \langle V, E \rangle$  如图7-3.3所示。

见P290

$V_3$ 到 $V_1$ 长度为2的路有几条： 1

$V_3$ 到 $V_2$ 长度为3的路有几条： 2

$V_2$ 到 $V_2$ 长度为2的回路有几条： 2

$V_2$ 到 $V_2$ 长度为4的回路有几条： 4

# 可达性矩阵

- 在许多问题中需要判断有向图的一个结点 $v_i$ 到另一个结点 $v_j$ 是否存在路的问题。如果利用图 $G$ 的邻接矩阵 $A$ ，则可计算 $A, A^2, A^3, \dots, A^n, \dots$ ，当发现其中的某个 $A^l$ 的  $a_{ij}^{(l)} \geq 1$ ，就表明结点 $v_i$ 到 $v_j$ 可达。但这种计算比较繁琐，且 $A^l$ 不知计算到何时为止。从前面我们得知，如果有向图 $G$ 有 $n$ 个结点 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ， $v_i$ 到 $v_j$ 有一条路，则必有一条长度不超过 $n$ 的通路，因此只要考察  $a_{ij}^{(l)}$  就可以了，其中 $(1 \leq l \leq n)$ 。对于有向图 $G$ 中任意两个结点之间的可达性，亦可用可达矩阵表达。



# 可达性矩阵

---

## 定义7-3.2

令  $G = \langle V, E \rangle$  是一个简单有向图， $|V|=n$ ，假定  $G$  的结点已编序，即  $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，定义一个  $n \times n$  矩阵  $P = (p_{ij})$ 。其中

$$P_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{从 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 至少存在一条路} \\ 0, & \text{从 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 不存在路} \end{cases}$$

称矩阵  $P$  是图  $G$  的可达性矩阵。

# 可达性矩阵

---

- 可达性矩阵表明了图中任意两个结点间是否至少存在一条路以及在任何结点上是否存在回路。
- 一般地讲可由图 $G$ 的邻接矩阵 $A$ 得到可达性矩阵 $P$ 。即令 $B_n = A + A^2 + \dots + A^n$ ，在从 $B_n$ 中将不为0的元素改为1，而为零的元素不变，这样改换的矩阵即为可达性矩阵 $P$ 。

# 可达性矩阵

---

例题1 见P292

- 上述计算可达性矩阵的方法还是比较复杂，因为可达性矩阵是一个元素为0或1的布尔矩阵，由于在每个 $A^i$ 中，对于两个结点间的路的数目不感兴趣，它所关心的是该两个结点间是否有路存在，因此我们可将矩阵 $A, A^2, \dots, A^n$ 分别改为布尔矩阵 $A, A^{(2)}, \dots, A^{(n)}$ ，故 $P = A \vee A^{(2)} \vee \dots \vee A^{(n)}$ ，其中 $A^{(i)}$ 表示在布尔运算下 $A$ 的 $i$ 次方。

# 可达性矩阵

---

见例2（P292）

- 从本例的计算可以看到，如果把邻接矩阵看作是结点集 $V$ 上关系 $R$ 的关系矩阵，则可达性矩阵 $P$ 即为 $R$ 的传递闭包 $M_{R^+}$ ，因此可达矩阵亦可用Warshall 算法计算。

Warshall 算法略。

# 无向图中的邻接矩阵与可达性矩阵


---

- 上述可达性矩阵的概念可以推广到无向图中，只要将无向图的每一条边看成是具有相反方向的两条边，这样，一个无向图就可以看成是有向图。
- 无向图的邻接矩阵是一个对称矩阵，其可达矩阵称为连通矩阵，也是一个对称矩阵。

# 课堂练习


---

求下图的可达性矩阵。



# 课堂练习

求下图的可达性矩阵。



$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

# 课堂练习

---

$$A = \begin{bmatrix} 00100 \\ 00010 \\ 10010 \\ 01001 \\ 00010 \end{bmatrix} \quad A^{(2)} = \begin{bmatrix} 10010 \\ 01011 \\ 01101 \\ 00010 \\ 01001 \end{bmatrix} \quad A^{(3)} = \begin{bmatrix} 01101 \\ 01011 \\ 10010 \\ 01000 \\ 00010 \end{bmatrix} \quad A^{(4)} = \begin{bmatrix} 10010 \\ 01011 \\ 01101 \\ 00010 \\ 01001 \end{bmatrix} = A^{(2)}$$

$$A^{(5)} = A^{(3)}$$


$$P = A \vee A^{(2)} \vee A^{(3)} \vee A^{(4)} \vee A^{(5)}$$

$$P = \begin{bmatrix} 11111 \\ 01011 \\ 11111 \\ 01011 \\ 01011 \end{bmatrix}$$



# 用可达矩阵求强分图

用可达矩阵求强分图。



从图看出有两个强分图:  $\{v_1, v_3\}$  和  $\{v_2, v_4, v_5\}$   
下面看怎样用  $\mathbf{P}$  求强分图.

# 用可达矩阵求强分图

用可达矩阵求强分图。

先将 $P=(p_{ij})$ 转置得 $P^T=(p^T_{ij})$ , 如果 $v_i$ 与 $v_j$ 相互可达, 则

$$p_{ij} = p^T_{ij} = 1$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad P \wedge P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

初等变换得

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$v_1 v_3 v_2 v_4 v_5$

对 $P \wedge P^T$ 进行初等变换, 第2行与第3行交换, 再第2列与第3列交换, 最后得两个强分图:  $\{v_1, v_3\}$  和  $\{v_2, v_4, v_5\}$

# 无向图的完全关联矩阵

---

对于一个无向图 $G$ ，除了可用邻接矩阵以外，还对应着一个称为图 $G$ 的完全关联矩阵

这里，我们假定图 $G$ 无自回路，如因某种运算得到自回路，则将它删去。

# 无向图的完全关联矩阵

---

## 定义7-3.3

给定无向图 $G$ ，令 $v_1, v_2, \dots, v_p$  和  $e_1, e_2, \dots, e_q$  分别记为 $G$ 的结点和边，  
则矩阵 $M(G)=(m_{ij})$ ，其中


$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } v_i \text{ 关联 } e_j \\ 0, & \text{若 } v_i \text{ 不关联 } e_j \end{cases}$$

称 $M(G)$ 为完全关联矩阵。

# 无向图的完全关联矩阵

从右图及其关联矩阵中可以看出：

- 图中每一边关联两个结点，故 $M(G)$ 的每一列只有两个1。
- 每一行元素的和数对应于结点的度数。
- 一行中的元素全为0，其对应的结点为孤立点。
- 两个平行边其对应的两列相同。
- 同一图当结点或边的编序不同，其对应 $M(G)$ 仅有行序、列序的差别。



$$M = \begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

# 有向图的完全关联矩阵

---

当一个图是有向图时，亦可用结点和边的关联矩阵来表示。

定义7-3.4 给定简单有向图

$G = \langle V, E \rangle$  ,  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ ,  $E = \{e_1, e_2, \dots, e_q\}$ ,  $p \times q$ 阶矩阵

$M(G) = (m_{ij})$ , 其中


$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{在 } G \text{ 中 } v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的起点} \\ -1, & \text{在 } G \text{ 中 } v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点} \\ 0, & \text{在 } G \text{ 中 } v_i \text{ 不关联 } e_j \end{cases}$$

称 $M(G)$ 为 $G$ 的关联矩阵。

# 有向图的完全关联矩阵

从右图及其关联矩阵中可以看出：

- 每列只有一个1和一个-1，因为每条边有一个起点和一个终点
- 每行中1的个数为对应结点的出度，-1个数是结点入度



$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

---

谢谢