

2012 级《高等数学 I(2)》考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) 设向量 $\mathbf{a}=(1,0,2)$, $\mathbf{b}=(1,1,-1)$, 则以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的三角形的面积等于_____
- (2) 函数 $f(x,y)=x^2y^3$ 在点 $(2,1)$ 处沿方向 $\mathbf{l}=\mathbf{i}+\mathbf{j}$ 的方向导数为_____
- (3) 交换二次积分的次序: $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{2-y} f(x,y)dx =$ _____
- (4) 设 L 是圆周 $x^2+y^2=a^2$, 则曲线积分 $\oint_L x^2 ds =$ _____
- (5) 将函数 $f(x)=\frac{1}{x+1}$ 展开成 $(x-2)$ 的幂级数(并指出其收敛域):
 $f(x)=$ _____

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) xOy 面上的曲线 $4x^2-9y^2=36$ 绕 y 轴旋转一周所得曲面的方程是
 (A) $4(x^2+z^2)-9y^2=36$. (B) $4(x^2+z^2)-9(y^2+z^2)=36$.
 (C) $4x^2-9(y^2+z^2)=36$. (D) $4x^2-9y^2=36$. 【 】
- (2) 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x+z=y\sin(x^2-z^2)$ 所确定的隐函数, 则 $z\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}$ 等于
 (A) x . (B) y . (C) z . (D) $y\sin(x^2-z^2)$. 【 】

- (3) 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧, 则曲面积分 $\oiint_{\Sigma} \frac{x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 等于
 (A) $\frac{6}{5}\pi a^4$. (B) $\frac{12}{5}\pi a^4$. (C) $2\pi a^4$. (D) $4\pi a^4$. 【 】

- (4) 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+1)^n$ 在 $x=-2$ 处条件收敛, 则其在 $x=1$ 处
 (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛. (C) 发散. (D) 敛散性不确定. 【 】

本题
得分

三、计算下列各题(每小题 7 分,共 28 分)

- (1) 设 $z=f(x,xe^y)$, 其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.
- (2) 求过点 $(1,0,-2)$ 且与平面 $3x+4y-z+6=0$ 平行, 又与直线 $\frac{x-3}{1}=\frac{y+2}{4}=\frac{z}{1}$ 垂直的直线的方程.

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室_____大学数学部 命题教师_____命题组_____ 命题时间_____2013-5-25 使用学期_____2012-2013-2 总张数_____3 教研室主任审核签字_____

(3) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2}dv$, 其中 Ω 是由抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=2$ 所围成的区域.

(4) 设 Σ 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 夹在平面 $z=1$ 和 $z=2$ 之间的部分, 其面密度为 $\mu(x,y,z)=x^2+y^2$, 试求曲面 Σ 的质量.

本题
得分

四、(本题10分) 设 $I=\int_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$.

(1) 证明在区域 $G=\{(x,y)|y\geq 0, x^2+y^2\neq 0\}$ 内曲线积分 I 与路径无关;

(2) 设 L 是摆线 $\begin{cases} x=t-\sin t-\pi \\ y=1-\cos t \end{cases}$ 上对应于 $t=0$ 到 $t=2\pi$ 的一段弧, 求 I 的值.

本题
得分

五、(本题10分) 求函数 $z=x^2+xy+y^2-6x-9y$ 的极值.

本题 得分

六、(本题10分)求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$ 的收敛域与和函数.

本题 得分

七、(本题6分)设 $a_n > 0 (n=1,2,\cdots)$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 都收敛.