



Chapitre 1.1

QCM de test

Notion de l'information génétique

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah

Tarbiyya Online - 100% Nigérien et gratuit

30 août 2026

QCM DE TEST

Notion de l'information génétique

Consignes :

- Pour chaque question, une seule réponse est correcte.
- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse.
- Temps recommandé : 20 minutes.
- Barème : 0,5 point par bonne réponse (soit 10 points au total).

Questions 1 à 5**1. Un gène est :**

- a) Une protéine
- b) Une portion d'ADN qui code pour un caractère
- c) Un chromosome entier

2. Les différentes versions d'un même gène sont appelées :

- a) Des chromosomes
- b) Des allèles
- c) Des phénotypes

3. Un individu est hétérozygote lorsqu'il possède :

- a) Deux allèles identiques
- b) Deux allèles différents
- c) Un seul allèle

4. Le phénotype correspond à :

- a) L'ensemble des gènes d'un individu
- b) L'ensemble des caractères exprimables
- c) La portion d'ADN qui code pour un caractère

5. Un allèle dominant :

- a) S'exprime toujours à l'état hétérozygote
- b) S'exprime uniquement à l'état homozygote
- c) Ne s'exprime jamais

Questions 6 à 10**6. Un allèle récessif :**

- a) S'exprime toujours
- b) Ne s'exprime qu'à l'état homozygote
- c) Est noté en majuscule

7. La première loi de Mendel (loi d'uniformité) dit que :

- a) Les individus de la F1 sont tous identiques
- b) Les individus de la F2 sont tous identiques
- c) Les parents sont toujours différents

8. Dans un monohybridisme avec dominance, la F2 donne :

- a) 50% - 50%
- b) 75% - 25%
- c) 100% - 0%

9. La codominance se caractérise par :

- a) L'expression simultanée des deux allèles chez l'hétérozygote
- b) La dominance d'un allèle sur l'autre
- c) La mort des homozygotes

10. Un gène létal :

- a) Provoque la mort des hétérozygotes
- b) Provoque la mort des homozygotes
- c) Est toujours récessif

Questions 11 à 15

11. Dans un dihybridisme avec gènes indépendants, la F2 donne :

- a) $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{9}{16}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{16}$
- c) $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$

12. Deux gènes sont liés lorsqu'ils sont situés :

- a) Sur le même chromosome
- b) Sur des chromosomes différents
- c) Sur le chromosome Y

13. Le crossing-over est :

- a) Un échange de fragments entre chromosomes homologues
- b) Une mutation ponctuelle
- c) Un type de codominance

14. Une délétion est :

- a) L'ajout d'un nucléotide
- b) La perte d'un nucléotide
- c) Le remplacement d'un nucléotide

15. Une substitution est :

- a) L'ajout d'un nucléotide
- b) La perte d'un nucléotide
- c) Le remplacement d'un nucléotide par un autre

Questions 16 à 20

16. La trisomie 21 est un exemple de :

- a) Mutation ponctuelle
- b) Polysomie
- c) Polyploïdie

17. Le syndrome de Turner est une :

- a) Trisomie
- b) Monosomie

- c) Polyploïdie
- 18. La polyploïdie est fréquente chez :**
- a) Les animaux
 - b) Les végétaux
 - c) Les bactéries
- 19. Le génotype d'un individu est :**
- a) Ce que l'on voit
 - b) L'ensemble de ses gènes
 - c) Une mutation
- 20. Les gonosomes sont :**
- a) Les chromosomes sexuels (X et Y)
 - b) Les chromosomes somatiques
 - c) Les allèles

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
1	b	8	b	15	c
2	b	9	a	16	b
3	b	10	b	17	b
4	b	11	b	18	b
5	a	12	a	19	b
6	b	13	a	20	a
7	a	14	b		

Calcul de votre score :

— 1 bonne réponse = 0,5 point

— Total = /10

— Appréciation :

— 10/10 : Excellent ! Vous maîtrisez parfaitement le chapitre.

— 8-9/10 : Très bien, quelques révisions sont nécessaires.

— 6-7/10 : Bien, mais une révision approfondie s'impose.

— Moins de 6/10 : Il est conseillé de relire attentivement le cours.