

Métodos Quantitativos para a Computação

Modelo de Probabilidade

Modelo de Probabilidade

- Fundamentação matemática que suporta os modelos probabilísticos
- Conjunto de conceitos
- Fortemente fundado em teoria dos conjuntos e funções

Principais conceitos

- Experimento aleatório
- Espaço amostral
- Evento
- Probabilidade

Experimento aleatório

- Um fenômeno observado para o qual não existe uma equação determinística que nos forneça o resultado

Espaço amostral

- É o conjunto não vazio que contém os resultados unitários possíveis de um experimento aleatório
- Exemplos
 - Lançamento de um dado equilibrado:
 $\Omega = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$
 - Lançamento de uma moeda equilibrada:
 $\Omega = \{ \text{cara, coroa} \}$
 - Lançamento de uma moeda equilibrada:
 $\Omega = \{ \text{cara, coroa} \}$
 - Número de vezes que temos que lançar uma moeda até obtermos a primeira cara:
 $\Omega = \{ 1, 2, 3, \dots \}$
 - Medição do tempo de vida de um equipamento:
 $\Omega = [0, \infty)$

Evento

- É um dos resultados possíveis (não necessariamente unitário) do experimento aleatório
- Dado um experimento aleatório com espaço amostral Ω , e um subconjunto $A \subseteq \Omega$
- A é um evento
- No contexto do experimento aleatório, o evento A ocorre se o resultado do experimento (um elemento de Ω) pertencer ao evento A

Operações com eventos

- Como eventos são conjuntos, podem-se realizar as operações de conjuntos sobre eles
- Estas operações possuem uma interpretação

Operações com eventos

- Intersecção
 - Dados dois eventos A e B , a intersecção $A \cap B$ é um evento que corresponde à ocorrência simultânea de A e B .

Exemplo 1

- Seja o lançamento de duas moedas
 - Sejam os eventos
 - A = “observação de cara no primeiro lançamento”
 - B = “observação de coroa no segundo lançamento”
 - $A = \{ (\text{cara}, \text{cara}), (\text{cara}, \text{coroa}) \}$
 - $B = \{ (\text{cara}, \text{coroa}), (\text{coroa}, \text{coroa}) \}$
 - $A \cap B = \{ (\text{cara}, \text{coroa}) \}$

Operações com eventos

- União
 - Dados dois eventos A e B , a intersecção $A \cup B$ é um evento que corresponde à ocorrência alternativa de A ou B , isto é, A ocorre ou B ocorre, ou ambos ocorrem

Exemplo 2

- Sejam os eventos
 - $A = \text{“observação de cara no primeiro lançamento”}$
 - $B = \text{“observação de coroa no segundo lançamento”}$
 - $A = \{ (cara, cara), (cara, coroa) \}$
 - $B = \{ (cara, coroa), (coroa, coroa) \}$
 - $A \cup B = \{ (cara, coroa), (cara, coroa), (coroa, cara) \}$

Operações com eventos

- Complementação
 - Dado um evento A , a complementação de A , isto é A^c é um evento que corresponde à não ocorrência de A

Exemplo 3

- Sejam os eventos
 - $A = \text{“observação de cara no primeiro lançamento”}$
 - $B = \text{“observação de coroa no segundo lançamento”}$
 - $A = \{ (cara, cara), (cara, coroa) \}$
 - $A^c = \{ (coroa, cara), (coroa, coroa) \}$

Operações com eventos

- Diferença
 - Dados dois eventos A e B , a diferença entre A e B , isto é $A \setminus B$ é um evento que corresponde à ocorrência de A sem a ocorrência de B
 - $A \setminus B$ é o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B

Exemplo 4

- Sejam os eventos
 - $A = \text{“observação de cara no primeiro lançamento”}$
 - $B = \text{“observação de coroa no segundo lançamento”}$
 - $A = \{ (cara, cara), (cara, coroa) \}$
 - $B = \{ (cara, coroa), (coroa, coroa) \}$
 - $A \setminus B = \{ (cara, cara) \}$

Operações com eventos

- Evento nulo
 - O evento nulo \emptyset (conjunto vazio) corresponde a um evento cuja observação seja impossível

Exemplo 5

- Seja o lançamento de duas moedas
 - $\Omega = \{ (cara, cara), (cara, coroa), (coroa, cara), (coroa, coroa) \}$
- Sejam os eventos
 - $A = \text{“observação de cara no primeiro lançamento”}$
 - $C = \text{“observação de coroa no primeiro lançamento”}$
- $A = \{ (cara, cara), (cara, coroa) \}$
- $C = \{ (coroa, cara), (coroa, coroa) \}$
- $A \cap C = \emptyset$

Operações com eventos

- Evento certo
 - O evento certo é o espaço amostral Ω

Operações com eventos

- Eventos disjuntos ou mutuamente exclusivos
 - Dois eventos A e B são disjuntos ou mutuamente exclusivos quando $A \cap B = \emptyset$

Operações com eventos

- $(A^c)^c = A$
- $A \cup A^c = \Omega, \quad A \cap A^c = \emptyset$
- $A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cup \Omega = \Omega, \quad A \cap \Omega = A$
- $A \setminus B = A \cap B^c$

Operações com eventos

- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- $[\bigcap_{i=1}^N A_i]^c = \bigcup_{i=1}^N A_i^c$
- $[\bigcup_{i=1}^N A_i]^c = \bigcap_{i=1}^N A_i^c$

Probabilidade

- Qual é o significado da probabilidade de um evento?
 - Dado um experimento aleatório qualquer e um seu evento A , a probabilidade de A seria o limite da frequência de ocorrência de A em n repetições do evento, quando $n \rightarrow \infty$, se tal limite existir
 - Se $N_n(A)$ denotar o número de vezes em que A ocorre em n repetições do experimento, então

$$P[A] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n(A)}{n}$$

Espaço de eventos

- \mathcal{E} = conjunto de todos os eventos para os quais vamos atribuir probabilidades
- \mathcal{E} é um conjunto de subconjuntos em Ω
- Deve preservar o resultado das operações com eventos
 - $\emptyset \in \mathcal{E}$
 - Dado um evento $A \in \mathcal{E}$, a complementação $A^c \in \mathcal{E}$
 - Dados infinitos eventos $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{E}$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{E}$

Probabilidade

- Dados um espaço amostral Ω e uma classe de eventos \mathcal{E} , uma probabilidade é uma função (P) que associa valores numéricos do intervalo $[0, 1]$ a eventos $A \in \mathcal{E}$ satisfazendo os seguintes axiomas:
 1. $P: \mathcal{E} \rightarrow [0, 1]$, isto é, para todo $A \in \mathcal{E}$, $P[A] \in [0, 1]$
 2. Probabilidade do evento certo:
 3. $P[\Omega] = 1$ (o evento certo tem probabilidade 1).
 4. Dados dois eventos A , e B mutuamente disjuntos
$$P[A \cup B] = P[A] + P[B]$$

Propriedades da probabilidade

- Complementaridade: dado $A \in \mathcal{E}$

$$P[A^c] = 1 - P[A]$$

$$A \cap A^c = \emptyset \text{ (disjuntos)}$$

$$A \cup A^c = \Omega \text{ (definição de evento complementar)}$$

$$P[A \cup A^c] = P[\Omega]$$

$$P[A] + P[A^c] = 1$$

$$P[A^c] = 1 - P[A]$$

Propriedades da probabilidade

- Probabilidade do evento nulo:

$$P[\emptyset] = 1 - P[\Omega] \text{ (complementares)}$$

$$P[\emptyset] = 0$$

Propriedades da probabilidade

- Probabilidade da diferença de conjuntos

Dados $A, B \in \mathcal{E}$ tais que $A \subset B$, então:

$$P[B \setminus A] = P[B] - P[A]$$

$$B = A \cup (B \setminus A) \text{ (definição de } B \setminus A)$$

$$A \cap (B \setminus A) = \emptyset \text{ (disjuntos)}$$

$$P[B] = P[A \cup (B \setminus A)] = P[A] + P[B \setminus A]$$

$$P[B \setminus A] = P[B] - P[A]$$

Propriedades da probabilidade

- Regra da soma: dados $A, B \in \mathcal{E}$ quaisquer (possivelmente não disjuntos), então:

$$P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$$

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A)$$

$$A \cap (B \setminus A) = \emptyset$$

$$P[A \cup B] = P[A \cup (B \setminus A)] = P[A] + P[B \setminus A]$$

$$B \setminus A = B \setminus (A \cap B)$$

$$P[B \setminus A] = P[B \setminus (A \cap B)] = P[B] - P[A \cap B] \quad (\text{da propriedade anterior})$$

$$P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$$

Propriedades da probabilidade

- Regra da multiplicação: Dados $A, B \in \mathcal{E}$ tais que A e B são independentes

$$P[A \cap B] = P[A] \cdot P[B]$$

- Observações:
 - Dois eventos são independentes quando a ocorrência de um não afeta a probabilidade do outro
 - Essa demonstração será fornecida mais tarde quando estudarmos probabilidade condicional

Propriedades da probabilidade

- Dados $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{E}$ disjuntos
($A_i \cap A_j = \emptyset$), para qualquer i e j , então:

$$P[\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i] = \sum_{i=1}^{\infty} P[A_i]$$

Propriedades da probabilidade

- Dados $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{E}$ disjuntos
($A_i \cap A_j = \emptyset$), para qualquer i e j , então:

$$P[\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i] = \sum_{i=1}^{\infty} P[A_i]$$

Propriedades da probabilidade

- Espaço discreto
 - É suficiente atribuir probabilidades para os conjuntos unitários, sendo que as demais probabilidades são obtidas pela propriedade anterior
- Espaço contínuo
 - Vamos ver na sequência da disciplina

Exemplo 6

- Suponha o lançamento de uma moeda honesta até sair a primeira cara. Calcular a probabilidade de o número de lançamentos necessários ser par.
- $\Omega = \{1, 2, \dots\}$
- Probabilidade dos conjuntos unitários:
 - $P[\{i\}]$ é a probabilidade de que i lançamentos sejam necessários
 - Para isso, devem ocorrer $(i-1)$ coroas e 1 cara.
 - $P[\{i\}] = (1/2)^{i-1} \times 1/2 = (1/2)^i$
- Probabilidade do número de lançamentos ser par: $P[\{2, 4, \dots\}]$
 - $\frac{1^2}{2} + \frac{1^4}{2} + \frac{1^6}{2} + \dots = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^i$
 - Progressão geométrica com $a_1 = 1/4$ e $r = 1/4$
 - $\sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^i = \frac{a_1}{1-r} = \frac{1/4}{1-1/4} = 1/3$

Métodos Quantitativos para a Computação

Modelo de Probabilidade