

Topología Algebraica

Primer Cuatrimestre – 2019

Examen Final



Guido Arnone

Índice general

Índice general	1
1. Preliminares	2
1.1. La categoría de ordinales finitos	2
1.2. Conjuntos Simpliciales	3
1.3. Realización Geométrica	6
1.4. La adjunción entre la realización geométrica y el funtor singular	9
Bibliografía	12

Parte 1

Preliminares

1.1. La categoría de ordinales finitos

Definición 1.1.1. Se define la **categoría Δ de ordinales finitos** como la categoría que tiene por objetos a los conjuntos ordenados

$$\llbracket n \rrbracket := \{0 < 1 < \dots < n\}$$

para cada $n \in \mathbb{N}_0$, y cuyas flechas son las funciones $f : \llbracket n \rrbracket \rightarrow \llbracket m \rrbracket$ que resultan morfismos de posets. Definimos además, para cada $\llbracket n \rrbracket \in \Delta$ e $i \in \llbracket n \rrbracket_0$,

- los mapas de **cocaras**,

$$d^i : \llbracket n-1 \rrbracket \rightarrow \llbracket n \rrbracket$$

$$j \mapsto \begin{cases} j & \text{si } j < i \\ j+1 & \text{si } j \geq i \end{cases}$$

y

- los mapas de **codegeneraciones**,

$$s^i : \llbracket n+1 \rrbracket \rightarrow \llbracket n \rrbracket$$

$$j \mapsto \begin{cases} j & \text{si } j \leq i \\ j-1 & \text{si } j > i \end{cases}$$

Proposición 1.1.1. Los mapas de cocaras y codegeneraciones satisfacen las siguientes *identidades cosimpliciales*,

$$\begin{cases} d^j d^i = d^i d^{j-1} & \text{si } i < j \\ s^j d^i = d^i s^{j-1} & \text{si } i < j \\ s^j d^j = s^j d^{j+1} = 1 & \text{si } i < j \\ s^j d^i = d^{i-1} s^j & \text{si } i > j+1 \\ s^j s^i = s^i s^{j+1} & \text{si } i \leq j \end{cases}$$



Proposición 1.1.2. Toda flecha $\llbracket n \rrbracket \xrightarrow{f} \llbracket m \rrbracket$ en Δ se puede escribir como una composición de mapas de cocaras y codegeneraciones.



Observación 1.1.1. En vista de las dos proposiciones anteriores, usando los mapas de cocaras y codegeneraciones y las identidades cosimpliciales se puede dar «una presentación de Δ en términos de generadores y relaciones». A grandes rasgos, esto nos permitirá definir los objetos relacionados a Δ únicamente a partir de los mapas de cocaras y codegeneraciones.

1.2. Conjuntos Simpliciales

Ahora sí, pasamos a definir los conjuntos simpliciales:

Definición 1.2.1. Un **conjunto simplicial** es un funtor $X : \Delta^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$. Concretamente, éste consiste de

- (i) una sucesión X_0, X_1, X_2, \dots de conjuntos, y
- (ii) para cada $n \in \mathbb{N}_0$ e $i \in \llbracket n \rrbracket_0$, funciones $d_i : X_n \rightarrow X_{n-1}$ y $s_i : X_n \rightarrow X_{n+1}$ llamadas mapas de caras y degeneraciones respectivamente, que satisfacen las siguientes *identidades simpliciales*:

$$\begin{cases} d_i d_j = d_{j-1} d_i & \text{si } i < j \\ d_i s_j = s_{j-1} d_i & \text{si } i < j \\ d_j s_j = d_{j+1} s_j = 1 & \text{si } i < j \\ d_i s_j = s_j d_{i-1} & \text{si } i > j + 1 \\ s_i s_j = s_{j+1} s_i & \text{si } i \leq j \end{cases}$$

Ejemplo 1.2.1 (el n -símplex estándar). Para cada $n \in \mathbb{N}_0$ tenemos un conjunto simplicial dado por el funtor $\Delta(-, \llbracket n \rrbracket)$. Concretamente, para cada $j \geq 0$ definimos los conjuntos

$$\Delta_m^n := \Delta(\llbracket m \rrbracket, \llbracket n \rrbracket) = \{f : \llbracket m \rrbracket \rightarrow \llbracket n \rrbracket : f \text{ es morfismo de posets}\}$$

y los mapas de caras y degeneraciones están dados por

$$(d^i)^* : f \in \Delta(\llbracket m \rrbracket, \llbracket n \rrbracket) \mapsto f d^i \in \Delta(\llbracket m-1 \rrbracket, \llbracket n \rrbracket)$$

y

$$(s^i)^* : f \in \Delta(\llbracket m \rrbracket, \llbracket n \rrbracket) \mapsto f s^i \in \Delta(\llbracket m+1 \rrbracket, \llbracket n \rrbracket).$$

Llamamos a este conjunto simplicial el **n -símplex estándar** y lo notamos Δ^n .

Una vez más interpretando a $\llbracket n \rrbracket$ como el n -símplex combinatorio ordenado, su conjunto simplicial asociado consiste de «todas las formas posibles de incluir o colapsar un m -símplex estándar en $\llbracket n \rrbracket$ ».

Extendiendo esta interpretación tenemos el siguiente ejemplo,

Ejemplo 1.2.2 (complejos simpliciales ordenados). Sea K un complejo simplicial equipado con una relación de orden total para sus vértices $V = \{v_i\}_{i \in I}$. Notamos a cada n -símplex como una n -upla $[v_{i_0}, \dots, v_{i_n}]$ con $v_k < v_{k+1}$ para cada k .

Asociaremos a K un conjunto simplicial, agregando como en el caso de Δ^n la noción de *simplices degenerados*. Concretamente, para cada $n \in \mathbb{N}_0$ definimos

$$K_n := \{[v_{i_0}, \dots, v_{i_n}] : v_{i_k} \leq v_{i_{k+1}} \text{ para cada } k, \text{ y } \{v_{i_k}\}_{k=0}^n \in K\}.$$

En otras palabras, el conjunto K_n consiste de n -uplas ordenadas de vértices que forman un simplex de K , pero permitiendo repetición. Definimos a su vez los mapas de caras y degeneraciones como

$$d_k[v_{i_0}, \dots, v_{i_n}] := [v_{i_0}, \dots, \widehat{v_{i_k}}, \dots, v_{i_n}] \quad \text{y} \quad s_k[v_{i_0}, \dots, v_{i_n}] := [v_{i_0}, \dots, v_{i_k}, v_{i_k}, \dots, v_{i_n}].$$

Definición 1.2.2. Dado un n -simplex estándar (como complejo simplicial), su **borde** es el complejo $\partial\Delta^n$ dado por la unión de sus caras maximales y su k -ésimo **cuerno** es el subcomplejo Λ_k^n de $\partial\Delta^n$ que se obtiene quitando la k -ésima cara maximal de Δ^n , para cierto $0 \leq k \leq n$. Decimos que Λ_k^n es un cuerno *interno* si $0 < k < n$, y *externo* en caso contrario.

Ahora sí, veamos un primer ejemplo topológico:

Ejemplo 1.2.3. Sea X un espacio topológico. Para cada $n \in \mathbb{N}_0$ definimos el conjunto

$$\mathcal{S}(X)_n := \text{Top}(|\Delta^n|, X)$$

de todos los n -simplices singulares de X , y las aplicaciones

$$d_i : \mathcal{S}(X)_n \rightarrow \mathcal{S}(X)_{n-1}, \quad s_i : \mathcal{S}(X)_n \rightarrow \mathcal{S}(X)_{n+1}$$

que envían un n -simplex singular a la restricción $d_i\sigma$ a su i -ésima cara y al $(n+1)$ -simplex singular $s_i\sigma$ que corresponde a colapsar $|\Delta^{n+1}|$ a $|\Delta^n|$ a través de $|s^i|$ y luego componer con σ .

Estos conforman el conjunto simplicial $\mathcal{S}(X)$ que se conoce como el **conjunto singular** de X .

Definición 1.2.3. Dado un conjunto simplicial X , definimos su **complejo de Moore** como el complejo de cadenas

$$\dots \rightarrow \mathbb{Z}X_2 \xrightarrow{\partial} \mathbb{Z}X_1 \xrightarrow{\partial} \mathbb{Z}X_0,$$

con $\mathbb{Z}X_n$ el grupo abeliano libre generado por el conjunto X_n y

$$\partial = \sum_{i=1}^n (-1)^i d_i$$

para cada $n \geq 0$.

Observación 1.2.1. La homología singular de un espacio topológico X coincide con la homología del complejo de Moore de su conjunto singular.

Ejemplo 1.2.4 (nervio de una categoría). Sea \mathcal{C} una categoría localmente pequeña. Definimos el **nervio** de \mathcal{C} como el conjunto simplicial dado por los conjuntos

$$\begin{aligned} N(\mathcal{C})_n &= \text{hom}(\mathbf{n}, \mathcal{C}) = \{(f_1, \dots, f_n) : f_i \in \text{mor } \mathcal{C}, \text{ cod } f_i = \text{dom } f_{i+1}\} \\ &= \{x_0 \xrightarrow{f_1} x_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} x_n\} \end{aligned}$$

de n -uplas de morfismos componibles junto con los mapas

$$d_i(f_1, \dots, f_n) = (f_1, \dots, f_{i-1}, f_i \circ f_{i+1}, \dots, f_n)$$

y

$$s_i(f_1, \dots, f_n) = (f_1, \dots, f_i, 1, f_{i+1}, \dots, f_n),$$

para cada $0 \leq i \leq n$.

En particular, si $\mathcal{C} = BG$ es el grupode asociado a un grupo G , entonces su nervio consiste de n -uplas de elementos de G y los mapas de caras y degeneraciones están dados por

$$d_i(g_1, \dots, g_n) = (g_1, \dots, g_{i-1}, g_i g_{i+1}, \dots, g_n), \quad s_i(g_1, \dots, g_n) = (g_1, \dots, g_i, 1, g_{i+1}, \dots, g_n).$$

Definición 1.2.4. Dados dos complejos simpliciales $X, Y : \Delta^{op} \rightarrow \text{Set}$, un **morfismo de conjuntos simpliciales** de X a Y es una transformación natural $f : X \rightarrow Y$. Concretamente, esto consiste en dar una familia de funciones $f_n : X_n \rightarrow Y_n$ tales que, para cada $0 \leq i \leq n$, los siguientes diagramas conmutan

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{d_i} & X_{n-1} \\ f_n \downarrow & & \downarrow f_{n-1} \\ Y_n & \xrightarrow{d_i} & Y_{n-1} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{s_i} & X_{n+1} \\ f_n \downarrow & & \downarrow f_{n+1} \\ Y_n & \xrightarrow{s_i} & Y_{n+1} \end{array}$$

Es decir, un morfismo de conjuntos simpliciales consiste de una colección de aplicaciones que sea compatible con los mapas de caras y degeneraciones.

Observación 1.2.2. Los conjuntos simpliciales junto con los morfismos antes definidos forman una categoría¹, que notaremos $s\text{Set}$.

Observación 1.2.3. Un morfismo $f : K \rightarrow L$ de complejos simpliciales ordenados induce a su vez un morfismo de conjuntos simpliciales dado por $f_n[v_{i_1}, \dots, v_{i_n}] := [f(v_{i_1}), \dots, f(v_{i_n})]$ para cada n -simplex $[v_{i_1}, \dots, v_{i_n}]$ (posiblemente degenerado) de K .

De forma similar, una función continua $f : X \rightarrow Y$ induce un morfismo $f_* : \mathcal{S}(X) \rightarrow \mathcal{S}(Y)$ entre conjuntos singulares vía la postcomposición. De hecho,

Definición 1.2.5. El **functor singular** $\mathcal{S} : \text{Top} \rightarrow s\text{Set}$ asigna a cada espacio su conjunto singular, y a cada función continua $f : X \rightarrow Y$ el morfismo simplicial $f_* : \mathcal{S}(X) \rightarrow \mathcal{S}(Y)$ dado por $(f_*)_n(\sigma) = f \circ \sigma$ para cada $\sigma : |\Delta^n| \rightarrow X$.

Observación 1.2.4. Si X es un conjunto simplicial, el conjunto X_n está determinado por los morfismos de conjuntos simpliciales de Δ^n a X .

Concretamente, por el lema de Yoneda tenemos una biyección natural

$$\text{hom}_{s\text{Set}}(\Delta^n, X) \simeq X_n$$

que a cada elemento $x \in X_n$ le asigna un morfismo de conjuntos simpliciales $\iota_x : \Delta^n \rightarrow X$ que satisface $\iota_x(1_{[n]}) = x$.

Esto se corresponde con la intuición que proveen los ejemplos anteriores, en los que los n -simplices de un conjunto simplicial son alguna «manifestación» de el n -simplex estándar: como la cara de un m -simplex de dimensión mayor, como un m -simplex de dimensión menor que represente un colapso del mismo, o como el n -simplex singular de un espacio topológico.

Definición 1.2.6. Sea X un conjunto simplicial. Un n -simplex $x \in X_n$ se dice **degenerado** si existe $y \in X_{n-1}$ tal que $s_i(y) = x$ para algún $i \in [n]_0$. En caso contrario, decimos que x es **no degenerado**.

¹Esta es precisamente la categoría de prehaces de Δ^{op} .

1.3. Realización Geométrica

Durante la materia vimos como a partir de un complejo simplicial K podemos construir un espacio topológico $|K|$, la realización geométrica de K . Siguiendo esta idea, queremos extender esta noción al contexto de los conjuntos simpliciales.

Definición 1.3.1 (realización geométrica, primera definición). Sea X un conjunto simplicial. Dotando a cada conjunto X_n de la topología discreta, definimos la **realización geométrica** de X como el espacio

$$|X| = \left(\coprod_{n \geq 0} X_n \times |\Delta^n| \right) / \sim$$

donde identificamos a los puntos $(x, |d^i|(p)) \sim (d_i(x), p)$ y $(x, |s^i|(p)) \sim (s_i(x), p)$.

Esto formaliza la intuición anterior: para cada $x \in X_n$ construimos una copia del n -simplex estándar y los pegamos en función de si son caras o colapsos unos de otros.

Además, como veremos en breve esta asignación es funtorial, teniéndose así un análogo a la realización geométrica para complejos simpliciales.

Proposición 1.3.1. La realización geométrica del n -simplex estándar $\Delta^n : \Delta^{op} \rightarrow \text{Set}$ es homeomorfa a la realización geométrica del n -simplex estándar como complejo simplicial.

Demostración. Para evitar ambigüedades, en toda la demostración notaremos $|\Delta^n|$ exclusivamente para referirnos a la realización geométrica del n -simplex como complejo simplicial. Por otro lado, notaremos $|\Delta(-, n)|$.

Para cada $k \in \mathbb{N}_0$ tenemos una aplicación

$$(f, x) \in \Delta(k, n) \times |\Delta^k| \rightarrow |f|(x) \in |\Delta^n|,$$

que resulta continua pues cada espacio $\Delta(k, n)$ es discreto.

Ésta familia de funciones induce un morfismo en el coproducto que pasa al cociente por las identificaciones de la realización geométrica, pues si g es un mapa de cocara o codegeneración, entonces

$$r(g^*(f), x) = |fg|(x) = r(f, |g|(x)).$$

Se tiene entonces una función continua $r : [(f, x)] \in |\Delta(-, n)| \rightarrow |f|(x) \in |\Delta^n|$.

Por otro lado, podemos considerar la inclusión $i : |\Delta^n| \rightarrow |\Delta(-, n)|$ dada por la composición

$$|\Delta^n| \xrightarrow{\cong} \{\text{id}\} \times |\Delta^n| \hookrightarrow |\Delta(-, n)|,$$

que satisface $ri = 1$ pues

$$ri(x) = [(id, x)] = |id|(x) = x$$

para todo $x \in |\Delta^n|$. En particular sabemos que i es inyectiva. Por lo tanto, para terminar basta ver que i es sobreyectiva, en cuyo caso es un homeomorfismo con inversa f .

Equivalentemente, resta ver que todo elemento $[(f, x)]$ está relacionado con un punto de la forma (id, y) para cierto $y \in |\Delta^n|$. En efecto, sea $(f, x) \in |\Delta(-, n)|$ con $f : [k] \rightarrow [n]$ un morfismo de posets y $x \in |\Delta^k|$. Sabemos entonces que existen mapas de cocara o codegeneración f_1, \dots, f_n tales que $f = f_1 \cdots f_n$. En consecuencia es

$$\begin{aligned} [(f, x)] &= [(f_1 \cdots f_n, x)] = [(f_n^* \circ \cdots \circ f_1^*(id), x)] \\ &= [(id, |f_1 \cdots f_n|(x))] = [(id, |f|(x))], \end{aligned}$$

lo que concluye la demostración. ❖

Definición 1.3.2. Sea X un conjunto simplicial. Su **categoría de símlices** es la categoría coma $\Delta \downarrow X$, donde $\Delta : \Delta \rightarrow \text{Set}^{\Delta^{\text{op}}}$ es el embedding de Yoneda de Δ y $X : \Delta \rightarrow \text{Set}^{\Delta^{\text{op}}}$ es el funtor que vale constantemente X . Concretamente, los objetos de $\Delta \downarrow X$ son *símlices* de X , entendidos como morfismos simpliciales $\Delta^n \rightarrow X$, y las flechas son morfismos $\theta : \llbracket n \rrbracket \rightarrow \llbracket m \rrbracket$ de posets tales que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Delta^n & & X \\ \theta_* \downarrow & \searrow \sigma & \\ \Delta^m & \nearrow \tau & \end{array}$$

conmuta, donde θ_* es la postcomposición por θ .

Teorema 1.3.1. Si X es un conjunto simplicial, entonces

$$|X| \simeq \underset{\substack{\Delta^n \rightarrow X \\ \text{en } \Delta \downarrow X}}{\text{colim}} |\Delta^n|.$$

Demostración. Observemos que si Z es un espacio topológico arbitrario, una función continua $g : |X| \rightarrow Z$ se corresponde unívocamente con una función continua $\tilde{g} : \coprod_{n \geq 0} X_n \times |\Delta^n| \rightarrow Z$ que sea compatible con la relación que identifica caras y colapsos.

A su vez, usando la propiedad universal del coproducto y el hecho de que cada espacio X_n tiene la topología discreta, esto equivale a dar funciones

$$\lambda_x : |\Delta^n| \rightarrow Z$$

para cada $x \in X_n$ y $n \geq 0$, que satisfagan las condiciones de compatibilidad de antes: esto es, que para cada morfismo de posets² $\theta : \llbracket n \rrbracket \rightarrow \llbracket m \rrbracket$ se tenga $\lambda_{X(\theta)(x)} = \lambda_x \circ |\theta| = |\theta^*|(\lambda_x)$.

Recordemos ahora que, por el lema de Yoneda, tenemos que

$$\text{hom}(\Delta^n, \Delta^m) \simeq \Delta(n, m) = \{\theta : \llbracket n \rrbracket \rightarrow \llbracket m \rrbracket : \theta \text{ es morfismo de posets}\}$$

y

$$\text{hom}(\Delta^n, X) \simeq X_n$$

para cada $n, m \geq 0$. Por lo tanto, cada elemento $x \in X_n$ se corresponde a un único morfismo simplicial $\sigma_x : \Delta^n \rightarrow X$, y toda flecha $\Delta^n \rightarrow \Delta^m$ es la poscomposición por cierto morfismo de posets $\theta : \llbracket n \rrbracket \rightarrow \llbracket m \rrbracket$.

En éstos terminos, la información anterior se puede describir como un morfismo $\lambda_\sigma : |\Delta^n| \rightarrow Z$ para cada símplex $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$, de forma que para todo morfismo de posets $\theta : \llbracket n \rrbracket \rightarrow \llbracket m \rrbracket$ y símlices $\sigma : \Delta^n \rightarrow X, \tau : \Delta^m \rightarrow X$ tales que $\sigma = \tau \theta_*$ se tenga que $\lambda_\sigma = \lambda_\tau |\theta|$.

²Si bien la condición original era sobre los mapas de caras y degeneración, que son imagen por X de los mapas de cocaras y codegeneración en Δ . Al clausurar la relación de equivalencia se tiene una condición equivalente reemplazando éstos por cualquier función $X(\theta)$ con θ un morfismo en Δ .

Es decir, dar un morfismo $g : |X| \rightarrow Z$ es equivalente a dar un cocono sobre Z para el funtor $F : \Delta \downarrow X \rightarrow \text{Top}$ que envía $(\sigma : \Delta^n \rightarrow X) \xrightarrow{\theta_*} (\tau : \Delta^m \rightarrow X)$ a $|\Delta^n| \xrightarrow{|\theta|} |\Delta^m|$.

Por otro lado, tenemos un cocono sobre X dado por las funciones

$$\iota_\sigma : p \in |\Delta^n| \rightarrow [(x, p)] \in |X|,$$

para cada $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$ que está en correspondencia con $x \in X_n$. Por las observaciones anteriores, sabemos que $(\lambda_\sigma)_{\sigma \in \Delta \downarrow X}$ se factoriza por $(\iota_\sigma)_{\sigma \in \Delta \downarrow X}$ a través de g ya que es

$$\lambda_\sigma(p) = g([(x, p)]) = g(\iota_\sigma(x, p))$$

para todo $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$ y $p \in |\Delta^n|$. Pero como notamos anteriormente, de existir una función continua $|X| \rightarrow Z$ está determinada por lo que vale en la imagen de cada morfismo ι_σ . Hemos visto entonces que todo cono sobre $F : \Delta \downarrow X \rightarrow \text{Top}$ se factoriza a través de $(\iota_\sigma)_\sigma$ de forma única, y esto es precisamente que

$$|X| \simeq \underset{\substack{\Delta^n \rightarrow X \\ \text{en } \Delta \downarrow X}}{\text{colim}} |\Delta^n|.$$



Proposición 1.3.2. Se tiene un funtor

$$|\cdot| : \text{sSet} \rightarrow \text{Top}$$

que asigna a cada conjunto simplicial X su realización geométrica, y a cada morfismo simplicial $f : X \rightarrow Y$ una flecha $|f| : |X| \rightarrow |Y|$ inducida por cada función $f_n \times 1 : X_n \times |\Delta^n| \rightarrow Y_n \times |\Delta^n|$.

Demostración. En primer lugar, notemos que las aplicaciones $\{f_n \times 1\}_{n \geq 1}$ inducen una función continua

$$\begin{array}{ccc} \coprod_{n \geq 0} X_n \times |\Delta^n| & \xrightarrow{\tilde{f}} & \coprod_{n \geq 0} Y_n \times |\Delta^n| \\ \uparrow & & \uparrow \\ X_n \times |\Delta^n| & \xrightarrow{f_n \times 1} & Y_n \times |\Delta^n| \end{array}$$

entre los coproductos. Como f es un morfismo simplicial, si $\theta : [m] \rightarrow [n]$ es un morfismo de posets entonces el diagrama

$$\begin{array}{ccc} X_n \times |\Delta^n| & \xrightarrow{X\theta} & X_m \times |\Delta^m| \\ f_n \times 1 \downarrow & & \downarrow f_m \times 1 \\ Y_n \times |\Delta^n| & \xrightarrow{Y\theta} & Y_m \times |\Delta^m| \end{array}$$

conmuta. Por lo tanto, se tiene que

$$\tilde{f}(X\theta(x), p) = (f_m X\theta(x), p) = (Y\theta f_n(x), p)$$

y

$$\tilde{f}(x, |\theta|(p)) = (f_n(x), |\theta|(p)),$$

lo que nos dice que \tilde{f} manda puntos relacionados en puntos relacionados. En consecuencia, está bien definida la función continua $|f| : |X| \rightarrow |Y|$ que envía $[(x, p)]$ a $[(f_n(x), p)]$ si $x \in X_n$, y de esta caracterización se deduce la funtorialidad de $|\cdot|$.



1.4. La adjunción entre la realización geométrica y el funtor singular

Como vimos en la sección anterior, la realización geométrica está directamente relacionada con el conjunto singular de un espacio topológico. El teorema que sigue describe explícitamente esta relación en términos de los funtores $|\cdot|$ y \mathcal{S} .

Teorema 1.4.1. Existe una adjunción

$$\begin{array}{ccc} & |\cdot| & \\ \text{Top} & \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \perp \\ \curvearrowleft \end{array} & \text{sSet} \\ & \mathcal{S} & \end{array}$$

En otras palabras, se tiene una biyección

$$\text{Top}(|X|, Y) \simeq \text{sSet}(X, \mathcal{S}(Y))$$

entre las funciones continuas $|X| \rightarrow Y$ y los morfismos simpliciales $X \rightarrow \mathcal{S}$. Más aún, esta biyección es natural tanto en X como en Y .

Demostración. Recordemos que hay una correspondencia biyectiva entre morfismos simpliciales $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$ y símplexes $x \in X_n$. Notamos σ_x al morfismo simplicial asociado a un símplex x . Vimos también que una función continua $g : |X| \rightarrow Y$ se corresponde unívocamente con una colección de funciones continuas $g_x : \Delta^{n_x} \rightarrow Y$ tales que

$$g([x, p]) = g_x(p)$$

para todo símplex $x \in X_n$ y $p \in |\Delta^n|$.

En vista de esto, definimos la aplicación

$$\begin{aligned} e : \text{Top}(|X|, Y) &\rightarrow \text{sSet}(X, \mathcal{S}(Y)) \\ g &\longmapsto e(g)(x) := g_x \end{aligned}$$

Como g es un morfismo cuyo dominio es $|X|$, las funciones g_x deben satisfacer

$$g_{X\theta(x)} = |\theta|^*(g_x)$$

para todo símplex x y morfismo de posets θ . En particular, esto prueba que $e(g)$ es efectivamente un morfismo de complejos simpliciales, por lo que e está bien definida.

Por otro lado, definimos otra aplicación

$$\begin{aligned} \rho : \text{sSet}(X, \mathcal{S}(Y)) &\rightarrow \text{Top}(|X|, Y) \\ f &\longmapsto \rho(f) \end{aligned}$$

del siguiente modo: dado un morfismo simplicial f , para cada $f_n : X_n \rightarrow \mathcal{S}(Y)_n$ definimos las funciones

$$\tilde{f}_n : (x, p) \in X_n \times |\Delta^n| \mapsto f_n(x)(p) \in Y,$$

las cuales inducen a su vez una función continua

$$\coprod_{n \geq 0} \tilde{f}_n : \coprod_{n \geq 0} X_n \times |\Delta^n| \rightarrow Y.$$

Como f es un morfismo simplicial, para cada $\theta \in \Delta(m, n)$ se tiene que

$$\widetilde{f}_m(X\theta(x), p) = (f_m X\theta)(x)(p) = |\theta|^*(f_n(x))(p) = (f_n(x)|\theta|)(p) = \widetilde{f}_n(x, |\theta|(p)).$$

Esto dice que la función $\coprod_{n \geq 0} \widetilde{f}_n$ pasa al cociente por las identificaciones de la realización geométrica, y por lo tanto, induce una aplicación continua $|X| \rightarrow Y$ que tomamos como imagen de f por ρ . Concretamente, dados $x \in X_n$ y $p \in |\Delta^n|$ es

$$\rho(f)([(x, p)]) = f_n(x)(p).$$

Veamos ahora que e y ρ son aplicaciones inversas. Si tomamos $f : X \rightarrow \mathcal{S}(Y)$ simplicial, es

$$e\rho(f)(x)(p) = \rho(f)([(x, p)]) = f_n(x)(p)$$

para todo $x \in X_n$ y $p \in |\Delta^n|$. Por lo tanto, se tiene que $e\rho(f) = f$ y, en general, $e\rho = 1$.

Recíprocamente, si $g : |X| \rightarrow Y$ es una función continua, entonces para cada $(x, p) \in X_n \times |\Delta^n|$ es

$$\rho e(g)([(x, p)]) = e(g)_n(x)(p) = g_x(p) = g([(x, p)]),$$

lo cual prueba que $\rho e = 1$.

Para terminar, veamos que el isomorfismo es natural tanto en X como en Y . Fijemos $g : |X| \rightarrow Y$ continua y $(x, p) \in X_n \times |\Delta^n|$. Dado un morfismo simplicial $f : X' \rightarrow X$, debemos ver que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \text{Top}(|X|, Y) & \xrightarrow{e} & \text{sSet}(X, \mathcal{S}(Y)) \\ |f|^* \downarrow & & \downarrow f^* \\ \text{Top}(|X'|, Y) & \xrightarrow{e} & \text{sSet}(X', \mathcal{S}(Y)) \end{array}$$

conmuta. Por un cálculo directo es

$$\begin{aligned} f^*(e(g))(x)(p) &= e(g)(f(x))(p) = g([(f(x), p)]) \\ &= g|f|([(x, p)]) = e(g|f|)(x)(p) \\ &= e(|f|^*(g))(x)(p), \end{aligned}$$

y por lo tanto $f^*e = e|f|^*$. Del mismo modo, si $f : Y \rightarrow Y'$ es continua entonces

$$\begin{array}{ccc} \text{Top}(|X|, Y) & \xrightarrow{e} & \text{sSet}(X, \mathcal{S}(Y)) \\ f_* \downarrow & & \downarrow f_* \\ \text{Top}(|X|, Y') & \xrightarrow{e} & \text{sSet}(X, \mathcal{S}(Y')) \end{array}$$

conmuta pues

$$\begin{aligned} f_*(e(g))(x)(p) &= f(e(g)(x)(p)) = fg([(x, p)]) \\ &= e(fg)(x)(p) = e(f_*(g))(x)(p). \end{aligned}$$



Observación 1.4.1. En [1] se encuentra una demostración «puramente categórica» del teorema anterior usando que todo pre haz es un colímite de funtores representables, y que las realizaciones geométricas son colímites de símlices (topológicos) estándar.

Concretamente, usando la relacion entre funtores hom y colímites (ver [3], sección 3.4) es

$$\begin{aligned}
 \mathrm{Top}(|X|, Y) &\simeq \operatorname{colim}_{\substack{\Delta^n \rightarrow X \\ \text{en } \Delta \downarrow X}} \mathrm{Top}(|\Delta^n|, Y) \\
 &\simeq \operatorname{colim}_{\substack{\Delta^n \rightarrow X \\ \text{en } \Delta \downarrow X}} \mathrm{sSet}(\Delta^n, \mathcal{S}(Y)) \\
 &\simeq \mathrm{sSet}(X, \mathcal{S}(Y)).
 \end{aligned}$$

Bibliografía

- [1] P. Goerss y J. Jardine, *Simplicial Homotopy Theory*. Birkhäuser, 2010.
- [2] G. Friedman. *An elementary introduction to simplicial sets*, arXiv:0809.4221v5 [at], 2016.
- [3] E. Riehl. *Category Theory in Context*. Dover, 2016.