

Plano Personalizado de Calistenia

Muscle-up estrito e handstand walk

Guilherme · 1,77 m · 92 a 95 kg · 6 anos de musculação · Parque Tingui e academia

O que você vai encontrar

1. Avaliação física a partir das fotos e dos seus dados
2. Peso e gordura: onde você está, onde “definido” fica e a resposta para 76 a 80 kg
3. Testes iniciais que você faz nesta semana e me envia
4. Como encaixar calistenia e musculação na mesma semana
5. Trilha do muscle-up: fases, critérios e sessão modelo
6. Trilha do handstand walk: fases, critérios e prática diária
7. Semana-modelo detalhada: bloco de 12 semanas
8. Nutrição prática para o déficit sem perder músculo
9. Acompanhamento: o que medir e quando

1. Avaliação física

Base: cinco fotos em espelho (frente, lateral, dupla bíceps, frente na academia e frente em casa), 1,77 m, 92 a 95 kg, 6 anos de musculação. Avaliação por foto tem limite: não mede dobras, não mede força e a luz muda muito a leitura. Trate os números abaixo como estimativa a confirmar com os testes do capítulo 3 e com uma medida de composição corporal.

O que as fotos mostram

Região	Leitura	O que isso significa para calistenia
Ombros, trapézio e braços	Bem desenvolvidos, com volume de deltoide e bíceps evidente na dupla bíceps. Antebraço proporcional.	Força de empurrar e de pegada já existem. Dip em paralelas e dip na barra reta vão vir rápido.
Peitoral e dorsal	Peitoral cheio; dorsal com largura visível na foto de costas e na lateral.	Base muscular para barra fixa pesada. O que limita a barra hoje é o peso, não o músculo.
Tronco e abdômen	Gordura concentrada no abdômen inferior e flancos. Sem definição abdominal visível em nenhuma foto. Cintura visivelmente maior que o quadril na lateral.	É o que separa você do “definido”. Também é peso morto em toda repetição na barra e no handstand.
Pernas	Coxa e panturrilha com volume, proporcionais ao tronco.	Boa base para pistol squat mais à frente. Não é prioridade agora.
Postura	Nas fotos relaxadas, ombros levemente projetados à frente e cabeça adiantada. Padrão comum em quem treina muito peito e pouco a parte posterior.	Para o handstand você precisa de flexão de ombro completa (braço alinhado com a orelha). Isso precisa de teste e, provavelmente, de trabalho de mobilidade.

Estimativa de composição corporal

Medida	Estimativa	Como confirmar
Percentual de gordura	22% a 26%	Dobras cutâneas com avaliador, bioimpedância em jejum ou DEXA. Peça o laudo com massa magra em kg.
Massa magra (músculo, osso, água)	70 a 72 kg	Sai da mesma avaliação. É o número que define as metas de peso do capítulo 2.
Massa gorda	21 a 24 kg	Idem.
Circunferência de cintura (na altura do umbigo)	Provavelmente 96 a 102 cm	Fita métrica, em pé, relaxado, ao fim da expiração. Meça agora: é a medida mais útil para acompanhar.

Resumo em uma frase

Você tem força absoluta e massa muscular de sobra para as duas habilidades. O que falta é força relativa (força dividida pelo peso) e duas qualidades que a musculação não treina: controle de corpo invertido e explosão na puxada. O plano ataca os três ao mesmo tempo: déficit calórico moderado, barra com carga para subir a força absoluta ainda mais, e prática diária de handstand.

2. Peso e gordura: a resposta para “76 a 80 kg”

“Definido” no sentido comum, com abdômen visível em repouso e separação entre os músculos, costuma aparecer entre 12% e 15% de gordura em homens. O peso em que isso acontece depende da sua massa magra. Usando a estimativa de 71 kg de massa magra e supondo que você a preserve:

Gordura corporal	Peso correspondente	Como fica	Viabilidade para você
24% (hoje, estimado)	93 kg	Forte, sem definição.	Ponto de partida.
20%	89 kg	Cintura menor, contorno do peitoral e ombro mais nítido.	Meta 1. Realista em 8 a 10 semanas.
15%	83 a 84 kg	Abdômen superior visível, braços e ombros com separação. A maioria chama isso de definido.	Meta 2. Realista em 5 a 6 meses.
12%	80 a 81 kg	Abdômen inteiro visível, veias no braço. Nível “foto de praia”.	Meta 3, se quiser. 7 a 9 meses. Exige rigor com comida.
10%	79 kg	Muito seco. Força cai, sono e humor pioram, fome constante.	Difícil de manter. Não recomendado como meta de longo prazo.
8%	77 kg	Nível de atleta de fisiculturismo em competição.	Não sustentável. Perda de massa magra quase garantida.

A resposta direta

- **Não, você não precisa chegar a 76 a 80 kg.** Com a sua massa magra, 76 a 78 kg significaria algo em torno de 7% a 9% de gordura: nível de palco, não de vida real. Você perderia músculo e força no processo.
- **Definido, para o seu corpo, fica entre 80 e 84 kg.** É aí que o abdômen aparece mantendo o visual “parrudo” que você já tem. Se a avaliação de composição mostrar mais massa magra do que estimei, a faixa sobe (74 kg de massa magra, por exemplo, coloca o definido em 84 a 87 kg).
- **Ritmo:** 0,5 a 0,7 kg por semana. Mais rápido que isso, com 6 anos de treino, você perde músculo junto. Isso dá 10 kg em 4 a 5 meses, com um ou dois platôs no caminho.
- **Efeito na calistenia:** cada quilo a menos é um quilo a menos em cada barra fixa, dip, negativa e segundo de handstand. Perder 10 kg equivale a tirar um colete de 10 kg de todo exercício. É a intervenção que mais acelera o muscle-up.

Metas em cintura (mais confiáveis que a balança no dia a dia)

Momento	Cintura no umbigo	Peso aproximado
Hoje	medir	93 kg
Meta 1 (semana 10)	menos 5 a 6 cm	88 a 89 kg
Meta 2 (mês 5 a 6)	abaixo de 88 cm	83 a 84 kg
Meta 3 (mês 8, opcional)	abaixo de 84 cm	80 a 81 kg

3. Testes iniciais: faça nesta semana e me envie

Descansado, depois de aquecer, 3 minutos entre testes. Pode dividir em dois dias (força num dia, handstand e mobilidade no outro). Grave em vídeo lateral a barra fixa, o dip e o handstand na parede: a técnica diz mais do que o número.

Teste	Como fazer	Faixas de referência para o seu caso	Para quê
Barra fixa estrita, máximo	Pegada pronada, braços totalmente estendidos embaixo, queixo acima da barra, sem balanço.	0 a 3: foco em barra com carga e negativas 4 a 7: esperado para 93 kg com sua massa 8 ou mais: já pode iniciar trabalho de transição	Define a fase de entrada da trilha do muscle-up.
Dip em paralelas estrito, máximo	Cotovelo a 90° embaixo, braço estendido em cima, sem balanço.	menos de 8: dip assistido e com carga leve 8 a 14: esperado 15 ou mais: iniciar dip na barra reta	Segunda metade do muscle-up.
Barra até o peito (chest-to-bar), máximo	Igual à barra, mas a barra toca o peito.	0: normal no início 3 ou mais: ótimo sinal	Mede a puxada alta.
Pendurado na barra, máximo	Pegada pronada, ombros ativos.	menos de 40 s: pegada é limitante 40 a 75 s: ok mais de 75 s: ótimo	Pegada para false grip.
Handstand na parede, peito para a parede	Suba pela parede (wall walk) até ficar com o peito e o nariz a 10 cm da parede. Cronometre.	menos de 20 s: fase 0 20 a 45 s: fase 1 mais de 45 s: iniciar saídas da parede	Define a fase de entrada do handstand.
Mobilidade de ombro	Costas na parede, pés a 10 cm, lombar colada. Suba os braços estendidos até tocar a parede acima da cabeça, polegares para trás.	Toca com a lombar colada: ok Só toca arqueando a lombar: limitada Não toca: muito limitada	Sem isso, o handstand vira “banana” e sobrecarrega a lombar.
Mobilidade de punho	Quatro apoios, dedos para frente, leve o ombro à frente das mãos.	Ombro passa de 15 cm à frente do punho sem dor: ok Dor ou travamento: preparar punhos por 3 semanas antes de carregar	Punho carrega o corpo inteiro no handstand.
Hollow hold	Deitado, lombar colada, pernas e ombros a 15 cm do chão, braços ao lado da orelha.	menos de 20 s: fraco 20 a 45 s: ok mais de 45 s: bom	É a “linha” do handstand.
L-sit nas paralelas	Braços estendidos, pernas retas na horizontal.	0 s: normal 5 s ou mais: bom	Compressão e core para o futuro.

4. Como encaixar calistenia e musculação na semana

Você não precisa largar a musculação. Ela é o que vai preservar sua massa magra no déficit e é a ferramenta mais eficiente para subir a força absoluta da barra. O que muda é a ordem e o foco: habilidade primeiro, descansado; força depois; hipertrofia por último. Três regras:

- **Handstand todo dia, 10 a 15 minutos, no início de qualquer treino.** Equilíbrio é habilidade motora: frequência vale mais que volume. Não cansa a ponto de atrapalhar o resto.
- **Trabalho de barra sempre descansado.** Nos dias de puxar, a barra (com carga, explosiva ou negativas de muscle-up) vem antes de qualquer remada ou puxada de máquina.
- **Pernas e hipertrofia de braço continuam na academia,** em volume reduzido durante o déficit (2 a 3 séries por exercício, perto da falha, menos exercícios).

Semana recomendada

Dia	Local	Sessão	Duração
Segunda	Parque Tingui	Handstand 15 min + Puxar: trilha do muscle-up (barra com carga ou negativas) + remada australiana + core	60 a 70 min
Terça	Academia	Handstand 10 min + Pernas (agachamento, terra romeno ou stiff, afundo, panturrilha) + abdominal	60 min
Quarta	Parque ou academia	Handstand 15 min + Empurrar: dips (paralelas, com carga quando passar de 12), flexão com pés elevados ou pike push-up, desenvolvimento	60 min
Quinta	Casa	Handstand 10 min + mobilidade de ombro e punho 15 min. Caminhada ou corrida leve (Nike Run Club)	30 a 40 min
Sexta	Parque Tingui	Handstand 15 min + Puxar: barra explosiva e chest-to-bar, remada pesada, bíceps leve + core	60 a 70 min
Sábado	Academia ou parque	Handstand 10 min + Sessão mista leve: dips, remada, superman, L-sit. Ou pernas, se preferir pernas 2x	45 min
Domingo	-	Descanso completo. Caminhada longa se quiser.	-

Se só puder treinar 4 dias: segunda, terça, quarta e sexta. Handstand continua diário em casa, mesmo que sejam 5 minutos na parede.

5. Trilha do muscle-up

Diferente de um iniciante, você já tem o músculo. A trilha explora isso: barra com carga para subir a força absoluta enquanto o peso desce, e trabalho técnico de puxada alta e transição assim que a barra estrita passar de 8. Avance pelos critérios, não pelo calendário.



Fase	Entra quando	Critério para sair	Exercícios principais (2x por semana)	Tempo estimado
1. Força absoluta	Barra estrita abaixo de 8	8 barras estritas, 12 dips em paralelas	Barra com carga (colete ou cinto com anilha): 5 x 3 a 5, pesado. Barra sem carga 2 x máximo menos 1. Dip em paralelas 4 x 8 a 12. Negativas lentas de 5 s quando a barra falhar.	2 a 4 meses, mais rápido conforme o peso cai
2. Puxada alta	8 barras estritas	Barra até o umbigo 3 x 3; dip na barra reta 3 x 5; negativa de muscle-up de 5 s, 3 x 3	Barra explosiva (puxar o mais rápido possível, meta: barra no peito baixo) 5 x 3. Chest-to-bar 3 x 5. Dip na barra reta com pé no apoio 4 x 5. Negativas de muscle-up 3 x 3. False grip pendurado 3 x 15 s.	2 a 3 meses
3. Transição	Critérios da fase 2	Muscle-up com faixa fina 3 x 3 limpos	Muscle-up com faixa elástica (começa grossa, afina a cada 2 semanas) 5 x 2 a 3. Transição na barra baixa com pés no chão 3 x 5. Barra explosiva 3 x 3. Dip na barra reta sem apoio 3 x 5.	1 a 3 meses
4. Muscle-up	Primeiro muscle-up estrito	3 x 3 limpos, sem kip	Muscle-up em séries baixas 5 x 1 a 2, sempre descansado. Manter barra com carga 1x por semana. Nunca mais de 5 tentativas máximas por sessão.	Consolidação: 1 a 2 meses

Estimativa total para você: 6 a 12 meses até o primeiro muscle-up estrito, com o déficit andando junto. Sem perder peso, dobra.

Sessão modelo de puxar (fase 1), parque, segunda-feira

#	Exercício	Séries x repetições	Descanso
0	Handstand (capítulo 6)	15 min	-
1	Aquecimento específico: pendurado 2 x 15 s, escapular pull 2 x 6, remada australiana leve 2 x 8	-	-
2	Barra fixa com carga (mochila com anilhas ou garrafas de água, ou cinto na academia)	5 x 3 a 5, carga que falha na 6ª	2 a 3 min
3	Barra fixa sem carga	2 x máximo menos 1	2 min
4	Remada australiana com pés elevados, pausa de 2 s em cima	3 x 8 a 12	90 s
5	Elevação de joelhos ou pernas pendurado (controlado, sem balanço)	3 x 8 a 12	60 s
6	Pendurado passivo na cromada + alongamento de antebraço	2 x 30 s	-


Na sexta, troque o item 2 por barra explosiva 5 x 3 (sem carga, puxar o mais rápido possível) e o item 3 por negativas lentas 3 x 3, a partir do momento em que fizer 6 barras estritas.

Cuidados específicos para o seu perfil

- **Cotovelo:** peso alto mais barra com carga é a combinação que mais gera epicondilite medial. Suba a carga no máximo 2,5 kg por semana. Dor na parte interna do cotovelo que não some em 48 h: troque barra pronada por neutra ou supinada por 2 semanas e corte volume pela metade.
- **Ombro:** você tem muito peitoral e, pela postura, provavelmente rotação interna aumentada. Faça pull ou remada alta com elástico 3 x 15 em todo treino de empurrar, e alongamento de peitoral diário.
- **Pegada:** a barra de ferro do Tinguí é a ideal para barra com carga. Magnésio ajuda. Luva não, atrapalha a sensação para o false grip depois.

6. Trilha do handstand walk

Caminhar de ponta-cabeça é a última etapa de uma cadeia: punhos que aguentam, ombros que abrem por completo, parada de mão na parede com linha reta, parada livre com equilíbrio nas mãos e, só então, transferência de peso para dar passos. A prática é diária e curta. É mais parecido com aprender a andar de bicicleta do que com treinar peito.



Fase	Critério para sair	Prática diária (10 a 15 min)	Tempo estimado
0. Preparação	Mobilidade de ombro "ok" no teste; punhos sem dor em flexão carregada; hollow hold 45 s	Mobilidade de ombro 5 min (alongamento de peitoral no batente, dorsal pendurado, braços na parede). Punhos 3 min (círculos, flexão e extensão em quatro apoios, dedos para trás). Hollow hold 3 x 20 a 45 s. Prancha 3 x 45 s. Parede peito para a parede 3 x 20 s.	3 a 6 semanas. Pode rodar junto com a fase 1.
1. Parede	60 s peito para a parede com corpo reto, costelas fechadas, só os dedos dos pés encostando	Wall walk até peito para a parede, 4 x 30 a 60 s. Toques de ombro na parede (shoulder taps) 3 x 6 por lado. Apoio dos calcanhares (heel pulls): tirar um pé e depois os dois da parede por 1 a 3 s, 10 tentativas.	1 a 2 meses
2. Entrada e equilíbrio	Entrada com chute parando perto da parede sem bater; 5 s livre com parede a 30 cm	Entrada com chute, de frente para a parede a 30 cm, 15 tentativas. Heel pulls e toe pulls 10 tentativas. Aprender a sair: cambalhota para a frente ou "estrela" de lado, 10 por dia até ficar automático.	1 a 3 meses
3. Livre	30 s em pé livre, em linha, com 3 de cada 5 tentativas acima de 10 s	Tentativas livres em grama ou tatame: 10 a 15 tentativas de até 30 s, descansando 1 min. Correções só com os dedos e punhos (não com a lombar). Filmar de lado 1x por semana.	3 a 6 meses de prática diária

Fase	Critério para sair	Prática diária (10 a 15 min)	Tempo estimado
4. Caminhada	5 m em linha reta sem cair	Na parede: transferir peso para uma mão e levantar a outra 1 cm, 3 x 10 por lado. Livre: inclinar levemente para a frente e dar 1 passo, depois 2, depois 3. Passos pequenos, pernas levemente afastadas para equilibrar. Meta diária: 10 tentativas de caminhar.	2 a 4 meses depois dos 30 s livre

Estimativa total para você: 8 a 15 meses até caminhar 5 metros. A mobilidade de ombro é o que mais costuma atrasar quem vem da musculação. A perda de peso ajuda menos aqui do que no muscle-up, mas ajuda os punhos.

Regras do handstand

- **Linha reta:** mãos na largura dos ombros, dedos abertos agarrando o chão, braços travados, ombros empurrando o chão (orelhas longe dos ombros), costelas fechadas, glúteo contraído, pés em ponta. Se a lombar arqueia (“banana”), falta mobilidade de ombro, não força.
- **Equilíbrio é nos dedos:** caindo para a frente (lado da barriga), aperte os dedos no chão. Caindo para trás (lado das costas), empurre a base da palma e feche um pouco o ombro. Lombar não participa.
- **Peito para a parede é obrigatório.** Costas para a parede ensina a “banana”. Só use costas para a parede para praticar a entrada com chute.
- **Onde treinar no Tinguí:** grama plana para as tentativas livres e a caminhada, piso firme perto das barras para a parede (use um poste ou árvore grossa como parede). Em casa, parede lisa com 2 m livres à frente.
- **Punhos doendo:** normal nas 3 primeiras semanas, até certo ponto. Dor aguda, não. Aqueça sempre, use paralelas baixas (parallettes) para alternar quando o punho reclamar, e pare o dia se doer durante a prática.

7. Bloco de 12 semanas, detalhado

Três blocos de 4 semanas. Em cada bloco, as 3 primeiras semanas sobem carga ou volume, e a 4ª é mais leve (metade das séries) para os tendões recuperarem. No fim de cada bloco: refaça os testes do capítulo 3, meça cintura e peso, tire as três fotos padrão.

Bloco	Semanas	Foco de puxar	Foco de empurrar	Handstand	Déficit
1	1 a 4	Barra com carga 5 x 3 a 5 (2x por semana). Negativas 5 s.	Dip em paralelas 4 x 8 a 12. Face pull em todo treino.	Fases 0 e 1: mobilidade + parede.	Começa. Meta: menos 2 a 3 kg.
2	5 a 8	Barra com carga 5 x 3 (1x), barra explosiva 5 x 3 (1x). Chest-to-bar quando possível.	Dip com carga 4 x 6 a 8 se já faz 12. Dip na barra reta com apoio 3 x 5.	Fase 1 e começo da 2: heel pulls e entrada com chute.	Meta: menos 2 a 3 kg. Peso em torno de 88 kg.
3	9 a 12	Se tiver 8 estritas: fase 2 completa com negativas de muscle-up e false grip. Se não: repete bloco 2 mais pesado.	Dip na barra reta 4 x 5. Pike push-up elevado 3 x 8 para o ombro.	Fase 2: tentativas livres curtas perto da parede.	Meta: menos 2 kg. Cintura menos 5 a 6 cm desde o início.

Treino de pernas na academia, durante o déficit (terça)

#	Exercício	Séries x repetições	Descanso
1	Agachamento livre ou hack	3 x 6 a 8	2 a 3 min
2	Terra romeno ou stiff	3 x 8 a 10	2 min
3	Afundo com halteres ou búlgaro	2 x 8 a 10 por perna	90 s
4	Panturrilha	3 x 12 a 15	60 s
5	Hollow hold + prancha lateral	3 x 30 a 45 s cada	45 s

Treino de empurrar (quarta)

#	Exercício	Séries x repetições	Descanso
0	Handstand (fase atual)	15 min	-
1	Dip em paralelas (com carga a partir de 12 estritos)	4 x 6 a 12	2 min
2	Pike push-up com pés elevados (ombro, prepara o handstand push-up)	3 x 6 a 10	90 s
3	Flexão com pés elevados ou supino	3 x 8 a 12	90 s
4	Face pull ou remada alta com elástico	3 x 15	60 s
5	Tríceps na polia ou dip no banco	2 x 12 a 15	60 s
6	Alongamento de peitoral e punho	3 min	-

8. Nutrição prática para o déficit

Não é dieta, é um déficit moderado que você consegue manter por 5 meses. Os números são ponto de partida: ajuste pela média semanal da balança, não pelo dia.

Item	Alvo	Como
Gasto estimado (manutenção)	2.900 a 3.100 kcal/dia	Homem de 93 kg, 6 treinos por semana e trajeto a pé ao parque. Confirme: se o peso ficar estável por 2 semanas comendo X, X é a sua manutenção.
Ingestão alvo	2.400 a 2.600 kcal/dia	Déficit de 500 kcal, para perder 0,5 kg por semana. Dias de treino pesado no topo da faixa, descanso na base.
Proteína	180 a 190 g/dia (2 g por kg)	Protege a massa magra no déficit. Divida em 4 refeições de 45 g: 200 g de frango, 5 ovos, 250 g de iogurte grego, um scoop de whey são cerca de 40 a 50 g cada.
Carboidrato	250 a 300 g/dia	Prioridade nas refeições em torno do treino. Arroz, batata, aveia, fruta, pão. Não corte: a barra explosiva e o handstand pedem energia.
Gordura	60 a 75 g/dia	O que sobra. Azeite, ovos, castanhas, carne. Abaixo de 50 g começa a mexer com hormônio.
Fibra e volume	30 g de fibra, 500 g de verduras e legumes	Mata a fome do déficit. Salada grande em duas refeições.
Água	3 a 3,5 litros	Mais nos dias de parque.
Álcool	Mínimo	Cada cerveja são 150 kcal vazias e pior recuperação. Se for beber, conte.

Regras de ajuste

- Pese-se todo dia de manhã, depois do banheiro, e use a média da semana. Compare médias, nunca dias.
- Média caiu 0,4 a 0,8 kg: não mexa. Caiu menos de 0,3 kg por 2 semanas seguidas: tire 150 a 200 kcal de carboidrato ou gordura. Caiu mais de 1 kg: adicione 150 kcal.
- Força na barra com carga caindo 2 semanas seguidas, com sono em dia: déficit grande demais. Suba 200 kcal.
- A cada 8 semanas de déficit, faça 1 semana comendo na manutenção. Recupera hormônios, sono e humor, e a semana leve do bloco 3 é o lugar certo.
- Creatina 3 a 5 g por dia é o único suplemento que vale a pena aqui. Whey só se não bater a proteína com comida. Caféina antes do treino, se já usa.

9. Acompanhamento

Medida	Frequência	Como
Peso	Diário, média semanal	Mesma balança, mesma hora.
Cintura no umbigo	Semanal	Fita, relaxado, fim da expiração.
Fotos padrão	A cada 4 semanas	Frente, lado e costas, de short, mesma luz e mesmo lugar, braços relaxados. Elas mostram o que a balança esconde.
Testes do capítulo 3	A cada 4 semanas, fim de bloco	Mesma ordem, mesmo descanso. Vídeo lateral da barra e do handstand.
Composição corporal	Agora e a cada 3 meses	Dobras com o mesmo avaliador, ou DEXA. Peça massa magra em kg.
Carga da barra com carga	Toda sessão	Anote peso e repetições. Deve subir ou manter enquanto o peso corporal cai: é o sinal de que a força relativa está indo para cima.

Me envie os resultados dos testes do capítulo 3, a cintura e o laudo de composição, se fizer. Com isso eu ajusto as fases de entrada, as cargas e as metas de peso para números reais em vez de estimativa. Os diagramas detalhados dos exercícios base e o trajeto de casa até as barras estão no PDF anterior, que continua valendo como referência.