

# Das Selbst- versorger-Jahr

---

Zwölf Monate ernten auf 40 Quadratmetern. Ein Anbau-, Nachsaat- und Einlagerungsplan für den deutschen Garten.

# Was in diesem Buch steht

Acht Kapitel, aufeinander aufbauend. Wer zum ersten Mal anbaut, liest Kapitel 8 zuerst.

**01 Die Fläche einteilen**

40 m<sup>2</sup> in vier Beete, Wege und einen Kompostplatz — mit Maßen

---

**02 Der Aussaatkalender**

Monat für Monat: säen, pflanzen, ernten, einlagern

---

**03 Fruchtfolge ohne Tabelle im Kopf**

Vier Beete, vier Jahre, ein Rotationsschema

---

**04 Nachsaat: die eigentliche Verdopplung**

Dieselbe Fläche zweimal beernten

---

**05 Wintergemüse**

Was von November bis März draußen steht

---

**06 Einlagern statt wegwerfen**

Temperaturen, Luftfeuchte und Haltbarkeit je Kultur

---

**07 Einkochen und Fermentieren**

Die Grundverfahren — mit einem klaren Wort zur Sicherheit

---

**08 Das erste Jahr realistisch**

Sieben Kulturen statt einunddreißig, und was garantiert scheitert

---

## Die Fläche einteilen

Bevor irgendetwas gesät wird, wird gemessen. Ein Beet, das man nicht von beiden Seiten erreicht, wird betreten — und ein betretener Boden verdichtet.

### Die Grundregel: 1,20 Meter

Ein Beet ist so breit, dass Sie die Mitte von beiden Seiten erreichen, ohne hineinzutreten. Für die meisten Menschen sind das 1,20 m. Alles darüber führt dazu, dass Sie irgendwann doch hineinsteigen, meist im Mai, wenn es eilt.

### Die Aufteilung von 40 m<sup>2</sup>

| ELEMENT            | MASS                    | FLÄCHE              |
|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Beet A bis D       | je 1,20 × 6,00 m        | 28,8 m <sup>2</sup> |
| Hauptweg           | 0,60 × 6,00 m           | 3,6 m <sup>2</sup>  |
| Trennwege (3×)     | je 0,40 × 6,00 m        | 7,2 m <sup>2</sup>  |
| Kompost und Geräte | Ecke, ca. 1,20 × 1,20 m | 1,4 m <sup>2</sup>  |

Knapp 29 m<sup>2</sup> reine Anbaufläche. Die 11 m<sup>2</sup> Weg sind kein Verlust — sie sind der Grund, warum der Boden locker bleibt.

### Wege richtig anlegen

Rindenmulch oder Holzhäcksels, 5 cm hoch, auf Pappe. Die Pappe erstickt das Gras im ersten Jahr und ist nach zwei Jahren verrottet. Kies ist ein Fehler: Er wandert in die Beete und bleibt dort für immer.

#### WENN SIE WENIGER PLATZ HABEN

Bei 20 m<sup>2</sup> halbieren Sie die Beetlänge auf 3 m, nicht die Anzahl der Beete. Die vier Beete werden für die Fruchtfolge in Kapitel 3 gebraucht — drei Beete brechen das System.

### Himmelsrichtung

Beete möglichst in Nord-Süd-Richtung anlegen, damit beide Beetseiten gleich viel Sonne bekommen. Hohe Kulturen — Stangenbohnen, Tomaten, Mais — kommen ans Nordende, sonst beschatten sie den Rest.

# Der Aussaatkalender

Der Kalender ist das Herz des Plans. Er ist auf mittlere Lagen ausgelegt. Norddeutschland und Höhenlagen verschieben um ein bis zwei Wochen nach hinten, Weinbauklima um ein bis zwei Wochen nach vorn.

| MONAT     | VORZIEHEN & SÄEN                                                                       | ERNTEN & EINLAGERN                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Januar    | Chili und Paprika auf der Fensterbank. Saatgut bestellen, Beetplan festlegen.          | Grünkohl, Rosenkohl, Porree, Feldsalat                               |
| Februar   | Tomaten vorkultivieren (ab Monatsmitte). Frühbeet vorbereiten. Kartoffeln vorkeimen.   | Feldsalat, Pastinake, Winterportulak                                 |
| März      | Radieschen, Spinat, Erbsen, Möhren direkt säen. Kohl und Salat vorziehen.              | Letzter Feldsalat, erster Bärlauch                                   |
| April     | Kartoffeln legen. Kohl auspflanzen. Zwiebeln stecken. Möhren nachsäen.                 | Radieschen, Spinat, Rhabarber                                        |
| Mai       | <b>Nach den Eisheiligen (15. Mai):</b> Tomaten, Gurken, Zucchini, Bohnen ins Freiland. | Salat, Radieschen, Spinat, erste Erbsen                              |
| Juni      | Nachsaat startet: Buschbohnen, Herbstsalat, Rote Bete. Grünkohl vorziehen.             | Erbsen, Salat, Kohlrabi, Mangold                                     |
| Juli      | Letzte Buschbohnen. Wintergemüse säen: Grünkohl auspflanzen, Winterportulak.           | Zucchini, Bohnen, erste Tomaten.<br><b>Einkochen beginnt.</b>        |
| August    | Feldsalat, Winterspinat, Rucola säen. Zuckerhut pflanzen.                              | Hauptsaison: Tomaten, Gurken, Bohnen, Zwiebeln. <b>Fermentieren.</b> |
| September | Letzte Chance für Feldsalat. Knoblauch stecken.                                        | Kartoffeln, Kürbis, Rote Bete, Möhren.<br><b>Einlagern beginnt.</b>  |
| Oktober   | Winterheckenzwiebel. Beete abdecken oder Gründüngung säen.                             | Pastinake, Porree, Kürbis, letzte Möhren                             |
| November  | Nichts mehr säen. Kompost umsetzen, Geräte reinigen.                                   | Rosenkohl, Porree, Feldsalat, Zuckerhut                              |
| Dezember  | Planung fürs Folgejahr, Fruchtfolge um ein Beet weiterdrehen.                          | <b>Grünkohl — erst nach dem ersten Frost.</b>                        |

## DIE EISHEILIGEN

Vom 11. bis 15. Mai — Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und die Kalte Sophie. Es ist keine Bauernregel aus Aberglauben, sondern eine statistisch belegte Spätfrostperiode. Wer Tomaten am 5. Mai auspflanzt, gewinnt zehn Tage oder verliert die ganze Pflanze.

# Fruchtfolge ohne Tabelle im Kopf

Dieselbe Kultur zweimal hintereinander auf demselben Beet zehrt den Boden einseitig aus und züchtet die passenden Krankheiten heran. Die Lösung ist kein Regelwerk, sondern ein Kreis mit vier Positionen.

## Die vier Gruppen

| GRUPPE        | KULTUREN                                                           | NÄHRSTOFFBEDARF                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Starkzehrer   | Kohl, Kartoffeln, Kürbis, Zucchini, Tomaten, Gurken, Mais          | Hoch — Kompost im Frühjahr     |
| Mittelzehrer  | Möhren, Zwiebeln, Rote Bete, Mangold, Spinat, Porree, Knoblauch    | Mittel — kein frischer Kompost |
| Schwachzehrer | Salat, Radieschen, Feldsalat, Kräuter, Rucola, Erbsen als Nachsaat | Gering — nichts zusätzlich     |
| Leguminosen   | Erbsen, Bohnen, Klee als Gründüngung                               | Reichern Stickstoff an         |

## Der Kreis

Jedes Beet durchläuft die vier Positionen in vier Jahren. Im Jahr 5 beginnt es von vorn — und der Boden hat sich in der Leguminosen-Phase erholt.

| BEET | JAHR 1        | JAHR 2        | JAHR 3        | JAHR 4        |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A    | Starkzehrer   | Mittelzehrer  | Schwachzehrer | Leguminosen   |
| B    | Mittelzehrer  | Schwachzehrer | Leguminosen   | Starkzehrer   |
| C    | Schwachzehrer | Leguminosen   | Starkzehrer   | Mittelzehrer  |
| D    | Leguminosen   | Starkzehrer   | Mittelzehrer  | Schwachzehrer |

Sie müssen sich nichts merken. Schreiben Sie im Dezember die vier Wörter auf vier Holzstecker und stecken Sie sie ein Beet weiter.

### DIE EINE AUSNAHME

Kartoffeln und Tomaten sind beide Nachtschattengewächse und teilen sich die Krautfäule. Sie gehören nie ins selbe Beet und nie direkt nacheinander — auch wenn beide Starkzehrer sind. Tomaten deshalb besser ans Beetende oder in einen geschützten Extraplatz.

## Nachsaat: die eigentliche Verdopplung

Der Unterschied zwischen einem Garten, der von Juni bis September liefert, und einem, der zwölf Monate liefert, ist nicht die Fläche. Es ist die zweite Runde auf derselben Fläche.

### Das Prinzip

Frühe Kulturen räumen das Beet im Juni oder Juli. Wer dann nichts nachsät, lässt die halbe Saison ungenutzt. Entscheidend ist, dass die Nachsaat schon vorbereitet ist, wenn geerntet wird — nicht erst dann besorgt wird.

### Bewährte Paare

| ERSTE KULTUR   | RÄUMT DAS BEET | NACHSAAT                            |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Radieschen     | Mai            | Möhren oder Buschbohnen             |
| Frühe Erbsen   | Juni           | Herbstsalat, Rote Bete, Buschbohnen |
| Frühkartoffeln | Juli           | Feldsalat oder Winterspinat         |
| Kopfsalat      | Juni           | Grünkohl auspflanzen                |
| Buschbohnen    | August         | Feldsalat, Rucola, Winterportulak   |
| Zwiebeln       | August         | Feldsalat oder Gründüngung          |

### Die Faustregel für den letzten Termin

Zählen Sie die Kulturdauer von der Aussaat bis zur Ernte und rechnen Sie vom ersten erwarteten Frost rückwärts. Bei Feldsalat sind das etwa zehn Wochen. Bei einem ersten Frost Anfang November heißt das: letzte Aussaat Mitte August, allerspätestens Anfang September.

#### DER FEHLER, DEN FAST ALLE MACHEN

Im Juni ist der Garten voll, es ist heiß, und Nachsäen fühlt sich unnötig an. Im Januar steht das Beet leer und man kauft Feldsalat im Supermarkt. Die Nachsaat entscheidet sich im Juni, nicht im Januar.

## Wintergemüse

Es gibt Gemüse, das den deutschen Winter im Freiland übersteht. Nicht viel davon, aber genug, um von November bis März frisch zu ernten.

| KULTUR          | AUSSAAT                           | ERNTE        | FROSTHÄRTE     |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Grünkohl        | Mai–Juni vorziehen, Juli pflanzen | Nov–Feb      | bis –15 °C     |
| Feldsalat       | Aug–Sep                           | Nov–März     | bis –15 °C     |
| Rosenkohl       | April vorziehen, Mai pflanzen     | Nov–Jan      | bis –10 °C     |
| Porree (Winter) | März vorziehen, Mai pflanzen      | Nov–März     | bis –15 °C     |
| Pastinake       | April–Mai direkt                  | Okt–März     | bis –10 °C     |
| Winterspinat    | Aug–Sep                           | Okt und März | bis –10 °C     |
| Winterportulak  | Sep–Okt                           | Dez–März     | sehr hart      |
| Zuckerhut       | Juli säen                         | Okt–Nov      | leichter Frost |

### Grünkohl und der Frost

Die Regel, Grünkohl erst nach dem ersten Frost zu ernten, ist keine Folklore. Bei Kälte baut die Pflanze Stärke zu Zucker um — als Frostschutz. Das schmeckt man. Vor dem Frost geernteter Grünkohl ist deutlich bitterer.

### Abdecken

Ein Vlies oder ein Tunnel bringt etwa zwei bis drei Wochen zusätzliche Erntezeit an beiden Enden des Winters. Wichtiger als Kälteschutz ist bei Feldsalat der Schutz vor Nässe von oben — nasse Blätter faulen bei Frost.

## Einlagern statt wegwerfen

Die meisten Ernten scheitern nicht im Beet, sondern zwischen Beet und Küche. Jede Kultur hat eine Temperatur und eine Luftfeuchte, bei der sie hält — und eine, bei der sie in drei Wochen weich wird.

| KULTUR     | TEMPERATUR | LUFTFEUCHTE | METHODE                           | HALTBARKEIT |
|------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Möhren     | 0–4 °C     | hoch        | Sandkiste, Laub abgedreht         | 4–6 Monate  |
| Kartoffeln | 4–8 °C     | mittel      | Dunkel, luftig, in Kisten         | 5–8 Monate  |
| Rote Bete  | 0–4 °C     | hoch        | Sandkiste                         | 4–5 Monate  |
| Zwiebeln   | 0–5 °C     | niedrig     | Geflochten, trocken, luftig       | 6–8 Monate  |
| Knoblauch  | 0–5 °C     | niedrig     | Geflochten                        | 6–9 Monate  |
| Kürbis     | 12–15 °C   | niedrig     | Nachreifen, dann einzeln lagern   | 3–6 Monate  |
| Pastinake  | 0–4 °C     | hoch        | Im Beet lassen, bei Bedarf ernten | über Winter |
| Weißkohl   | 0–2 °C     | hoch        | Am Strunk aufgehängt              | 3–4 Monate  |

### Die Sandkiste

Eine Holzkiste, feuchter — nicht nasser — Sand, Wurzelgemüse schichtweise so hineingelegt, dass sich die Rüben nicht berühren. Das Laub wird abgedreht, nicht abgeschnitten: Eine Schnittfläche ist eine Eintrittspforte für Fäulnis.

### Kürbis nachreifen lassen

Kürbis wird zwei Wochen warm und trocken gelagert, damit die Schale aushärtet. Erst danach kommt er ins kühlere Lager. Wer ihn direkt kalt stellt, verkürzt die Haltbarkeit um Monate.

#### WÖCHENTLICH DURCHSEHEN

Eine faulende Kartoffel steckt die Kiste an. Fünf Minuten pro Woche im Lager sind der Unterschied zwischen sechs Monaten Vorrat und einem Eimer Kompost im Januar.



# Einkochen und Fermentieren

Zwei Verfahren, zwei völlig verschiedene Sicherheitslagen. Der Unterschied ist wichtiger als jedes Rezept, deshalb steht er zuerst.

## BITTE ZUERST LESEN: BOTULISMUS

*Clostridium botulinum* vermehrt sich unter Luftabschluss, in feuchter, salzarter und säurearmer Umgebung — also genau in einem Einweckglas mit Bohnen oder Möhren. Die Sporen überleben 100 °C. Ein Wasserbad-Einkocher erreicht nur 100 °C und tötet sie **nicht** ab.

Deshalb gilt in diesem Buch: **säurearmes Gemüse wird nicht im Wasserbad eingekocht**. Es wird fermentiert, eingefroren, eingelagert oder in Essigsud eingelegt. Wer säurearmes Gemüse sterilisieren will, braucht einen Drucktopf mit 116–121 °C. Das ist keine Vorsicht aus Prinzip: Botulismus ist selten, aber lebensgefährlich, und man schmeckt und riecht ihn nicht.

## Was sicher im Wasserbad geht

| GRUPPE                  | BEISPIELE                         | TEMPERATUR    | DAUER     |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| Obst                    | Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen | 80 °C         | 25–30 min |
| Marmelade, Gelee        | Zuckergehalt hoch                 | heiß abfüllen | —         |
| Saures Eingelegtes      | Gurken, Rote Bete in Essigsud     | 85 °C         | 30 min    |
| Tomaten mit Säurezugabe | 1 EL Zitronensäure je Liter       | 90 °C         | 30 min    |

Der gemeinsame Nenner ist Säure oder Zucker. Beides hemmt genau den Erreger, den Hitze allein nicht erwischt.

## Fermentieren — das sicherste Verfahren

Milchsäurebakterien senken den pH-Wert unter 4,6, und darunter wächst *C. botulinum* nicht mehr. Fermentation macht säurearmes Gemüse also selbst sicher.

### Die 2-Prozent-Lake

- Gemüse wiegen. 2 % des Gewichts an Salz ohne Jod und ohne Rieselhilfe.
- Bei Kraut: Salz direkt einkneten, bis Saft austritt. Bei festem Gemüse: 20 g Salz je Liter Wasser als Lake aufgießen.
- Alles muss unter der Flüssigkeit bleiben — mit Gewicht beschweren. Was oben schwimmt, schimmelt.
- 5 bis 10 Tage bei 18–22 °C stehen lassen, dann kühl stellen.

Gut geht: Weißkohl zu Sauerkraut, Möhren, Rote Bete, Bohnen, Gurken, Blumenkohl.

#### WORAN MAN ERKENNT, DASS ES FUNKTIONIERT

Es blubbert in den ersten Tagen, die Lake wird trüb, es riecht säuerlich und frisch. Hefeschleier oben ist harmlos und wird abgeschöpft. Pelziger, farbiger Schimmel bedeutet: wegwerfen, komplett.

# Das erste Jahr realistisch

Wer im ersten Jahr einunddreißig Kulturen anbaut, erntet einunddreißig halbe Misserfolge. Dieses Kapitel ist der reduzierte Plan.

## Sieben Kulturen, die im ersten Jahr funktionieren

| KULTUR                     | WARUM SIE GEEIGNET IST                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Radieschen                 | Vier Wochen von Saat bis Ernte. Der schnellste Erfolg, den ein Garten liefern kann. |
| Pflücksalat                | Verzeiht Fehler, wächst nach, liefert über Monate statt einmal.                     |
| Buschbohnen                | Brauchen kein Gerüst, keine Düngung, und reichern nebenbei Stickstoff an.           |
| Zucchini                   | Zwei Pflanzen reichen für einen Haushalt. Mehr ist ein bekannter Anfängerfehler.    |
| Kartoffeln                 | Robust, lagerfähig, und sie lockern den Boden für das Folgejahr.                    |
| Zwiebeln aus Steckzwiebeln | Fast fehlerresistent, lange lagerfähig.                                             |
| Grünkohl                   | Die Winterernte. Steht draußen, wenn sonst nichts mehr steht.                       |

## Was Sie im ersten Jahr weglassen

- **Blumenkohl und Brokkoli** — reagieren empfindlich auf Trockenheit und Hitze; entweder schießen sie oder der Kopf bleibt klein.
- **Sellerie** — lange Kulturdauer, hoher Wasserbedarf, wenig Ertrag auf kleiner Fläche.
- **Melonen und Auberginen** — brauchen mehr Wärme, als das deutsche Freiland zuverlässig liefert.
- **Zwanzig Tomatenpflanzen** — vier reichen. Der Rest wird im August ohnehin nicht verarbeitet.

## Wo Anfänger Geld verbrennen

Nicht bei Saatgut — das kostet für ein ganzes Jahr weniger als zwei Einkäufe im Gartencenter. Sondern bei Hochbeet-Bausätzen, Bewässerungsanlagen und Spezialerde, alles gekauft im März, bevor klar ist, ob der Garten überhaupt zum Alltag passt.

Kaufen Sie im ersten Jahr: Saatgut, Steckzwiebeln, Pflanzkartoffeln, eine Grabegabel, eine Handhacke und ein Vlies. Alles andere entscheidet sich im zweiten Jahr, wenn Sie wissen, was Sie tatsächlich brauchen.

### DER EINZIGE MASSSTAB, DER IM JAHR EINS ZÄHLT

Nicht der Ertrag in Kilogramm. Sondern: Sind Sie im Oktober noch dabei? Ein Garten, der im Juli aufgegeben wird, liefert nichts. Einer, der klein anfängt und durchgehalten wird, liefert ab dem zweiten Jahr mehr, als dieser Plan verspricht.