



Comunicação em **LIBRAS** no Contexto da Saúde:

Guia básico para
Atendimento.



Realização: Curso Técnico de Tradução e Interpretação de Libras



Turma: 2025.46.56

SOBRE A INSTRUTORA

Jackeline Santana José é educadora, pesquisadora e especialista nas áreas de Educação Inclusiva, Educação Bilíngue de Surdos e Acessibilidade Linguística. Pessoa com deficiência auditiva bilateral oralizada, desenvolve sua trajetória profissional pautada na defesa dos direitos linguísticos da comunidade surda, na promoção da acessibilidade comunicacional e na construção de práticas educacionais inclusivas. Atua como Instrutora de Língua Brasileira de Sinais (Libras) no Senac Espírito Santo – Unidade Linhares, sendo responsável pela formação de estudantes nos cursos de Libras e no Curso Técnico em Tradução e Interpretação de Libras.

Sua atuação acadêmica e profissional concentra-se na formação de profissionais comprometidos com a inclusão, a ética, a mediação linguística e a garantia do acesso à comunicação para pessoas surdas. Possui formação multidisciplinar nas áreas da Educação, Linguagem e Ciências Humanas, com graduação em Pedagogia, Letras Português/Libras, Artes Visuais e Direito, além de especializações voltadas à Educação Especial, Educação de Surdos, Psicopedagogia. Atualmente é mestranda em Tecnologias Emergentes na Educação, desenvolvendo estudos relacionados à inovação pedagógica, acessibilidade e tecnologias assistivas.

Ao longo de sua trajetória, tem se dedicado à elaboração de projetos educacionais, materiais didáticos acessíveis e ações de formação continuada voltadas à inclusão social e ao fortalecimento da cultura surda. É coautora da obra *Os Surdos e a Sétima Arte* (2022). Esta cartilha representa o compromisso da autora com a construção de práticas mais acessíveis e humanizadas, contribuindo para o fortalecimento da comunicação entre profissionais da saúde e a comunidade surda.



**JACKELINE
SANTANA
JOSÉ**

SOBRE A TURMA

A Turma 2025.46.56 do Curso Técnico em Tradução e Interpretação de Libras do Senac Linhares apresenta a Cartilha de Libras no Contexto da Saúde, resultado de um projeto integrador desenvolvido com o propósito de fortalecer a acessibilidade linguística e promover uma comunicação mais inclusiva entre profissionais da saúde e a comunidade surda.

A elaboração deste material fundamentou-se na identificação das barreiras comunicacionais ainda enfrentadas por pessoas surdas nos serviços de saúde, realidade que pode comprometer o acesso à informação, a compreensão de orientações clínicas e a qualidade do atendimento. Diante desse contexto, a turma desenvolveu um trabalho de pesquisa, levantamento de demandas e estudo de terminologias específicas da área da saúde, reunindo sinais relevantes para situações frequentes de atendimento. Mais do que um produto acadêmico, esta cartilha representa o compromisso dos futuros tradutores e intérpretes de Libras com a valorização da Língua Brasileira de Sinais, a promoção da inclusão social e a defesa dos direitos linguísticos da comunidade surda.

Sua construção possibilitou o desenvolvimento de competências essenciais à formação profissional, como pesquisa aplicada, trabalho colaborativo, ética, responsabilidade social e protagonismo estudantil. Esperamos que este material contribua para a ampliação das práticas inclusivas nos ambientes de saúde, fortalecendo o acesso à comunicação e promovendo uma sociedade mais acessível, humanizada e comprometida com a diversidade.

SENAC LINHARES – ES.



TURMA 2025.46.56

TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

APRESENTAÇÃO DA CARTILHA

A presente Cartilha de Libras no Contexto da Saúde é resultado de um processo colaborativo desenvolvido pelos estudantes do Curso Técnico em Tradução e Interpretação de Libras do Senac Linhares, concebido a partir do compromisso com a promoção da acessibilidade comunicacional, da inclusão social e da humanização dos serviços de saúde destinados à população surda.

O material foi elaborado com a finalidade de reunir e sistematizar sinais da Língua Brasileira de Sinais (Libras) relacionados ao contexto da saúde, contemplando terminologias, procedimentos, ambientes, profissionais e situações recorrentes nos atendimentos clínicos, ambulatoriais e hospitalares. Sua construção busca contribuir para a redução das barreiras comunicacionais enfrentadas pelas pessoas surdas, favorecendo interações mais eficazes, seguras e acolhedoras entre pacientes, familiares, profissionais da saúde e intérpretes de Libras.

A idealização desta cartilha emergiu da compreensão de que a comunicação acessível constitui um direito fundamental e um elemento indispensável para a efetivação da atenção integral à saúde. Nesse sentido, a proposta fundamenta-se nos princípios da inclusão, da equidade e do respeito à diversidade linguística e cultural da comunidade surda, alinhando-se às legislações brasileiras que asseguram o reconhecimento da Libras e o acesso universal aos serviços públicos.

Destaca-se, de maneira especial, a relevante participação da Assirlin- Associação dos surdos de Linhares, que atuou de forma ativa durante o processo de construção, organização e validação dos conteúdos apresentados. A parceria estabelecida entre a associação, os estudantes e a equipe docente possibilitou que a cartilha fosse desenvolvida sob a perspectiva dos próprios sujeitos surdos, fortalecendo sua legitimidade, pertinência social e adequação às demandas



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

reais da comunidade.

Além de seu caráter educativo, este material representa uma experiência formativa pautada na pesquisa, no diálogo comunitário e na construção coletiva do conhecimento. Seu desenvolvimento evidencia os princípios pedagógicos do Senac, especialmente aqueles relacionados à formação integral do estudante, ao protagonismo discente, à inovação, à ética profissional, à responsabilidade social e ao compromisso com a transformação da realidade por meio da educação.

Mais do que um instrumento de consulta, esta cartilha configura-se como uma iniciativa de impacto social, voltada à sensibilização de profissionais, estudantes e instituições quanto à importância da acessibilidade linguística nos serviços de saúde. Espera-se que este material contribua para a qualificação dos atendimentos, para o fortalecimento da cidadania da pessoa surda e para a construção de ambientes cada vez mais inclusivos, humanizados e comprometidos com o direito à comunicação.

Por fim, esta obra simboliza o esforço coletivo de estudantes, educadores, comunidade surda e parceiros institucionais que acreditam que a inclusão se concretiza por meio do diálogo, do respeito às diferenças e da garantia de oportunidades equitativas para todos os cidadãos



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

IDEALIZAÇÃO

A Cartilha de Libras no Contexto da Saúde foi concebida a partir de uma abordagem aplicada, participativa e colaborativa, fundamentada nos princípios da acessibilidade comunicacional, da educação inclusiva e da valorização da cultura surda. Sua elaboração teve como objetivo contribuir para a redução das barreiras linguísticas enfrentadas pela comunidade surda nos serviços de saúde.

O processo de construção envolveu pesquisa de campo realizada por meio de questionário eletrônico, levantamento bibliográfico em fontes especializadas, consulta a materiais acadêmicos e análise de terminologias utilizadas em contextos hospitalares, clínicos, ambulatoriais e de emergência. Os dados coletados permitiram identificar demandas reais de comunicação e subsidiaram a seleção dos conteúdos que compõem a cartilha.

Os sinais selecionados passaram por pesquisa lexical e validação junto à comunidade surda e profissionais fluentes em Libras, buscando assegurar adequação linguística, representatividade cultural e confiabilidade das informações apresentadas. A participação da comunidade surda foi fundamental para fortalecer a legitimidade e a relevância social do material.

A produção do conteúdo contou com registros fotográficos realizados pelos estudantes do Curso Técnico em Tradução e Interpretação de Libras, observando os parâmetros linguísticos da Libras e critérios de qualidade visual. Como recurso complementar de acessibilidade, os sinais foram associados a QR Codes que direcionam para vídeos demonstrativos, possibilitando a visualização dinâmica da sinalização.

Desenvolvida em consonância com as marcas formativas do Modelo Pedagógico Senac, a cartilha promoveu o exercício da pesquisa aplicada, do trabalho colaborativo, da ética profissional, da responsabilidade social e do protagonismo estudantil. O material foi finalizado como um recurso educacional acessível,



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

destinado a fortalecer a comunicação inclusiva e a humanização do atendimento à pessoa surda nos serviços de saúde.



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

GLOSSÁRIO DOS PARÂMETROS LINGÜÍSTICOS DA LIBRAS

Para compreender adequadamente os sinais apresentados nesta cartilha, é importante conhecer alguns dos principais parâmetros linguísticos da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Esses elementos constituem a estrutura dos sinais e permitem sua correta execução e interpretação.

CM – Configuração de Mão

Refere-se ao formato que a mão assume durante a realização do sinal. A Libras possui diversas configurações de mãos, que podem corresponder a letras do alfabeto manual, números ou formatos específicos utilizados para representar conceitos e significados. Exemplo: mão fechada, mão aberta, configuração em "A", "B", "C", "L", entre outras.

PA – Ponto de Articulação

É o local onde o sinal é realizado ou para onde as mãos são direcionadas durante a sinalização. O ponto de articulação pode ocorrer em diferentes regiões do corpo ou no espaço à frente do sinalizante. Exemplo: testa, queixo, peito, ombro, boca, braço ou espaço neutro à frente do corpo.

OR – Orientação da Mão

Corresponde à direção para a qual a palma da mão ou os dedos estão voltados durante a execução do sinal. A mudança de orientação pode alterar o significado do sinal. Exemplo: palma voltada para cima, para baixo, para frente, para trás ou lateralmente.

M – Movimento

Refere-se ao deslocamento realizado pelas mãos durante a produção do sinal. O movimento pode ocorrer de diferentes formas, contribuindo para a construção



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

do significado. Exemplo: movimento circular, reto, alternado, repetitivo, ascendente, descendente ou de aproximação.

@- @ (Arroba): Convenção utilizada em glosas de Libras para indicar ausência de marcação de gênero, uma vez que os sinais da Libras geralmente não apresentam flexão de gênero masculino ou feminino. Emprega-se o símbolo para representar uma forma neutra durante a transcrição escrita dos sinais.

Exemplo:

AMIG@ = amigo ou amiga.

ALUN@ = aluno ou aluna.

EL@ = ele ou ela.



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

ORIENTAÇÕES DE USO

Esta cartilha foi desenvolvida para auxiliar estudantes, profissionais da saúde, intérpretes de Libras, pessoas surdas e demais interessados na aprendizagem de sinais relacionados ao contexto da saúde.

Cada verbete apresenta:

- Termo em português – identifica o conceito ou procedimento de saúde;
- Imagem do Sinal – demonstra visualmente a execução do sinal;
- Descrição Técnica – apresenta os parâmetros linguísticos da Libras;
- QR Code – direciona para um vídeo demonstrativo com a execução dinâmica do sinal.

Como utilizar o QR Code

1. Abra a câmera do celular ou aplicativo leitor de QR Code;
2. Aponte para o código disponível ao lado do sinal;
3. Acesse o link gerado;
4. Assista ao vídeo e observe atentamente o movimento, a configuração das mãos e as expressões faciais.

Para melhor aprendizagem, recomenda-se observar as imagens, ler a descrição técnica e assistir ao vídeo correspondente, reproduzindo o sinal sempre que possível. As variações regionais da Libras devem ser respeitadas, considerando a riqueza linguística da comunidade surda brasileira.



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

ÍNDICE

1. LOCAIS DE SAÚDE	18
1.1 Consultório médico	18
1.2 Farmácia	18
1.3 Hospital	19
1.4 Hospital especializado o em doenças mentais	19
1.5 Hospital particular	20
1.6 Pronto socorro	21
2 TRANSPORTE DE PACIENTES	21
2.1 Ambulância	21
3 PROFISSIONAIS DE SAÚDE – MÉDICOS E NÃO MÉDICOS	22
3.1 Assistente	22
3.2 Assistente social	23
3.3 Auxiliar de enfermagem.....	23
3.4 Cuidad@r.....	24
3.5 Dentista.....	24
3.6 Enfermeir@.....	25
3.7 Fonoaudiólog@.....	25
3.8 Psicólog@.....	26
3.9 Médic@.....	26
3.10 Técnico@ em enfermagem.....	27
3.11 Técnico@ em radiologia	28
3.12 Médic@ angiologista.....	28
3.13 Médic@ ginecologista	29
3.14 Médic@ anestesiológista.....	29



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

3.15	Médic@ dermatologista	30
3.16	Médic@ cirurgião plástico@	31
4	PROCEDIMENTOS E EXAMES	32
4.1	Aferição da pressão arterial	32
4.2	Aferição da temperatura corporal	32
4.3	Audiometria	33
4.4	Endoscopia	34
4.5	Biópsia	34
4.6	Exame de colesterol (lipidograma)	35
4.7	Exame de fezes (Exame Parasitológico Fecal)	35
4.8	Exame de HIV (Sorologia HIV)	36
4.9	Exame de Próstata	37
4.10	Exame de Sangue	37
4.11	Exame de Urina	38
4.12	Exame médico	39
4.13	Exame pré-natal	39
4.14	Exame Raio X	40
5	PREVENÇÃO DE DOENÇAS E VACINAÇÃO	40
5.1	Calendário de vacinação	41
5.2	Vacina	41
6	SINTOMAS GERAIS	42
6.1	Arrepio	42
6.2	Aumento de peso	43
6.3	Cãibra	43
6.4	Bruxismo	44
6.5	Calafrio	45



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

6.6	Catarro	45
6.7	Cólica/Dor abdominal.....	46
6.8	Dor	46
6.9	Dor de barriga	47
6.10	Dor de cabeça.....	47
6.11	Dor de ouvido.....	48
6.12	Enjoo.....	49
6.13	Espirro.....	49
6.14	Febre.....	50
6.15	Inchaço	50
6.16	Lagrima	51
6.17	Mal estar	51
6.18	Mancar	52
6.19	Nojo.....	52
6.20	Palpitação	53
6.21	Sangramento	54
6.22	Soluço	54
6.23	Sintomas	55
6.24	Tosse.....	55
6.25	Tremor.....	56
6.26	Vômito	56
6.27	Zumbido	57
7	DOENÇAS E CONDIÇÕES CLÍNICAS	58
7.1	Adoecer.....	58
7.2	Alergia.....	58



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

7.3	Anemia.....	59
7.4	Asma.....	60
7.5	Autismo	60
7.6	Bolha na mão.....	61
7.7	Bronquite.....	61
7.8	Câncer	62
7.9	Catapora	62
7.10	Caxumba.....	63
7.11	Convulsão	63
7.12	Covid.....	64
7.13	Dengue	64
7.14	Depressão.....	65
7.15	Derrame cerebral	65
7.16	Diabetes.....	66
7.17	Doença.....	66
7.18	Doente	67
7.19	Epidemia	67
7.20	Estrabismo	68
7.21	Febre Amarela	68
7.22	Ferida.....	69
7.23	Hepatite.....	69
7.24	Herpes	70
7.25	Infarto.....	71
7.26	Insônia	71
7.27	Intoxicação.....	72



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

7.28	Labirintite	72
7.29	Leucemia	73
7.30	Meningite	74
7.31	Otite	74
7.32	Paralisia Facial.....	75
7.33	Parkinson	75
7.34	Pneumonia.....	76
7.35	Rinite.....	76
7.36	Rubéola.....	77
7.37	Sarampo	77
7.38	Sarna	78
7.39	Síndrome	78
7.40	Sinusite	79
7.41	Torcicolo.....	79
7.42	Trauma.....	80
7.43	Doença Transmissível.....	80
7.44	Transtorno Bipolar.....	81
7.45	Tuberculose	82
7.46	Úlcera.....	82
7.47	Verme.....	83
8	PRESCRIÇÕES MÉDICAS.....	83
8.1	Dieta.....	83
8.2	Medicamento	84
8.3	Receita médica	85
8.4	Repousar	85



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

9	CIRURGIAS	86
9.1	Cesariana.....	86
9.2	Operação cirúrgica.....	86
9.3	Transplante de coração.....	87
9.4	Implante Coclear	88
9.5	Bariátrica	88
10	RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO	89
10.1	Fisioterapia	89
11	PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.....	90
11.1	Amamentar	90
11.2	Assoar.....	90
11.3	Curativo adesivo	91
11.4	Banhar-se	91
11.5	Defecar / diarreia.....	92
11.6	Engolir.....	93
11.7	Hemodiálise	94
11.8	Quimioterapia.....	94
11.9	Transfusão de sangue.....	95
12	CONVÊNIOS MÉDICOS	96
12.1	Paciente SUS (Sistema Único de Saúde)	96
12.2	Paciente particular	96
12.3	Paciente Conveniado	97
13	HOSPITAIS EM LINHARES – ES.....	98
13.1	Hospital público HGL	98
13.2	LMC - Hospital Linhares Medical Center.....	99
13.3	Hospital Unimed.....	99



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

13.4	Hospital Rio Doce	100
CONSIDERAÇÕES FINAIS		101

1. LOCAIS DE SAÚDE

1.1 Consultório médico	
	
CM: Mão dominante em configuração correspondente ao sinal de MÉDICO e ambas as mãos abertas para representar o local de atendimento. PA: Região do peito e espaço neutro à frente do corpo. OR: Palmas voltadas para o corpo e posteriormente para frente. M: Realizar o sinal de médico seguido do sinal de local/sala/atendimento, representando o ambiente onde ocorrem consultas e avaliações de saúde. Descrição: Sinal composto formado pela sequência médico + consultório, representando o espaço destinado ao atendimento clínico, realização de consultas, avaliações e orientações aos pacientes	

1.2 Farmácia	
	
CM: Ambas as mãos em configuração da letra "F". PA: Espaço neutro à frente do corpo. OR: Palmas voltadas para frente. M: As mãos em configuração "F" realizam movimento simultâneo ou alternado	

à frente do corpo, representando o local de dispensação de medicamentos.
Descrição: Com ambas as mãos em configuração da letra "F", realizar movimento à frente do corpo representando o estabelecimento

1.3 Hospital



CM: Ambas as mãos em configuração da letra "H".

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para baixo ou para frente.

M: As mãos em configuração "H" realizam movimento simultâneo para frente ou um leve toque alternado, conforme a variante utilizada.

Descrição: Com ambas as mãos em configuração da letra "H", realizar movimento à frente do corpo representando a instituição hospitalar destinada ao atendimento, diagnóstico, tratamento e recuperação de pacientes.

1.4 Hospital especializado o em doenças mentais



CM: realizar o sinal de hospital, seguido do sinal de mente/psicológico/saúde mental.


PA: espaço neutro à frente do corpo e região da cabeça.

OR: palmas voltadas para frente e posteriormente para a cabeça.

M: executar o sinal de hospital e, em seguida, o sinal relacionado à mente, saúde mental ou transtornos mentais, indicando a especialidade da instituição.

Descrição: sinal composto formado pela sequência hospital+ saúde mental, representando instituição especializada no atendimento, tratamento, reabilitação e acompanhamento de pessoas com transtornos mentais, emocionais ou psiquiátricos.

1.5 Hospital particular



CM: realizar o sinal de hospital seguido da configuração utilizada para particular/privado.

PA: espaço neutro à frente do corpo.

OR: palmas voltadas para frente.

M: executar o sinal de hospital e, em seguida, o sinal de particular, indicando que a instituição pertence à iniciativa privada.

Descrição: sinal composto formado pela sequência hospital + particular, representando uma instituição de saúde privada, mantida por empresas, organizações ou convênios de saúde.

1.6 Pronto socorro



CM: Ambas as mãos abertas.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para frente.

M: Realizar o sinal de urgência/emergência seguido do sinal de hospital ou atendimento, representando o setor destinado ao atendimento imediato de pacientes.

Descrição: sinal composto formado pela sequência emergência + hospital/atendimento, representando o serviço de saúde destinado ao atendimento rápido de pessoas em situação de urgência ou emergência.

2 TRANSPORTE DE PACIENTES

2.1 Ambulância



CM: Ambas as mãos em configuração aberta, com os dedos unidos.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para baixo ou lateralmente.


M: As mãos realizam movimento para frente simulando o deslocamento de um veículo de emergência. Em algumas variantes, acrescenta-se movimento

alternado representando as luzes de emergência (giroflex).

Descrição: O sinal representa o veículo utilizado para transporte de pacientes e atendimento de urgência e emergência, reproduzindo de forma icônica o deslocamento da ambulância.

3 PROFISSIONAIS DE SAÚDE – MÉDICOS E NÃO MÉDICOS

3.1 Assistente



CM: Mão não dominante aberta; mão dominante aberta.

PA: Espaço neutro à frente do corpo, junto à mão de apoio.

OR: Palma da mão não dominante voltada para baixo; palma da mão dominante voltada para frente.

M: Ambas as mãos deslocam-se para frente simultaneamente.

Descrição: A mão dominante posiciona-se junto à lateral do dedo indicador da mão de apoio e, em seguida, ambas avançam para frente, representando a ação de auxiliar ou prestar assistência.

3.2 Assistente social



CM: Mão dominante em configuração da letra "A", seguida de ambas as mãos abertas.

PA: Região do peito e espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para o corpo e posteriormente para frente.

M: Realizar o sinal relacionado a ASSISTÊNCIA/AJUDA seguido de movimento que representa apoio, acolhimento ou atendimento às pessoas.

Descrição: Sinal composto que representa o profissional responsável pelo atendimento, orientação, acompanhamento e garantia dos direitos sociais dos indivíduos, famílias e comunidades.

3.3 Auxiliar de enfermagem



CM: Mão dominante em configuração da letra "A" (Auxiliar), seguida do sinal de ENFERMAGEM.

PA: Região do peito ou espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Realizar o sinal de auxiliar e, em seguida, o sinal de enfermagem, representando o profissional que auxilia nos cuidados de enfermagem.

descrição: sinal composto formado pela sequência auxiliar + enfermagem,

representando o profissional que presta assistência básica ao paciente e auxilia a equipe de enfermagem na execução dos cuidados de saúde.

3.4 Cuidad@r



CM: Ambas as mãos abertas, com os dedos unidos.

PA: Região do peito e espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para o corpo e posteriormente para frente.

M: As mãos partem próximas ao peito e deslocam-se suavemente para frente, representando proteção, acolhimento, assistência e cuidado com outra pessoa.

Descrição: As mãos realizam movimento que representa o ato de cuidar, proteger, auxiliar e oferecer suporte a alguém, simbolizando a atuação do cuidador no acompanhamento das necessidades físicas, emocionais e sociais de outra pessoa.

3.5 Dentista



CM: Mão dominante em configuração da letra "D".

PA: Região da boca ou dos dentes.

OR: Palma voltada para dentro.

M: A ponta do dedo indicador da configuração "D" toca ou aproxima-se dos dentes, realizando pequeno movimento de toque.

Descrição: Com a mão dominante em configuração da letra "D", tocar ou aproximar-se dos dentes, representando o profissional responsável pela prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças da boca e dos dentes.

3.6 Enfermeir@



CM: Mão dominante em configuração da letra "E".

PA: Lado esquerdo do peito (região do coração) ou braço.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: A mão em configuração "E" toca levemente o peito ou realiza movimento associado ao cuidado e à assistência em saúde.

Descrição: Com a mão dominante em configuração da letra "E", realizar toque suave na região do peito, representando a profissional responsável pelo planejamento, coordenação e execução dos cuidados de enfermagem.

3.7 Fonoaudiólog@



CM: Mão dominante em configuração da letra "F".

PA: Região da boca, queixo ou lateral do rosto.

OR: Palma voltada lateralmente.

M: A mão em configuração "F" aproxima-se da boca e realiza pequeno movimento relacionado à fala, comunicação ou audição.

Descrição: Com a mão dominante em configuração da letra "F", realizar movimento próximo à boca, representando a profissional especializada na comunicação humana, linguagem, fala, voz, audição e motricidade orofacial.

3.8 Psicólog@



CM: Mão dominante em configuração da letra "P".

PA: Região da testa ou lateral da cabeça.

OR: Palma voltada lateralmente.

M: A mão em configuração "P" toca ou aproxima-se da testa, realizando pequeno movimento circular ou toque suave.

Descrição: Com a mão dominante em configuração da letra "P", tocar ou aproximar-se da região da testa, representando a profissional que atua na avaliação, promoção e cuidado da saúde mental e emocional.

3.9 Médic@



CM: Mão dominante em configuração da letra "M".

PA: Lado esquerdo do peito (região do coração).

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Tocar o lado esquerdo do peito duas vezes com a mão em configuração "M".

Descrição: Com a mão dominante em configuração da letra "M", tocar levemente o lado esquerdo do peito, representando o profissional médico. A configuração da mão faz referência à letra inicial da palavra "médico".

3.10 Técnico em enfermagem



CM: Mão dominante em configuração da letra "T" ou configuração utilizada no sinal de técnico, seguida do sinal de enfermagem.

PA: Região do peito, braço ou espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Realizar o sinal de técnico e, em seguida, o sinal de enfermagem, representando o profissional de nível técnico que atua nos cuidados diretos ao paciente.

Descrição: Sinal composto formado pela sequência técnico + enfermagem, representando o profissional habilitado para executar procedimentos de enfermagem, prestar assistência ao paciente e atuar sob supervisão do enfermeiro.

3.11 Técnico@ em radiologia



CM: Mão dominante em configuração da letra "T" (Técnico), seguida do sinal de raio-x/radiologia.

PA: Região do peito e espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para o corpo.

M: Realizar o sinal de técnico e, em seguida, o sinal de radiologia, representando o profissional responsável pela realização de exames por imagem.

Descrição: Sinal composto formado pela sequência técnico + radiologia, representando o profissional habilitado para operar equipamentos de diagnóstico por imagem e auxiliar na obtenção de imagens radiológicas para fins diagnósticos.

3.12 Médico@ angiologista



CM: Mão dominante em configuração da letra "M", seguida de ambas as mãos em configuração que represente vasos sanguíneos ou circulação.

PA: Lado esquerdo do peito e braços.


OR: Palmas voltadas para o corpo.

M: Realizar o sinal de médico e, em seguida, movimento que representa o

trajeto ou a circulação do sangue pelos vasos sanguíneos.

Descrição: sinal composto formado pela sequência médico + circulação/vasos sanguíneos, representando o profissional especializado na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças que afetam veias, artérias e vasos linfáticos.

3.13 Médic@ ginecologista



CM: Mão dominante em configuração da letra "M" (médico), seguida do sinal de ginecologia.

PA: Lado esquerdo do peito e região inferior do abdômen/pelve feminina.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Realizar o sinal de médico e, em seguida, o sinal referente ao sistema reprodutor feminino ou à ginecologia.

Descrição: Sinal composto formado pela sequência médico + ginecologia, representando o profissional especializado na prevenção, diagnóstico e tratamento das condições relacionadas ao sistema reprodutor feminino.

3.14 Médic@ anestesiológista



CM: Mão dominante em configuração da letra "M", seguida da configuração utilizada para o sinal de anestesia.

PA: Peito e região do braço ou corpo.

OR: Palmas voltadas para o corpo.

M: Realizar o sinal de médico e, em seguida, o sinal de anestesia, representando o profissional responsável pela administração de anestésicos.

Descrição: Sinal composto formado pela sequência médico + anestesia, representando o profissional especializado na administração de anestesia e no monitoramento do paciente antes, durante e após procedimentos cirúrgicos.

3.15 Médic@ dermatologista



CM: Mão dominante em configuração da letra "M", seguida de mão aberta com dedos levemente curvados.

PA: Lado esquerdo do peito e superfície da pele (braço, mão ou rosto).

OR: Palma voltada para o corpo e, posteriormente, para a região da pele indicada.

M: Realizar o sinal de médico e, em seguida, o sinal relacionado à pele/dermatologia, tocando ou deslizando sobre a superfície da pele.

Descrição: Sinal composto formado pela sequência médico + pele, representando o profissional especializado na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças da pele, cabelos, unhas e mucosas.

3.16 Médic@ cirurgião plástic@



CM: Mão dominante em configuração da letra "M", seguida de ambas as mãos abertas.

PA: Lado esquerdo do peito e região do rosto ou corpo.

OR: Palmas voltadas para o corpo.

M: Realizar o sinal de médico e, em seguida, movimentos suaves sobre o rosto ou região corporal, representando correção, reconstrução ou harmonização estética.

Descrição: Sinal composto formado pela sequência médico + cirurgia plástica, representando o profissional especializado em procedimentos reparadores, reconstrutivos e estéticos do corpo humano.

4 PROCEDIMENTOS E EXAMES

4.1 Aferição da pressão arterial



CM: Mão não dominante aberta, com a palma voltada para cima; mão dominante em configuração semelhante à de segurar ou ajustar um aparelho de pressão.

PA: Antebraço ou braço não dominante.

OR: Palma da mão dominante voltada para baixo.

M: A mão dominante envolve ou toca o braço oposto, realizando movimento curto de ajuste e verificação, simulando o procedimento de aferição da pressão arterial.

Descrição: Com a mão não dominante representando o braço do paciente, a mão dominante realiza movimento que simula a colocação e a verificação do aparelho de pressão, representando a medição da pressão arterial.

4.2 Aferição da temperatura corporal



CM: Mão não dominante aberta, palma voltada para cima; mão dominante em configuração semelhante à de segurar um termômetro.

PA: Testa, axila ou palma da mão de apoio.

OR: Palma da mão dominante voltada para baixo.

M: A mão dominante aproxima-se da região onde a temperatura é medida e realiza um movimento curto de posicionamento ou verificação.

Descrição: A mão dominante simula o uso de um termômetro sobre a testa, axila ou outra região do corpo, representando a verificação da temperatura corporal realizada por profissional de saúde ou cuidador.

4.3 Audiometria



CM: Mão não dominante aberta, palma voltada para cima; mão dominante com os dedos indicador e médio estendidos. Em seguida, mão dominante com dedos curvados próximos à orelha.

PA: Palma da mão de apoio e região da orelha.

OR: Palma da mão dominante voltada para baixo na primeira etapa e para a orelha na segunda.

M: Inicialmente, a mão dominante realiza movimento sobre a palma da mão de apoio, representando o exame. Em seguida, desloca-se para a região da orelha, realizando movimento associado à percepção sonora.

Descrição: O sinal representa a realização de um exame auditivo, combinando a ideia de avaliação/teste com a referência direta à audição por meio da orelha.

4.4 Endoscopia



CM: Mão não dominante aberta, palma voltada para baixo; mão dominante com os dedos indicador e médio curvados.

PA: Espaço neutro à frente do corpo e região da boca.

OR: Palma da mão dominante voltada para dentro.

M: Inicialmente, a mão dominante realiza movimento sobre a mão de apoio. Em seguida, desloca-se em direção à boca e realiza movimento descendente para o interior do corpo, simulando a introdução de um endoscópio.

Descrição: O sinal representa a introdução de um equipamento flexível pela boca para visualização interna do sistema digestório, reproduzindo de forma icônica o procedimento de endoscopia.

4.5 Biópsia



CM: Mão não dominante aberta; mão dominante com dedos indicador e polegar unidos (pinça).

PA: Região do corpo indicada para coleta.

OR: Palma voltada para o local indicado.

M: A mão dominante realiza movimento de pinçar e retirar uma pequena porção da área indicada.

Descrição: A mão dominante simula a retirada de uma pequena amostra de tecido do corpo para realização de exame laboratorial, representando o procedimento de biópsia.

4.6 Exame de colesterol (lipidograma)



CM: Mão não dominante aberta, palma voltada para cima; mão dominante com os dedos indicador e médio estendidos, semelhante ao sinal utilizado para coleta de sangue.

PA: Região da parte interna do braço ou ponta do dedo e espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para cima.

M: Realizar o movimento de coleta de sangue e, em seguida, indicar o encaminhamento da amostra para análise laboratorial.

Descrição: Sinal composto que representa a coleta de sangue para avaliação dos níveis de colesterol, exame utilizado para monitorar a saúde cardiovascular e metabólica.

4.7 Exame de fezes (Exame Parasitológico Fecal)



CM: Mão não dominante aberta, palma voltada para cima; mão dominante em configuração de pinça ou simulando o manuseio de um recipiente de coleta.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para cima.

M: Movimento que representa a coleta de uma amostra e seu encaminhamento para análise laboratorial.

Descrição: Sinal composto que representa a coleta de fezes para realização de exame laboratorial, utilizado na investigação de parasitoses, infecções intestinais, alterações digestivas e outras condições clínicas.

4.8 Exame de HIV (Sorologia HIV)



CM: Mão dominante em configuração da letra "H", "I", "V".

PA: Espaço neutro à frente do rosto.

OR: Palma voltada lateralmente.

M: Pequeno movimento de rotação ou oscilação da mão mantendo a configuração da letra "H".

Descrição: A mão dominante realiza o sinal correspondente à letra "H", utilizada como referência ao HIV, representando o exame destinado à detecção do vírus da imunodeficiência humana.

4.9 Exame de Próstata



CM: Mão dominante em configuração correspondente ao sinal terminológico utilizado para próstata, associada ao sinal de exame.


PA: Região inferior do tronco/pelve ou espaço neutro à frente do corpo, conforme a execução do sinal.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Movimento que representa a realização do exame clínico associado à próstata.

Descrição: Sinal composto formado pela associação dos conceitos de EXAME e PRÓSTATA, representando o procedimento utilizado para avaliação da glândula prostática e prevenção de doenças relacionadas ao sistema reprodutor masculino.

4.10 Exame de Sangue



CM: Mão não dominante fechada, palma voltada para cima; mão dominante fechada, com os dedos indicador e médio estendidos e unidos.

PA: Parte interna do antebraço (região da veia).

OR: Palmas voltadas para cima.

M: A mão dominante toca a região interna do antebraço da mão não dominante e realiza um movimento curto para frente ou para baixo, simulando a coleta de sangue.

Descrição: Com a mão de apoio representando o braço do paciente, a mão dominante com os dedos indicador e médio estendidos toca a parte interna do cotovelo e realiza movimento que simula a retirada de sangue para análise laboratorial..

4.11 Exame de Urina

(Exame de Elementos anormais de sedimentação EAS).



CM: Mão não dominante aberta, palma voltada para cima; mão dominante em configuração semelhante à de segurar ou coletar um recipiente.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para cima.

M: A mão dominante realiza movimento que representa a coleta e entrega de uma amostra para análise laboratorial.

Descrição: Sinal composto que representa a coleta de urina para realização de exame laboratorial, utilizado na investigação, diagnóstico e acompanhamento de diversas condições de saúde.

4.12 Exame médico



CM: Mão não dominante aberta, com a palma voltada para cima; mão dominante com os dedos indicador e médio estendidos e unidos.

PA: Palma da mão não dominante ou região do corpo a ser examinada.

OR: Palma da mão dominante voltada para baixo.

M: A mão dominante realiza movimentos curtos de avaliação ou verificação sobre a mão de apoio ou sobre a região examinada.

Descrição: Com a mão não dominante aberta à frente do corpo, a mão dominante, com os dedos indicador e médio estendidos e unidos, realiza movimentos curtos de avaliação sobre a palma da mão de apoio ou sobre a região examinada, representando o exame clínico realizado por um profissional de saúde.

4.13 Exame pré-natal



CM: Mão dominante aberta; mão não dominante posicionada sobre a região abdominal, representando a gestação.

PA: Abdômen e espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para o corpo.

M: Movimento que indica acompanhamento, cuidado ou avaliação durante a

gravidez.

Descrição: Sinal composto que representa o acompanhamento realizado durante a gestação, incluindo consultas, exames e orientações para a saúde da gestante e do bebê.

4.14 Exame Raio X



CM: Ambas as mãos em configuração "X" ou configuração relacionada à letra inicial do termo, conforme a variante utilizada.

PA: Região do tórax ou espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para o corpo.

M: Movimento que representa a visualização interna do corpo por meio de imagem radiográfica.

Descrição: Sinal utilizado para representar o exame de imagem realizado por raios X, permitindo a visualização de ossos, articulações e estruturas internas do organismo.

5 PREVENÇÃO DE DOENÇAS E VACINAÇÃO

5.1 Calendário de vacinação



CM: Mão não dominante aberta; mão dominante aberta e, em seguida, em configuração que simula uma seringa.

PA: Palma da mão não dominante e braço oposto.

OR: Palma da mão de apoio voltada para cima.

M: Realizar marcações sobre a palma da mão de apoio e, em seguida, tocar o braço oposto simulando a aplicação de uma vacina.

Descrição: Executa-se primeiro o sinal de calendário, simulando anotações ou registros. Em seguida, realiza-se o sinal de vacina, representando a aplicação do imunizante no braço.

5.2 Vacina



CM: Mão não dominante aberta ou fechada representando o braço; mão dominante em configuração semelhante à de segurar uma seringa.

PA: Região do braço (geralmente o deltóide).

OR: Palma da mão dominante voltada para baixo ou lateralmente.

M: A mão dominante toca o braço oposto simulando a aplicação de uma injeção.

Descrição: A mão dominante realiza movimento de aplicação sobre o braço não dominante, representando a administração de vacina por via injetável.

6 SINTOMAS GERAIS

6.1 Arrepio



CM: Ambas as mãos abertas, com dedos levemente separados e curvados.

PA: Antebraço, braço ou região do corpo onde ocorre a sensação.

OR: Palmas voltadas para o corpo.

M: Movimento ascendente curto sobre o braço ou pele, simulando os pelos se eriçando.

Descrição: As mãos realizam movimento leve e ascendente sobre a pele, representando a sensação de arrepio provocada por frio, emoção intensa, medo ou reação fisiológica do organismo.

6.2 Aumento de peso



CM: Ambas as mãos abertas; em seguida, mão dominante com o dedo indicador estendido.

PA: Espaço neutro à frente do corpo e região do tronco.

OR: Palmas voltadas para cima e lateralmente durante a execução.

M: As mãos realizam movimentos alternados de subida e descida. Em seguida, o dedo indicador da mão dominante desloca-se em direção ao tronco, indicando aumento da massa corporal.

Descrição: As mãos representam a variação do peso corporal e finalizam apontando para a região do corpo onde ocorre o ganho de peso, simbolizando aumento do peso corporal.

6.3 Cãibra



CM: Mão dominante em configuração de pinça, com os dedos polegar e indicador levemente flexionados.


PA: Região do músculo afetado (geralmente perna, panturrilha ou braço).

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Realizar movimento de contração ou pinçamento sobre o local indicado, simulando o endurecimento repentino do músculo.

Descrição: A mão dominante toca ou aproxima-se da região do músculo afetado e realiza um movimento de contração, representando a dor e o enrijecimento muscular característicos da cãibra. O sinal remete à contração involuntária e dolorosa da musculatura. Expressão facial de dor súbita, com contração dos olhos e da boca.

6.4 Bruxismo



CM: Mão dominante em configuração semelhante à letra "C", com os dedos levemente curvados.

PA: Região lateral da mandíbula.

OR: Palma voltada para o rosto.

M: Realizar movimento repetido e curto sobre a região da mandíbula, simulando o ato de apertar ou ranger os dentes.

Descrição: A mão dominante posiciona-se próxima à mandíbula e executa movimentos repetitivos que representam o apertamento ou ranger involuntário dos dentes, característicos do bruxismo. O sinal remete à tensão muscular da face e da articulação temporomandibular. Expressão facial de tensão, com dentes cerrados e músculos faciais contraídos..

6.5 Calafrio



CM: Ambas as mãos abertas, com dedos levemente curvados.

PA: Região do tórax, braços ou espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para o corpo.

M: Movimentos rápidos, curtos e repetitivos, simulando tremores causados pelo frio.

Descrição: As mãos realizam pequenos movimentos de tremor próximos ao corpo, representando a sensação involuntária de frio intenso associada ao calafrio. A expressão facial deve indicar desconforto térmico.

6.6 Catarro



CM: Mão dominante com os dedos indicador e polegar unidos (pinça) ou dedos levemente curvados.

PA: Região do nariz ou da boca.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Movimento de retirada para fora, simulando a eliminação de secreção espessa.

Descrição: A mão dominante parte da região do nariz ou da boca e afasta-se para frente, representando a saída de secreção mucosa (catarro) das vias respiratórias. A expressão facial pode indicar desconforto respiratório.

6.7 Cólica/Dor abdominal



CM: Mão dominante aberta, dedos unidos e levemente curvados.

PA: Região do abdômen (barriga).

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Movimento circular contínuo sobre o abdômen, geralmente em sentido anti-horário.

Descrição: A mão dominante é posicionada sobre a região abdominal e realiza movimentos circulares repetidos, representando dor, desconforto ou contrações características da cólica abdominal. A expressão facial deve indicar sofrimento ou incômodo.

6.8 Dor



CM: Mão dominante em configuração “1” (indicador estendido).

PA: Região do corpo onde a dor está localizada.

OR: Dedo indicador voltado para o local indicado.

M: Toques curtos e repetidos ou leve pressão sobre a área afetada.

Descrição: A mão dominante aponta e toca a região do corpo onde a dor é sentida, representando desconforto físico ou sofrimento localizado. A expressão facial é fundamental para indicar intensidade e incômodo.

6.9 Dor de barriga



CM: Mão dominante aberta.

PA: Região do abdômen (barriga).

OR: Palma voltada para trás, em contato com a barriga.

M: Movimento circular vertical para a esquerda (sentido anti-horário).

Descrição: Com a mão aberta apoiada sobre a barriga, realizar movimentos circulares contínuos em sentido anti-horário, representando dor ou desconforto abdominal.

6.10 Dor de cabeça



CM: Mão dominante em configuração de pinça (indicador e polegar unidos) ou mão aberta.

PA: Região das têmporas ou lateral da cabeça.

OR: Palma voltada para a cabeça.

M: A mão dominante toca repetidamente as têmporas ou a lateral da cabeça, com leve pressão, representando dor na região craniana.

Descrição: Com a mão dominante em configuração de pinça, tocar repetidamente a região das têmporas ou lateral da cabeça, representando dor de cabeça. A expressão facial deve indicar dor, incômodo ou sensibilidade à luz.

6.11 Dor de ouvido



CM: Mão dominante em configuração de pinça (indicador e polegar unidos) ou mão aberta.

PA: Orelha.

OR: Palma voltada para a lateral da cabeça.

M: A mão dominante toca repetidamente a orelha, com leve pressão ou movimento de incômodo.

Descrição: Com a mão dominante em configuração de pinça, tocar a orelha de forma repetida, representando dor ou incômodo na região auditiva. A expressão facial deve indicar dor.

6.12 Enjoo



Mão dominante aberta, com os dedos semi curvados e palma voltada para trás, tocando a região do abdômen. Em seguida, realizar movimentos circulares verticais para a esquerda, representando sensação de mal-estar ou náusea.

6.13 Espirro



CM: Mão dominante aberta, com os dedos unidos.

PA: Região do nariz.

OR: Palma voltada para o rosto.

M: A mão toca ou aproxima-se do nariz e afasta-se rapidamente para frente, simulando a expulsão de ar característica do espirro.

Descrição: Com a mão dominante próxima ao nariz, realizar movimento rápido para frente, representando a expulsão involuntária de ar pelas vias respiratórias durante o espirro. A expressão facial deve acompanhar a ação.

6.14 Febre



CM: Mão dominante em configuração aberta, com os dedos unidos.

PA: Testa.

OR: Palma voltada para o rosto.

M: A mão dominante toca a testa e afasta-se levemente para frente, acompanhada de expressão facial de mal-estar ou calor excessivo.

Descrição: Com a mão dominante aberta, tocar a testa e afastar a mão para frente, representando o aumento da temperatura corporal característico da febre.

6.15 Inchaço



CM: Mão dominante aberta, dedos levemente curvados.

PA: Região do corpo afetada.

OR: Palma voltada para o local indicado.

M: Movimento de expansão ou afastamento gradual dos dedos sobre a área afetada.

Descrição: A mão aberta é posicionada sobre a região inchada e realiza movimento que sugere aumento de volume, representando edema ou inchaço.

6.16 Lagrima



CM: Mão dominante em configuração "1" (indicador estendido).

PA: Região abaixo do olho.

OR: Palma voltada para o rosto.

M: Deslizar o dedo indicador para baixo a partir da região abaixo do olho, simulando o percurso de uma lágrima escorrendo pela face.

Descrição: Com o dedo indicador estendido próximo ao olho, realizar movimento descendente pela bochecha, representando uma lágrima escorrendo pelo rosto.

6.17 Mal estar



CM: Mão dominante aberta, dedos unidos e levemente curvados.

PA: Região do peito ou estômago.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Movimento curto e suave sobre o peito ou abdômen, acompanhado de leve inclinação corporal.

Descrição: A mão é posicionada sobre a região do peito ou estômago e realiza movimento que expressa desconforto físico, indisposição ou sensação de não estar bem.

6.18 Mancar



CM: Mão dominante em configuração "V" (indicador e médio estendidos e separados), demais dedos fechados.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palma voltada lateralmente.

M: Realizar movimento alternado e irregular para frente, simulando uma caminhada com dificuldade ou desequilíbrio.

Descrição: A mão dominante, em configuração "V", representa as pernas de uma pessoa e executa um movimento de caminhada irregular à frente do corpo, simulando a ação de mancar. O movimento deve demonstrar dificuldade ou alteração no padrão normal da marcha. Expressão facial compatível com desconforto, dor ou dificuldade para caminhar.

6.19 Nojo



CM: Mão dominante aberta, dedos levemente curvados e unidos.

PA: Região central do tórax.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Deslocar a mão do tórax em direção ao rosto, com leve abertura dos dedos

durante o movimento.

Descrição: A mão dominante parte da região central do tórax e move-se para cima, em direção ao rosto, afastando-se do corpo enquanto os dedos se abrem levemente. A expressão facial deve indicar repulsa, aversão ou asco, reforçando o significado do sinal. Se desejar um padrão ainda mais alinhado ao utilizado por Capovilla nas descrições da área da saúde, recomendo acrescentar: Nariz franzido, lábios contraídos e expressão facial de repugnância ou aversão. Assim o registro fica tecnicamente mais completo para uma cartilha acadêmica e de validação linguística.

6.20 Palpitação



CM: Mão dominante aberta, dedos unidos e levemente curvados.

PA: Lado esquerdo do peito (região do coração).

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Pequenos movimentos repetitivos ou leves batidas sobre a região do coração, simulando batimentos acelerados ou irregulares.

Descrição: A mão dominante é posicionada sobre a região cardíaca e realiza movimentos curtos e repetidos, representando a sensação de batimentos cardíacos acelerados, fortes ou irregulares.

6.21 Sangramento



CM: Braço não dominante estendido com a mão fechada; mão dominante fechada com os dedos indicador e médio estendidos.

PA: Região interna do cotovelo do braço não dominante.

OR: Palmas voltadas para cima; posteriormente, palma da mão dominante voltada para baixo.

M: A mão dominante inicia próxima ao cotovelo, desloca-se para frente e para baixo com leve movimento dos dedos. Em seguida, fecha-se e move-se lateralmente para a direita.

Descrição: A mão dominante posiciona-se junto à parte interna do cotovelo e realiza movimento descendente, simulando o fluxo de sangue saindo do corpo. O movimento final reforça a ideia de sangramento ou hemorragia.

6.22 Solução



CM: Mão dominante em configuração aberta, com os dedos unidos.

PA: Região do tórax ou garganta.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Realizar movimentos curtos e bruscos para cima, simulando as contrações involuntárias características do soluço.

Descrição: Com a mão dominante próxima ao tórax ou à garganta, realizar movimentos rápidos e intermitentes, representando os espasmos involuntários do diafragma que provocam o soluço. A expressão facial deve acompanhar a sensação repentina e repetitiva do sintoma.

6.23 Sintomas



CM: Ambas as mãos abertas, com dedos levemente curvados.

PA: Região do corpo ou espaço neutro à frente do tronco.

OR: Palmas voltadas para o corpo.

M: Movimentos curtos e sucessivos indicando diferentes manifestações no organismo.

Descrição: As mãos representam os sinais ou manifestações percebidas no corpo, indicando alterações físicas ou emocionais associadas a uma doença ou condição de saúde.

6.24 Tosse



CM: Mão dominante fechada ou semiaberta.

PA: Região da boca.

OR: Palma voltada para dentro.

M: A mão dominante posiciona-se próxima à boca e realiza movimentos curtos e repetidos para frente, simulando o ato de tossir.

Descrição: Com a mão dominante próxima à boca, realizar movimentos rápidos e repetidos para frente, representando a expulsão de ar característica da tosse. A expressão facial deve acompanhar o esforço da ação.

6.25 Tremor



CM: Mão dominante aberta, dedos levemente curvados.

PA: Espaço neutro à frente do corpo ou sobre a região afetada.

OR: Palma voltada para baixo ou lateralmente.

M: Movimento rápido, curto e repetitivo, simulando vibração ou oscilação involuntária.

Descrição: A mão dominante realiza pequenos movimentos repetitivos de tremor, representando movimentos involuntários do corpo, das mãos ou de outras partes do organismo.

6.26 Vômito



CM: Mão dominante aberta, com dedos unidos e levemente curvados.

PA: Região da boca.

OR: Palma voltada para cima ou para frente.

M: Movimento que parte da boca para frente e para baixo, simulando a expulsão do conteúdo do estômago.

Descrição: A mão dominante inicia próxima à boca e desloca-se para frente e para baixo, representando a eliminação do conteúdo gástrico. A expressão facial deve indicar náusea, mal-estar ou esforço.

6.27 Zumbido



CM: Inicialmente, mão em configuração “1”. Em seguida, mão aberta com os dedos indicador e polegar unidos.

PA: Orelha.

OR: Palma voltada para frente.

M: Tocar a ponta do dedo indicador na orelha duas vezes. Em seguida, posicionar a mão diante da orelha e movê-la lateralmente para a direita.

Descrição: Após realizar o sinal de ouvido, a mão é posicionada próxima à orelha com indicador e polegar unidos, deslocando-se para o lado, representando a percepção de som contínuo ou ruído no ouvido.

7 DOENÇAS E CONDIÇÕES CLÍNICAS

7.1 Adoecer	
	
CM: Mão não dominante fechada; mão dominante aberta. PA: Pulso da mão não dominante. OR: Mão não dominante com a palma voltada para baixo; mão dominante com a palma voltada para frente. M: A mão dominante desloca-se para frente e finaliza tocando o pulso da mão não dominante com as pontas do dedo médio e do polegar. Descrição: Com a mão de apoio fechada à frente do corpo, a mão dominante avança e toca o pulso oposto, representando alteração do estado de saúde ou surgimento de doença.	

7.2 Alergia	
	
CM: Mão não dominante aberta; mão dominante aberta com dedos curvados. PA: Antebraço da mão não dominante. OR: Palma da mão de apoio voltada para cima; palma da mão dominante voltada para baixo. M: As pontas dos dedos da mão dominante passam sobre o antebraço duas	

vezes.

Descrição: Com o antebraço de apoio posicionado à frente do corpo, a mão dominante desliza as pontas dos dedos sobre ele, simulando coceira ou irritação na pele.

7.3 Anemia



CM: Inicialmente, mão em configuração “1”. Em seguida, mão aberta vertical e, por fim, mão em configuração “S”.

PA: Pálpebra inferior, lateral do rosto e espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palma voltada para trás; posteriormente, palma voltada para a esquerda.

M: Puxar levemente a pálpebra inferior; deslizar a mão pela lateral do rosto em direção ao queixo; finalizar abrindo e fechando suavemente a mão em configuração “S”.

Descrição: Com o dedo indicador, puxar levemente a pálpebra inferior, destacando a palidez característica da anemia. Em seguida, a mão aberta desliza pela lateral do rosto em direção ao queixo, acompanhada de expressão facial de cansaço. Finaliza com o sinal de branco, representando a perda de coloração frequentemente associada à condição.

7.4 Asma



CM: Mão dominante em configuração “X”; em seguida, mão aberta com dedos curvados.

PA: Frente da boca e região do peito.

OR: Palma voltada para trás.

M: Flexionar o dedo indicador duas vezes; depois, tocar o peito e realizar movimentos rápidos para cima e para baixo.

Descrição: A mão em configuração “X” é posicionada diante da boca com flexão do indicador. Em seguida, a mão aberta toca o peito e executa movimentos intensos para cima e para baixo, representando dificuldade respiratória.

7.5 Autismo



CM: Ambas as mãos em configuração “A”.

PA: À frente da testa.

OR: Palmas voltadas para dentro.

M: Movimento para frente com abertura gradual das mãos.

Descrição: As mãos iniciam em configuração “A” diante da testa e avançam para frente, abrindo-se gradualmente, representando a diversidade e a

amplitude do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

7.6 Bolha na mão



CM: Mão não dominante aberta; mão dominante aberta com dedos curvados.

PA: Palma da mão não dominante.

OR: Palma da mão de apoio voltada para cima; palma da mão dominante voltada para baixo.

M: A ponta dos dedos da mão dominante toca diferentes pontos da palma da outra mão, sucessivamente.

Descrição: Com a mão de apoio aberta e voltada para cima, a mão dominante toca diferentes pontos da palma com as pontas dos dedos curvados, representando pequenas bolhas ou lesões na pele. Pode ser acompanhada de expressão facial de leve desconforto.

7.7 Bronquite



Mão dominante aberta na horizontal, com a palma voltada para trás e dedos curvados, tocando a região do peito. Em seguida, mover a mão para frente e

para trás com intensidade, acompanhando movimentos rápidos de inspiração e expiração do ar.

7.8 Câncer



CM: Configuração específica do sinal-termo utilizado pela comunidade surda ou instituição de referência.

PA: Região do corpo associada ao conceito ou espaço neutro à frente do corpo.

OR: Conforme a execução do sinal.

M: Movimento característico que representa a proliferação ou comprometimento celular.

Descrição: Sinal utilizado para representar o câncer, grupo de doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos e órgãos do organismo.

7.9 Catapora



Mão não dominante aberta na vertical, com a palma voltada para frente. A mão dominante com polegar e indicador unidos pelas pontas toca alternadamente o antebraço, o rosto e outras partes do corpo, representando as marcas

características da catapora.

7.10 Caxumba



Mãos em configuração “C”, com as palmas voltadas para trás, tocando ambos os lados do pescoço. A expressão facial apresenta as bochechas infladas, representando o inchaço característico da caxumba.

7.11 Convulsão



CM: Mão não dominante aberta, palma voltada para cima; mão dominante com dedos curvados.

PA: Sobre a palma da mão não dominante.

OR: Palma da mão de apoio voltada para cima.

M: A mão dominante realiza movimentos rápidos e repetitivos de tremor ou contração sobre a palma da mão de apoio.

Descrição: Com a mão de apoio aberta à frente do corpo, a mão dominante executa movimentos repetitivos e involuntários sobre ela, representando os espasmos musculares característicos de uma convulsão.

7.12 Covid



CM: Ambas as mãos fechadas; em seguida, mão dominante aberta com os dedos separados.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas uma para a outra.

M: As mãos iniciam próximas, realizando movimento de rotação e deslocamento lateral. Em seguida, a mão dominante abre-se e afasta-se, representando a disseminação do vírus.

Descrição: As mãos realizam movimento circular e de deslocamento à frente do corpo, seguido da abertura da mão dominante, simbolizando a propagação do coronavírus e sua transmissibilidade.

7.13 Dengue



CM: Configuração de Mão

PA: Ponto de Articulação

OR: Orientação

M: Movimento

Descrição: descrição fonológica exata baseada na imagem e confrontada com os glossários da saúde.

7.14 Depressão



CM: Mão dominante aberta, dedos unidos e levemente curvados.


PA: Região do rosto ou do peito.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Movimento lento e descendente.

Descrição: A mão dominante realiza movimento para baixo a partir da região do rosto ou do peito, representando abatimento emocional, perda de energia e tristeza persistente associados à depressão. A expressão facial deve transmitir desânimo ou sofrimento emocional.

7.15 Derrame cerebral



Mão dominante em configuração “M”, tocando duas vezes o lado direito da testa com as pontas dos dedos. Em seguida, ambas as mãos em configuração “S”, palmas voltadas para trás e cruzadas diante da cabeça, movem-se com força para lados opostos. A expressão facial deve indicar tensão ou sofrimento.

7.16 Diabetes



CM: Mão dominante em configuração relacionada ao sinal terminológico de diabetes, com participação da mão de apoio.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para o corpo ou para a mão de apoio, conforme a execução do sinal.

M: Movimento que representa alteração metabólica relacionada à glicose e ao sangue, conforme a construção terminológica do sinal.

Descrição: Sinal utilizado para representar o diabetes, doença metabólica caracterizada pela alteração dos níveis de glicose no sangue. Sua construção terminológica está relacionada aos conceitos clínicos associados à condição.

7.17 Doença



CM: Mão não dominante fechada; mão dominante aberta.

PA: Pulso da mão não dominante.

OR: Mão não dominante com a palma voltada para baixo; mão dominante com a palma voltada para frente.

M: Tocar o pulso da mão não dominante com as pontas do dedo médio e do polegar da mão dominante.

Descrição: Com a mão de apoio fechada à frente do corpo, a mão dominante toca o pulso oposto com as pontas do dedo médio e do polegar, representando a presença de enfermidade ou alteração do estado de saúde.

7.18 Doente



CM: Mão não dominante fechada; mão dominante aberta.


PA: Pulso da mão não dominante.

OR: Mão não dominante com a palma voltada para baixo; mão dominante com a palma voltada para frente.

M: Tocar o pulso da mão não dominante com as pontas do dedo médio e do polegar da mão dominante.

Descrição: Com a mão de apoio fechada à frente do corpo, a mão dominante toca o pulso oposto com o dedo médio e o polegar, representando o estado de doença ou enfermidade.

7.19 Epidemia



CM: Ambas as mãos abertas, com os dedos separados.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para frente ou para baixo.

M: As mãos partem de um ponto central e se espalham para os lados, representando a disseminação rápida de uma doença entre muitas pessoas.

Descrição: Com ambas as mãos abertas à frente do corpo, realizar movimento de expansão para os lados, simbolizando a propagação de uma doença em uma determinada região ou população.

7.20 Estrabismo



CM: Inicialmente, ambas as mãos em configuração “I”. Em seguida, ambas as mãos com os dedos indicadores estendidos.

PA: Espaço neutro à frente do rosto.

OR: Palmas voltadas para dentro.

M: Os indicadores aproximam-se e cruzam-se à frente do corpo.

Descrição: As mãos iniciam em configuração “I” e evoluem para indicadores apontados um em direção ao outro, representando o desalinhamento dos olhos característico do estrabismo.

7.21 Febre Amarela



CM: Mão em configuração “L” (febre) seguida da configuração utilizada para o

sinal amarelo.

PA: Testa e espaço neutro à frente do corpo.

OR: Conforme a execução dos sinais.

M: Realizar o sinal de febre e, em seguida, o sinal de amarelo.

Descrição: Sinal composto pela execução sequencial dos sinais febre e amarelo, representando a doença infecciosa conhecida como Febre Amarela.

7.22 Ferida



CM: Mão dominante em configuração de pinça (indicador e polegar) ou mão aberta.

PA: Região do corpo onde se localiza a lesão.

OR: Palma voltada para o local indicado.

M: Tocar ou indicar a área lesionada, realizando movimento curto que representa um corte, machucado ou abertura na pele.

Descrição: Com a mão dominante, indicar ou tocar a região afetada do corpo, representando uma lesão, corte, escoriação ou abertura da pele. A expressão facial deve indicar dor ou desconforto.

7.23 Hepatite



CM: Mão dominante com os dedos indicador e médio estendidos em H; mão não dominante em configuração fechada.

PA: Região do lado direito do abdômen (fígado).

OR: Palma voltada lateralmente e para o corpo durante a execução.

M: A mão dominante desloca-se em direção à região do fígado e realiza movimento descendente sobre essa área.

Descrição: Com os dedos indicador e médio estendidos, a mão dominante dirige-se à região anatômica do fígado e executa movimento para baixo, representando inflamação ou comprometimento hepático característico da hepatite.

7.24 Herpes



CM: Mão dominante com dedos indicador e polegar unidos (pinça) ou dedos levemente curvados.

PA: Região dos lábios ou área afetada.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Toques curtos e repetidos sobre a região dos lábios ou local da lesão.

Descrição: A mão dominante realiza pequenos toques sobre a região afetada, representando as vesículas ou feridas características da infecção herpética.

7.25 Infarto



CM: Mão dominante aberta ou em configuração relacionada ao sinal de coração.

PA: Lado esquerdo do peito (região cardíaca).

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Tocar a região do coração e realizar movimento brusco ou de interrupção.

Descrição: O sinal é realizado sobre a região cardíaca, representando uma alteração súbita do funcionamento do coração, característica do infarto.

7.26 Insônia



CM: Mãos abertas, dedos estendidos em “R” na lateral de cada olho.

PA: Região dos olhos.

OR: Palmas voltadas para o rosto.

M: Realizar movimento próximo aos olhos, indicando estado de vigília prolongada ou ausência de sono.

Descrição: As mãos são posicionadas próximas aos olhos e executam movimento que representa a dificuldade para dormir ou permanecer dormindo. O sinal remete ao estado de permanecer acordado durante a noite, característico da insônia. Olhos bem abertos, expressão de cansaço,

preocupação ou dificuldade para dormir.

7.27 Intoxicação



CM: Mão dominante aberta, dedos unidos e levemente curvados.

PA: Região da boca e do estômago.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Movimento descendente da boca em direção ao estômago, seguido de expressão de mal-estar.

Descrição: A mão parte da região da boca e desloca-se em direção ao estômago, representando a entrada de substância nociva no organismo e seus efeitos.

7.28 Labirintite



CM: Mão dominante em configuração da letra "L" ou com o dedo indicador estendido.

PA: Região lateral da cabeça, próxima ao ouvido.

OR: Palma voltada para dentro.

M: Realizar movimento circular ou de rotação próximo ao ouvido,

representando tontura, desequilíbrio ou alteração do labirinto.

Descrição: Com a mão dominante próxima à região do ouvido, realizar movimento circular contínuo, representando a alteração do sistema vestibular responsável pelo equilíbrio corporal. A expressão facial deve indicar tontura ou instabilidade.

7.29 Leucemia



CM: Mão não dominante em configuração em “L”, palma para frente tocando o antebraço de cima para baixo.

PA: Antebraço da mão não dominante.

OR: Palma da mão dominante voltada para frente.

M: Inicialmente realizar o sinal com a mão dominante toca repetidamente o antebraço de cima para baixo.

Descrição: Mão dominante toca o antebraço oposto em movimentos sucessivos, representando a leucemia, doença caracterizada pela produção anormal de células sanguíneas na medula óssea. A expressão facial deve indicar preocupação ou gravidade compatível com o contexto clínico

7.30 Meningite



CM: Mão dominante em configuração da letra "M".

PA: Região lateral da testa ou da cabeça.

OR: Palma voltada para dentro.

M: A mão em configuração "M" toca ou aproxima-se da lateral da cabeça, realizando movimento curto e repetido.

Descrição: Com a mão dominante em configuração da letra "M", tocar a lateral da cabeça, representando a meningite, doença que provoca inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A expressão facial deve indicar dor ou mal-estar.

7.31 Otite



CM: Mão dominante aberta, na vertical, com a palma voltada para a lateral.

PA: Orelha.

OR: Palma voltada para o lado.

M: Unir as pontas dos dedos indicador e polegar e tocar a orelha duas vezes.

Descrição: Com a mão dominante aberta e os dedos indicador e polegar unidos pelas pontas, tocar a orelha duas vezes, representando inflamação ou infecção no ouvido. A expressão facial deve indicar dor ou desconforto.

7.32 Paralisia Facial



CM: Mão dominante aberta ou em configuração “5”.

PA: Lateral do rosto.

OR: Palma voltada para o rosto.

M: A mão toca uma das laterais da face e realiza movimento descendente ou de deslizamento, representando perda de movimento muscular.

Descrição: A mão dominante toca um dos lados do rosto e desliza suavemente para baixo, simbolizando a diminuição ou ausência dos movimentos faciais característica da paralisia facial.

7.33 Parkinson



CM: Mão dominante aberta, dedos levemente curvados.

PA: À frente do corpo, próximo ao peito ou à mão de apoio.

OR: Palma voltada para baixo ou lateralmente.

M: Movimento rápido e repetitivo de tremor.

Descrição: A mão dominante realiza movimentos curtos e repetitivos de tremor, representando os movimentos involuntários característicos da Doença de Parkinson. A expressão facial permanece séria ou de atenção.

7.34 Pneumonia



M: Mão dominante aberta, dedos unidos e levemente curvados.

PA: Região do tórax (pulmões).

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Movimento curto sobre o peito, acompanhado de expressão facial que sugere dificuldade respiratória.

Descrição: A mão dominante é posicionada sobre a região dos pulmões e realiza movimento que representa comprometimento ou inflamação respiratória, característicos da pneumonia.

7.35 Rinite



CM: Mão dominante aberta, dedos levemente curvados.

PA: Região do nariz.

OR: Palma voltada para o rosto.

M: Movimento curto e repetido próximo ao nariz, simulando irritação ou coceira nasal.

Descrição: A mão dominante realiza movimento próximo ao nariz, representando a irritação da mucosa nasal característica da rinite. A expressão

facial pode indicar desconforto respiratório ou vontade de espirrar

7.36 Rubéola



CM: Ambas as mãos abertas, com dedos levemente curvados.

PA: Região do rosto e parte superior do tronco.

OR: Palmas voltadas para o corpo.

M: Toques leves e sucessivos sobre a pele, representando o aparecimento de manchas.

Descrição: As mãos realizam movimentos suaves sobre a região do rosto ou do tronco, simulando as manchas avermelhadas características da rubéola.

7.37 Sarampo



CM: Mão dominante fechada, com os dedos indicador e polegar estendidos e próximos entre si.

PA: Braço não dominante.

OR: Palma voltada lateralmente.

M: Tocar o braço em vários pontos com o dorso do polegar, de forma sucessiva.

Descrição: A mão dominante aproxima-se do braço oposto e toca diferentes

pontos da pele com o dorso do polegar, representando as manchas características do sarampo.

7.38 Sarna



M: Mão dominante aberta, com dedos curvados.

PA: Antebraço, braço ou região afetada da pele.

OR: Palma voltada para baixo.

M: As pontas dos dedos passam repetidamente sobre a pele, simulando coceira intensa.

Descrição: A mão dominante realiza movimentos repetidos de coçar sobre a pele, representando a irritação e o prurido característicos da sarna.

7.39 Síndrome



CM: Mão não dominante aberta; mão dominante em configuração "A".

PA: Palma da mão não dominante.

OR: Palma da mão não dominante voltada para frente.

M: A mão dominante toca a lateral da palma da mão de apoio e desliza horizontalmente sobre ela.

Descrição: Com a mão de apoio aberta na vertical, a mão dominante em

configuração “A” toca sua lateral e desliza suavemente sobre a palma, finalizando à frente da mão não dominante.

7.40 Sinusite



CM: Mão dominante aberta, com dedos indicador e médio estendidos.

PA: Região das maçãs do rosto e laterais do nariz (seios da face).

OR: Palma voltada para o rosto.

M: Tocar ou deslizar levemente os dedos sobre as laterais do nariz e maçãs do rosto.

Descrição: A mão dominante toca a região dos seios da face, próxima ao nariz e às maçãs do rosto, representando a inflamação dos seios paranasais característica da sinusite. A expressão facial pode indicar dor ou pressão facial.

7.41 Torcicolo



CM: Mão dominante em configuração “C” ou aberta, com dedos levemente curvados.

PA: Região lateral do pescoço.

OR: Palma voltada para o pescoço.

M: Tocar ou pressionar a lateral do pescoço, acompanhado de leve inclinação da cabeça para o mesmo lado.

Descrição: A mão dominante toca a lateral do pescoço, representando dor, rigidez ou limitação dos movimentos cervicais característicos do torcicolo. A expressão facial deve indicar desconforto ou dor.

7.42 Trauma



CM: Mão dominante em configuração aberta, com os dedos unidos.

PA: Região do corpo afetada.

OR: Palma voltada para o local indicado.

M: A mão dominante toca ou impacta a região afetada, seguida de uma expressão facial que indica dor, lesão ou choque.

Descrição: Com a mão dominante aberta, tocar ou indicar a região lesionada do corpo, representando uma lesão física decorrente de impacto, acidente ou agressão ao organismo.

7.43 Doença Transmissível



	
CM: Ambas as mãos abertas. PA: Espaço neutro à frente do corpo. OR: Palmas voltadas para frente ou uma em direção à outra. M: Movimento de deslocamento de uma mão para a outra ou para frente, representando transferência ou propagação. Descrição: As mãos realizam movimento que indica passagem ou transmissão de algo entre pessoas ou de um local para outro, representando a disseminação de doenças, vírus, bactérias ou outros agentes infecciosos.	

7.44 Transtorno Bipolar	
	
CM: Mão dominante em configuração “L”. PA: Próxima ao queixo. OR: Palma voltada lateralmente. M: Movimento alternado para cima e para baixo. Descrição: A mão em configuração “L” é posicionada próxima ao queixo e realiza movimentos alternados ascendentes e descendentes, representando oscilações de humor características do transtorno bipolar.	

7.45 Tuberculose



CM: Mão dominante em configuração "T".

PA: Região do tórax (pulmões).

OR: Palma voltada para o corpo.

M: A mão em configuração "T" toca ou aproxima-se do tórax, realizando movimento curto e repetido.

Descrição: Com a mão dominante em configuração da letra "T", tocar ou aproximar-se da região do tórax, representando a tuberculose, doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões.

7.46 Úlcera



CM: Mão dominante com dedos indicador e polegar unidos (pinça) ou dedos levemente curvados.

PA: Região do estômago ou área afetada.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: Toque ou movimento curto e repetido sobre a região indicada, representando lesão ou ferida interna.

Descrição: A mão dominante indica a região do estômago e realiza movimento que representa uma ferida ou lesão localizada, característica da úlcera. A

expressão facial deve indicar dor ou desconforto.

7.47 Verme



CM: Mão dominante em configuração "V" (dedos indicador e médio estendidos e unidos ou levemente separados).

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palma voltada para baixo ou lateralmente.

M: Realizar movimento ondulatório ou sinuoso com os dedos indicador e médio, simulando o deslocamento de um verme.

Descrição: Com a mão dominante em configuração "V", realizar movimento sinuoso à frente do corpo, representando visualmente o deslocamento de um verme ou parasita intestinal.

8 PRESCRIÇÕES MÉDICAS

8.1 Dieta



CM: Mão não dominante aberta, palma voltada para cima; mão dominante em configuração semelhante à de pegar ou selecionar alimento.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palma da mão de apoio voltada para cima.

M: A mão dominante realiza movimento controlado de seleção ou retirada sobre a palma da mão de apoio.

Descrição: O sinal representa controle ou restrição alimentar, indicando a escolha cuidadosa dos alimentos e o acompanhamento da alimentação para fins de saúde.

8.2 Medicamento



CM: Mão não dominante em configuração de mão em concha ou mão aberta relaxada;

Mão dominante em configuração de “pinça” (polegar e indicador aproximados), como se segurasse um comprimido pequeno.

PA: Região próxima à boca (lábios).

OR: Mão não dominante, quando utilizada, à frente do tronco, em posição neutra, sem contato obrigatório;

Mão dominante iniciando à frente do rosto e aproximando-se da boca.

M: A mão dominante, em pinça, realiza um movimento curto de aproximação em direção à boca, como se levasse um comprimido para ser ingerido. Em algumas variações, toca levemente os lábios ou para próximo deles, repetindo 1–2 vezes.

Descrição: A mão dominante, em configuração de pinça, se move em direção à boca como se estivesse levando um comprimido para ser engolido, representando o ato de tomar um medicamento. Em algumas descrições e materiais, a mão não dominante pode permanecer neutra ou levemente em

concha à frente do corpo, reforçando o contexto de “remédio/medicamento”.

8.3 Receita médica



CM: Mão não dominante aberta, palma voltada para cima; mão dominante em configuração semelhante à de segurar uma caneta.

PA: Palma da mão não dominante.

OR: Palma da mão de apoio voltada para cima.

M: A mão dominante realiza movimentos curtos de escrita sobre a palma da mão não dominante.

Descrição: Com a mão de apoio aberta, a mão dominante simula o ato de escrever sobre sua palma, representando o preenchimento ou a emissão de uma receita médica.

8.4 Repousar



CM: Ambas as mãos abertas, com dedos naturalmente curvados.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palma da mão não dominante voltada para cima; palma da mão dominante voltada para baixo.

M: A mão dominante é apoiada suavemente sobre a mão não dominante,

permanecendo em posição de descanso. Descrição: Com a mão de apoio aberta e voltada para cima, a mão dominante repousa sobre ela, representando descanso, repouso ou interrupção das atividades para recuperação física.

9 CIRURGIAS

9.1 Cesariana



Mãos em configuração "V", com as palmas voltadas para cima, posicionadas na região inferior do abdômen. Realizar movimento horizontal de um lado para o outro, simulando uma incisão cirúrgica. Em seguida, deslocar ambas as mãos para baixo, representando a retirada do bebê por meio do procedimento cirúrgico.

9.2 Operação cirúrgica



CM: Mão dominante em configuração semelhante à letra "V". Mão não dominante fechada, posicionada junto ao corpo.

PA: Região inferior do abdômen até a região superior do tórax.

OR: Palma da mão dominante voltada para cima.

M: A mão dominante inicia na região inferior do abdômen e desloca-se diagonalmente para cima, em direção ao ombro oposto, simulando um procedimento cirúrgico.

Descrição: Com a mão dominante em configuração "V" e palma voltada para cima, iniciar o movimento na região inferior do abdômen e deslocá-la diagonalmente até o ombro oposto, representando uma operação cirúrgica.

9.3 Transplante de coração



CM: Mão não dominante em configuração de mão aberta, palma voltada para cima. Mão dominante em configuração curva, representando o formato do coração.

PA: Espaço neutro à frente do tórax.

OR: Palma da mão não dominante voltada para cima. Mão dominante voltada para baixo em direção à mão de apoio.

M: A mão dominante aproxima-se da mão não dominante e realiza movimento de encaixe sobre ela, representando a substituição de um órgão.

Descrição: Com a mão não dominante aberta e palma voltada para cima, posicionada à frente do corpo, aproximar a mão dominante em configuração que representa o coração e realizar movimento de encaixe sobre a mão de apoio, representando o transplante de coração.

9.4 Implante Coclear



CM: Mão dominante em configuração em "5".

PA: Região lateral da cabeça, próxima à orelha.

OR: Palma voltada lateralmente.

M: A mão dominante aproxima-se da região da da cabeça próximo a orelha e realiza um breve movimento de contato ou posicionamento sobre a área onde é utilizado o dispositivo.

Descrição: Com a mão dominante em configuração em "5", posicioná-la próxima à orelha e realizar um breve movimento de contato na região lateral da cabeça, representando o implante coclear.

9.5 Bariátrica



CM: Ambas as mãos em configuração "V" (indicadores estendidos).

PA: Região lateral do abdômen/cintura.

OR: Palmas voltadas para dentro.

M: Os indicadores iniciam nas laterais do abdômen e deslocam-se em direção ao centro do corpo simultaneamente.

Descrição: Com os dedos indicadores apontados para a região abdominal, as mãos movem-se das laterais para o centro, representando a redução do

volume do estômago e a diminuição da circunferência abdominal obtidas por meio da cirurgia bariátrica.

10 RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO

10.1 Fisioterapia



CM: Mão dominante em configuração da letra "F".

PA: Região do braço, ombro ou membro que recebe o tratamento.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: A mão dominante realiza movimento de manipulação, alongamento ou estímulo sobre o membro, representando o tratamento fisioterapêutico.

Descrição: Com a mão dominante em configuração da letra "F", realizar movimento que simula a recuperação ou reabilitação dos movimentos corporais, representando a fisioterapia. A expressão facial deve ser neutra e demonstrar atenção ao procedimento.

11 PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR

11.1 Amamentar



CM: Mão dominante em configuração da letra "C", representando o seio materno.

PA: Região do peito, próximo à mama.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: A mão dominante toca lateralmente a região da mama e realiza movimento curto em direção à frente ou à boca do bebê imaginário, simulando o ato de alimentar a criança através do leite materno.

Descrição: Com a mão dominante em configuração da letra "C", posicionada próxima à mama, realizar movimento que representa a oferta do seio ao bebê durante a amamentação. O sinal remete visualmente ao ato de nutrir a criança por meio do leite materno. A expressão facial deve ser suave e acolhedora, demonstrando cuidado e afeto.

11.2 Assoar



CM: Ambas as mãos abertas.

PA: Laterais do nariz.

OR: Palmas voltadas para o rosto.

M: Movimento curto para frente, repetido duas vezes.

Descrição: Com as mãos abertas próximas às laterais das narinas, realizar movimentos curtos para frente, simulando o ato de assoar o nariz.

11.3 Curativo adesivo



CM: Indicador e polegar estendidos, formando um ângulo aberto; dedos médio, anelar e mínimo flexionados.

PA: Espaço neutro à frente do corpo e sobre a mão não dominante.

OR: Palmas voltadas para baixo.

M: As mãos simulam a abertura do curativo adesivo. Em seguida, a mão dominante realiza movimento de aplicação sobre a mão não dominante, representando a colocação do curativo.

Descrição: Com ambas as mãos em configuração adequada, realizar movimento que representa a aplicação de um curativo adesivo sobre um pequeno ferimento. O sinal remete à proteção de cortes ou escoriações superficiais da pele. A expressão facial deve indicar cuidado e atenção.

11.4 Banhar-se



CM: Ambas as mãos em configuração “A”.

PA: Espaço neutro à frente do tronco.

OR: Palmas voltadas para frente.

M: Movimentos alternados para cima e para baixo.

Descrição: Com as mãos em configuração “A” e palmas voltadas para frente, realizar movimentos alternados para cima e para baixo, simulando o ato de tomar banho.

11.5 Defecar / diarreia



CM: Mão dominante em configuração “S” (punho fechado). Mão não dominante com antebraço posicionado à frente do corpo.

PA: Região do antebraço não dominante.

OR: Palma da mão dominante voltada para trás.

M: A mão dominante toca a parte superior do antebraço não dominante e realiza movimento descendente duas vezes ao longo do braço.

Descrição: Com o antebraço não dominante dobrado à frente do corpo, posicionar a mão dominante em configuração “S”, com a palma voltada para trás. Tocar a região superior do antebraço oposto e realizar movimento para baixo duas vezes, representando a eliminação de fezes. Quando utilizado para indicar diarreia, a expressão facial deve demonstrar maior desconforto, mantendo a boca semiaberta e evidenciando mal-estar físico relacionado ao sintoma.

11.6 Engolir



CM: Mão dominante em configuração “X”.

PA: Parte frontal do pescoço, na região da garganta.

OR: Palma voltada para o corpo.

M: A ponta do dedo indicador flexionado da mão dominante toca a região da garganta e realiza movimento descendente ao longo do pescoço, acompanhando o trajeto da deglutição.

Descrição: Com a mão dominante em configuração “X”, tocar a parte frontal do pescoço na região da garganta e realizar movimento suave para baixo, representando a passagem do alimento ou da saliva pelo esôfago. Simultaneamente, a cabeça pode inclinar-se levemente para frente, simulando o ato natural de engolir. A expressão facial deve ser neutra, demonstrando a ação fisiológica da deglutição.

11.7 Hemodiálise



CM: Mão não dominante aberta, palma voltada para cima; mão dominante com os dedos indicador e médio estendidos.

PA: Região do antebraço e espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para cima e lateralmente durante a execução.

M: Realizar o sinal de sangue e, em seguida, movimentos circulares contínuos das mãos, representando a retirada, filtragem e retorno do sangue ao organismo.

Descrição: O sinal inicia com referência ao sangue e evolui para movimentos circulares que simbolizam a circulação extracorpórea realizada durante a hemodiálise, representando o processo de filtração artificial do sangue.

11.8 Quimioterapia



CM: Mão dominante aberta ou em configuração relacionada ao tratamento;

mão não dominante como apoio.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas para o corpo ou para a mão de apoio.

M: Movimento que representa aplicação ou realização de tratamento contínuo, associado ao conceito de câncer.

Descrição: Sinal composto que representa o tratamento medicamentoso utilizado no combate ao câncer, envolvendo a ideia de intervenção terapêutica para controle ou eliminação das células doentes.

11.9 Transfusão de sangue



CM: Mão não dominante fechada; mão dominante fechada com os dedos indicador e médio estendidos.

PA: Região do antebraço ou parte interna do cotovelo.

OR: Palmas voltadas para cima.

M: Realizar o sinal de sangue e, em seguida, movimento que representa transferência ou entrada de sangue no organismo.

Descrição: O sinal inicia com a representação do sangue circulando ou sendo retirado e finaliza com movimento que indica a transferência de sangue para outra pessoa, simbolizando a transfusão sanguínea.

12 CONVÊNIOS MÉDICOS

12.1 Paciente SUS (Sistema Único de Saúde)



CM: Ambas as mãos em configuração “U”.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Mão não dominante em “U” na vertical; mão dominante em “U” na horizontal.

M: A mão dominante passa suavemente entre os dedos da mão de apoio, realizando deslocamento lateral para a direita e para a esquerda.

Descrição: Com a mão não dominante em “U” na posição vertical e a mão dominante em “U” na horizontal, a mão dominante desliza suavemente pelo espaço entre os dedos da outra mão, representando o Sistema Único de Saúde (SUS).

12.2 Paciente particular



CM: Sinal composto pelos sinais PACIENTE + PARTICULAR.

PA: Espaço neutro à frente do corpo e lado direito do peito.

OR: Palmas voltadas conforme a execução de cada sinal.

M: Realizar inicialmente o sinal de PACIENTE. Em seguida, executar o sinal

PARTICULAR tocando a ponta do polegar no lado direito do peito.

Descrição: O sinal é formado pela combinação dos sinais **PACIENTE** e **PARTICULAR**. Inicialmente realiza-se o sinal de paciente e, em seguida, o sinal particular, tocando a ponta a mão esquerda em classificador de pessoa e sinal de particuar.

12.3 Paciente Conveniado



CM: Mão não dominante em configuração correspondente ao sinal de convênio; mão dominante em configuração utilizada no sinal de paciente.

PA: Espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palmas voltadas uma para a outra durante a execução do sinal.

M: Realizar inicialmente o sinal de **CONVÊNIO MÉDICO** e, em seguida, o sinal de **PACIENTE**, conforme demonstrado nas imagens.

Descrição: O sinal é formado pela combinação dos sinais **CONVÊNIO MÉDICO** e **PACIENTE**. Inicialmente realiza-se o sinal de convênio, seguido do sinal de paciente. Representa a pessoa vinculada a um plano ou convênio de saúde, que utiliza consultas, exames, procedimentos e internações por meio da cobertura oferecida pela operadora contratada.

13 HOSPITAIS EM LINHARES – ES

13.1 Hospital público HGL



CM: Mão dominante em configurações correspondentes às letras utilizadas no sinal (iniciando próximo ao nariz e evoluindo para configurações semelhantes às letras da sigla).

PA: Região do nariz e espaço neutro à frente do corpo.

OR: Palma voltada lateralmente e para frente, conforme a transição das configurações de mão.

M: O sinal inicia com toque próximo ao nariz, seguido da formação sequencial das configurações de mão que representam a sigla HGL.

Descrição: Realizar o movimento inicial próximo ao nariz e, em seguida, executar as configurações correspondentes à identificação do Hospital HGL, finalizando à frente do corpo.

13.2 LMC - Hospital Linhares Medical Center



CM: Mão não dominante em configuração semelhante à letra "L". Mão dominante realiza configurações correspondentes às letras "M" e "C".

PA: Espaço neutro à frente do tronco.

OR: Palma da mão não dominante voltada lateralmente. Mão dominante orientada para a frente durante a execução das letras.

M: A mão não dominante permanece em configuração "L" como referência. A mão dominante realiza sucessivamente as configurações correspondentes às letras "M" e "C", posicionando-se próximas à mão de apoio.

Descrição: Com a mão não dominante em configuração "L" à frente do corpo, realizar com a mão dominante as configurações correspondentes às letras "M" e "C", identificando o Hospital Linhares Medical Center (LMC).

13.3 Hospital Unimed



CM: Ambas as mãos em configuração semelhante à letra “U”.

PA: Espaço neutro à frente do tronco.

OR: Palmas voltadas uma para a outra.

M: As mãos iniciam próximas uma da outra, afastam-se lateralmente e, em seguida, realizam movimento descendente simultâneo.

Descrição: Com ambas as mãos em configuração “U”, posicionadas à frente do corpo, realizar um movimento de abertura lateral seguido de deslocamento para baixo, representando o Hospital Unimed.

13.4 Hospital Rio Doce



CM: Mão dominante em configuração semelhante à letra “R”.

PA: Região do nariz e da boca.

OR: Palma voltada lateralmente.

M: A mão toca a lateral do nariz, desliza levemente sobre a região nasal e finaliza à frente da boca.

Descrição: Com a mão em configuração “R”, tocar a lateral do nariz, realizar um breve movimento sobre a região nasal e finalizar diante da boca, identificando o Hospital Rio Doce.



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração da Cartilha de Libras no Contexto da Saúde representou muito mais do que a produção de um material educativo; constituiu-se em uma experiência formativa significativa, capaz de integrar conhecimento técnico, responsabilidade social, inovação e compromisso com a inclusão. Ao longo do desenvolvimento do projeto, os estudantes foram desafiados a investigar uma demanda real da sociedade, dialogar com diferentes públicos, construir soluções acessíveis e aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos durante sua formação profissional.

A proposta surgiu da compreensão de que a comunicação acessível é um direito fundamental e um dos pilares para a promoção da equidade nos serviços de saúde. A partir das pesquisas realizadas, das consultas à comunidade surda, da escuta de profissionais da área da saúde e da análise das necessidades identificadas, tornou-se evidente que as barreiras comunicacionais ainda representam um dos principais obstáculos enfrentados pelas pessoas surdas no acesso aos serviços de atendimento, acolhimento e orientação em saúde.

Nesse cenário, a cartilha foi concebida como uma ferramenta de apoio à comunicação, reunindo vocabulários específicos da área da saúde em Libras, imagens ilustrativas e vídeos acessíveis por meio de QR Codes, favorecendo a aprendizagem visual, a consulta rápida e a ampliação do repertório linguístico dos usuários. A utilização de recursos multimodais contribui para tornar o material mais inclusivo, interativo e alinhado às diferentes formas de aprendizagem, potencializando sua aplicabilidade em ambientes educacionais, institucionais e profissionais.

Sob a perspectiva pedagógica, o projeto proporcionou aos estudantes uma vivência concreta dos princípios que fundamentam o Modelo Pedagógico Senac, especialmente no que se refere ao protagonismo do aluno, à aprendizagem



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

baseada em desafios, à integração entre teoria e prática e à formação por competências. Durante todas as etapas do processo, os participantes assumiram papel ativo na pesquisa, na organização das informações, na produção dos registros fotográficos, na gravação dos vídeos, na validação dos sinais e na construção coletiva das soluções apresentadas.

Além do desenvolvimento das competências técnicas relacionadas à Libras e à mediação linguística, a experiência favoreceu o fortalecimento de habilidades essenciais para o exercício profissional contemporâneo, tais como trabalho em equipe, comunicação, pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas, planejamento, autonomia intelectual e compromisso ético com a diversidade humana. Tais aprendizagens extrapolam os limites da sala de aula e contribuem para a formação de profissionais mais preparados para atuar de forma sensível, inclusiva e transformadora em diferentes contextos sociais.

Outro aspecto relevante deste projeto foi a valorização do protagonismo da comunidade surda, cuja participação foi fundamental para a construção e validação do material. Reconhecer a pessoa surda como sujeito de direitos e como agente ativo na produção de conhecimentos fortalece a legitimidade da proposta e reafirma a importância do diálogo entre instituição formadora, comunidade e sociedade.

Os resultados alcançados evidenciam que iniciativas voltadas à acessibilidade comunicacional possuem potencial para promover mudanças significativas nos espaços sociais, especialmente em áreas essenciais como a saúde. Ainda que a cartilha não esgote a complexidade das demandas existentes, ela representa uma contribuição concreta para a ampliação do acesso à informação, para a humanização dos atendimentos e para o fortalecimento da cultura inclusiva.

Por fim, espera-se que este material possa inspirar novas ações, pesquisas e projetos voltados à promoção da acessibilidade e da inclusão social, ampliando



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

o reconhecimento da Libras como língua legítima da comunidade surda e como instrumento indispensável para a garantia de direitos. Que a Cartilha de Libras no Contexto da Saúde se consolide como um recurso de aprendizagem, sensibilização e transformação social, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, acessível, humanizada e comprometida com o respeito à diversidade.

Mais do que um produto educacional, esta cartilha simboliza o poder transformador da educação profissional quando aliada à empatia, à inovação e ao compromisso social. Ela materializa o propósito de formar profissionais capazes de gerar impacto positivo na sociedade, promovendo inclusão, cidadania e dignidade para todos



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

REFERÊNCIAS

ALBRES, Neiva de Aquino. Libras em estudo: políticas linguísticas. São Paulo: FENEIS, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 25 abr. 2002.

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 23 dez. 2005.

BRASIL. Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2 set. 2010.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 7 jul. 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

CHAVEIRO, Neuma; BARBOSA, Maria Alves; PORTO, Celmo Celeno. Revisão de literatura sobre o atendimento ao paciente surdo pelos profissionais da saúde. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 42, n. 3, p. 578-583, 2008.

GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.



COMUNICAÇÃO EM LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚDE
GUIA BÁSICO PARA ATENDIMENTO

GOLDFELD, Márcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. 2. ed. São Paulo: Plexus, 2002.

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Intérprete de Libras em atuação na educação inclusiva. Porto Alegre: Mediação, 2009.

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara Ferreira dos; CAETANO, Juliana Fonseca. Tenho um aluno surdo, e agora? Introdução à Libras e educação de surdos. São Carlos: EdUFSCar, 2014.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? 2. ed. São Paulo: Summus, 2015.

PERLIN, Gladis Teresinha Taschetto. Identidades surdas. In: QUADROS, Ronice Müller de (org.). Estudos Surdos I. Petrópolis: Arara Azul, 2013.

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed, 1997.

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 8. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2010.

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998.

STOKOE, William. Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf. Buffalo: University of Buffalo Press, 1960.

STROBEL, Karin Lilian. As imagens do outro sobre a cultura surda. 3. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008.

AUTORES

Camili Batista Sepulchro
Edna Marçal de Paula Legora
Jasmile Florencio dos Passos
Josiane Altoé Boldrini Rangel
Josineia Sizenando de Oliveira Bomfim
Joyce de Oliveira Pompermayer
Juliana do Amaral dos Santos
Karolinny Alves Soares da Silva
Larissa Carvalho Ribeiro
Laysa Pereira Gomes
Lethicia Fraga Siqueira
Natália Batista Ferovante Quaresma
Nilza Gonçalves Baldi
Noelza Vieira Seidel
Regina Marcal Giovani
Ugo Pereira da Silva

EDIÇÃO GRÁFICA

Jasmile Florencio dos Passos

IMAGENS

Camili Batista Sepulchro
Luiza Supelete Ribeiro
Natália Batista FerovanteQuaresma

INSTRUTORA

Jackeline Santana José

ANALISTA RESPONSÁVEL

Ivan Contadini

COLABORADORES

Aline Sardice Bustamante Souza
Poliana de Souza Pereira Provetti
Thais da Penha Camatta

CONHEÇA OS ALUNOS

Adiohane



Camili



Joyce



Jasmile



Josia



Josineia



Edna



Juliana



Karolinny



Larissa



Láysa



Lethicia



Natália



Nilza



Noelza



Regina



Ugo



Realização



Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC

Apoio



Associação dos Surdos de Linhares - ASSURLIN