

**Questão 1**

Uma empresa decidiu fazer uma pesquisa sobre vacinação entre seus funcionários, após a ocorrência de vários casos de sarampo em um de seus departamentos.

Com relação à vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), identificou-se que a maioria dos funcionários havia tomado 2 doses (uma dose com um ano de idade e uma dose de reforço, após 5 anos de idade), conforme orientação do ministério da saúde. No entanto, identificou-se que 140 funcionários nunca haviam tomado nenhuma dose e que alguns haviam tomado uma única dose (ou seja, não tomaram a dose de reforço).

Sabendo que a média do número de doses tomadas pelos funcionários foi de 1,2, qual o número de funcionários que tomou apenas 1 dose e que tomou 2 doses, respectivamente?

Alternativas:

- (a) 40 e 320
- (b) 100 e 325
- (c) 200 e 260
- (d) 60 e 225
- (e) 240 e 270

*Solução:*

Seja  $A$  o número de funcionários que tomaram 2 doses e  $B$  o número de funcionários que tomaram 1 dose. Sabendo que a média de doses dos funcionários é igual a 1,2, podemos escrever a seguinte média ponderada:

$$1,2 = \frac{2.A + 1.B + 140.0}{A + B + 140}.$$

Isolando a variável  $A$ , temos que

$$A = \frac{B}{4} + 210.$$

Assim, concluímos que  $B$  deve ser divisível por 4 para que  $A$  assumira um valor inteiro.

Outra informação relevante oferecida pelo enunciado é o fato da maioria dos funcionários haver tomado as 2 doses, ou seja,  $A > 140 + B$ . Assim, juntando os dois fatos, temos que

$$A > 140 + B \implies \frac{B}{4} + 210 > 140 + B \implies B < \frac{4}{3}.70 = 93, \bar{3}.$$

Como  $B$  é um inteiro positivo divisível por 4, está entre os valores 4 e 92. Podemos escrevê-lo como  $B = 4.k$ , com  $k = 1, \dots, 23$ . Assim, o conjunto das 23 soluções possíveis é denotado por

$$(A, B) = (210 + k, 4.k), \text{ com } k = 1, \dots, 23.$$

Em princípio, apenas os itens (a) e (d) são possíveis observando apenas os valores de  $B$ . Para  $k = 10$ , temos  $(A, B) = (220, 40)$ . Já para  $k = 15$ , temos  $(A, B) = (225, 60)$  caracterizando a alternativa (d).

### Questão 2

O presidente da câmara dos deputados defende a redução dos salários dos servidores para minimizar o impacto econômico causado pela pandemia do coronavírus.

O texto inicial do projeto prevê uma redução de 30% para todos os servidores federais. Em relação às estatísticas dos novos salários, considere as afirmativas abaixo:

I - A média diminui em 30%

II - A variância diminui em 30%

III - O coeficiente de variação não se altera

É correto o que se afirma em:

Escolha uma:

(a) II e III, apenas

(b) I, apenas

(c) I e III, apenas

(d) II, apenas

(e) I, II e III

*Solução:* Seja  $x_1, \dots, x_n$  o valor dos salários do  $n$  servidores. A modificação percentual dos salários pode ser vista como uma mudança de escala dos valores, ou seja,  $y_i = a.x_i$ , com  $i = 1, \dots, n$ . No caso específico de uma redução de 30%, temos  $a = 0,70$ . Entretanto, para obtermos resultados generalizados, continuamos a usar a constante  $a$  para confirmar ou refutar as afirmações do enunciado.

A afirmação I é verdadeira, pois, seja  $\mu_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$  a média salarial antes da redução. Logo, após a redução temos

$$\mu_y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a.x_i = a \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = a.\mu_x.$$

Em outras palavras, a nova média sofre a mesma redução que sofreram os salários individuais.

Já a afirmação II é falsa, pois, seja  $\sigma_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2$  a variância amostral dos salários antes da redução. Logo, após a redução temos

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu_y)^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (a.x_i - a.\mu_x)^2 = a^2 \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 = a^2.\sigma_x^2.$$

Como  $a^2 = 0,49$ , ocorreu uma redução de 51% na variância.

Para finalizar, os resultados acima nos permitem constatar que a afirmação III é verdadeira, pois, seja  $CV_x = \frac{\sqrt{\sigma_x^2}}{\mu_x}$  o coeficiente de variação dos salários antes da redução. Logo, após a redução temos

$$CV_y = \frac{\sqrt{\sigma_y^2}}{\mu_y} = \frac{\sqrt{a^2 \cdot \sigma_x^2}}{a \cdot \mu_x} = \frac{\sqrt{\sigma_x^2}}{\mu_x} = CV_x.$$

### Questão 3

Uma loja de aluguel de roupas mantém um histórico do número de roupas de festa alugadas nos últimos 80 dias, como mostrado abaixo:

Nº de roupas	Nº de dias
0 - 19	5
20 - 39	15
40 - 59	30
60 - 79	20
80 - 99	10
Total	80

Se o aluguel de cada roupa gera um lucro de R\$50,00 por dia, o lucro da loja nesse período de 80 dias será:

- (a) da ordem de R\$213.000,00
- (b) R\$4.260,00
- (c) Sem os valores individuais, não é possível fazer nenhuma aproximação para esse lucro
- (d) R\$4.000,00
- (e) acima de R\$251.000,00

*Solução:* Como o número de roupas é dado por intervalos, temos uma perda de informação em relação a uma tabela de frequência. Por outro lado, o uso desses intervalos podem simplificar a compreensão em situações com um número grande de valores de frequências. O cálculo do que pede o enunciado é feito utilizando o ponto médio dos intervalos. Assim, o número total de roupas vezes dias é aproximado por

$$Rpd = 9,50.5 + 29,50.15 + 49,50.30 + 69,50.20 + 89,50.10 = 4260,00 \text{roupa.dia.}$$

Do enunciado, sabemos que o aluguel é dado pela taxa  $t = R\$50,00 \frac{1}{\text{roupa.dia}}$ . Assim, o lucro total é dado por

$$Total = Rpd.t = 4260,00.50,00 = R\$213000,00.$$

Segue que (a) é a alternativa correta.

### Questão 4

Em Estatística, tomar decisões sobre a população baseando-se em informações de amostras é chamado: Escolha uma:


- (a) Estatística de amostras

- (b) Tomada de decisão estatística
- (c) Inferência probabilística
- (d) Tomada de decisão probabilística
- (e) Inferência estatística

*Solução:* A alternativa (e) é correta.

### Questão 5

é adequado ☐ é inadequado ☐ 0,8 ☐ -0,5 ☐ 0 ☐



Indique (arraste e solte) qual dos valores se aproxima mais do coeficiente de correlação de Pearson dos dados representados nos gráficos I a V e se o uso desse coeficiente para quantificar a associação é adequado ou inadequado em cada situação.

Observação: ao invés de mostrar as lacunas vazias (como está o exercício antes de ser resolvido), preferimos já posicionar as respostas em negrito como se vê abaixo.

*Solução:* .

No gráfico I, o coeficiente de correlação de Pearson é igual a **0,8** e seu uso para quantificar tal associação **é adequado** .

No gráfico II, o coeficiente de correlação de Pearson é igual a **0** e seu uso para quantificar tal associação **é inadequado** .

No gráfico III, o coeficiente de correlação de Pearson é igual a **-0,5** e seu uso para quantificar tal associação **é adequado** .

No gráfico IV, o coeficiente de correlação de Pearson é igual a **0,8** e seu uso para quantificar tal associação **é inadequado** .

No gráfico V, o coeficiente de correlação de Pearson é igual a **0,8** e seu uso para quantificar tal associação **é inadequado** .