

응결 및 강수의 형태

제5장

대기과학 및 실험 (2022)



박 기 현 (Kiehyun.Park@gmail.com)

과학영재학교 경기과학고등학교

2022년 10월 17일



구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

1 구름 형성

2 구름 분류

3 안개의 유형


4 강수는 어떻게 형성되는가

5 강수의 형태

6 강수 측정

7 계획적 및 비의도적 기상조절

공기의 포화



Q) 티끌이나 먼지를 함유하지 않은 매우 깨끗한 공기에서 상대습도가 100%에 도달해도 물방울이 만들어지지 않는다. 왜 그럴까?

물방울과 같이 표면이 휘어져 있으면 표면이
직선일 때보다 인접한 물 분자의 수가
줄어든다.

이것으로 인해 물 분자에 작용하는 인력이
줄어들고, 증발이 쉽게 일어난다.

Q) 구름 형성에 필요한 두 가지 중요한 요건은 무엇인가?

Q) 구름 응결핵의 주된 공급원은 무엇인가?

구름 형성

구름 분류

안개의 유형


강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

컬러 곡선




- 곡률 효과만 고려할 때 (켈빈 방정식): 크기가 작은 물방울이 쉽게 증발하므로 작은 물방울이 큰 물방울로 성장하기 어렵다 (물방울의 성장 억제)
- 용질 효과만 고려할 때 (라울의 법칙): 응결핵에 의해 순수하지 않은 상태가 되면 포화 수증기압의 감소로 큰 물방울로 성장하기 쉬워짐 (물방울의 성장 촉진)

Q) 흡습성이 좋거나, 용해성이 좋은 에어로솔은 어떻게 응결 현상을 돋는가?

구름 방울의 성장

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태
강수 측정
계획적 및 비의도적 기상조절



- 초기에는 구름 방울이 응결 과정에 의해 빠르게 성장하나, 가용 수증기가 금새 소진되어 성장 속도가 느려짐.
- 물방울의 반경이 $20 \mu\text{m}$ 이하인 구름 방울이 형성됨.
- 큰 빗방울이 만들어지려면 구름 방울의 성장하는 과정이 필요함.



구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

1 구름 형성

2 구름 분류

3 안개의 유형

4 강수는 어떻게 형성되는가

5 강수의 형태

6 강수 측정

7 계획적 및 비의도적 기상조절



구름의 분류

구름 형성

구름 분류


안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절



▲ SmartFigure 5.1 Classification of clouds based on form and height

구름의 분류

구름 형성

구름 분류


안개의 유형

강수는 어떻게 형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절



- 영국의 박물학자 Luke Howard가 구름의 형태와 고도에 따라 분류
- 형태에 따라
 - 권운(cirrus): 높고 희며 얇다. 종종 깃털모양,
 - 적운(cumulus): 둥글고 개개의 구름 덩어리로 구성,
 - 층운(stratus): 훌이불 또는 층을 이루는 구름
 - 난운(nimbus): 강수를 생산하는 구름의 이름을 뜻함
- 모든 구름은 세 가지 기본 형태 중 하나를 반드시 가지며, 2가지의 결합체인 경우도 존재. 예를 들어 '층적운', '권적운', '권층운'과 같은 것.
- 고도에 따라
 - 상층운(6 km 이상), 중층운(2 ~ 6 km), 하층운(2 km 이하)으로 분류
- 연직 발달운(clouds of vertical development)은 하나의 고도 범위를 벗어나 연직으로 확장된 구름
- 해당 고도는 계절이나 위도에 따라 변할 수 있는데, 예를 들어 고위도의 겨울에는 상층운이 더 낮은 고도에 나타난다.



구름의 종류

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

Table 5.1 | Basic Cloud Types

Cloud Family and Height	Cloud Type	Characteristics
High clouds—above 6000 m (20,000 ft)	Cirrus (Ci)	Thin, delicate, fibrous, ice-crystal clouds. Sometimes appear as hooked filaments called "mares' tails" or cirrus uncinus (Figure 5.2A).
	Cirrostratus (Cs)	Thin sheet of white, ice-crystal clouds that may give the sky a milky look. Sometimes produce halos around the Sun and Moon (Figure 5.2C).
	Cirrocumulus (Cc)	Thin, white, ice-crystal clouds. In the form of ripples or waves, or globular masses all in a row. May produce a "mackerel sky." Least common of high clouds (Figure 5.2B).
Middle clouds—2000–6000 m (6500–20,000 ft)	Altocumulus (Ac)	White to gray clouds, often made up of separate globules; "sheepback" clouds (Figure 5.3A).
	Altostratus (As)	Stratified veil of clouds that is generally thin and may produce very light precipitation. When thin, the Sun or Moon may be visible as a "bright spot," but no halos are produced (Figure 5.3B).
Low clouds—below 2000 m (6500 ft)	Stratus (St)	Low uniform layer resembling fog but not resting on the ground. May produce drizzle.
	Stratocumulus (Sc)	Soft, gray clouds in globular patches or rolls. Rolls may join together to make a continuous cloud (Figure 5.4).
	Nimbostratus (Ns)	Amorphous layer of dark gray clouds. One of the primary precipitation-producing clouds (Figure 5.5).
Clouds of vertical development	Cumulus (Cu)	Dense, billowy clouds often characterized by flat bases. May occur as isolated clouds or closely packed (Figure 5.6).
	Cumulonimbus (Cb)	Towering cloud, sometimes spreading out on top to form an "anvil head." Associated with heavy rainfall, thunder, lightning, hail, and tornadoes (Figure 5.7).

상층운

낮은 기온과 적은 양의 수증기 때문에 얇고 희며, 얼음 결정으로 구성

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절



권운: 가는 실 같은 얼음으로 구성된 구름



권적운: 작은 공 모양의 덩어리가 뭉치거나 떨어지거나
하는 형태. 물고기 비늘과 유사

상층운

낮은 기온과 적은 양의 수증기 때문에 얇고 희며, 얼음 결정으로 구성



C.

▲ Figure 5.2 Three basic cloud types make up the family of high clouds A. Cirrus B. Cirrocumulus C. Cirrostratus.

권층운: 햇무리 달무리 만들때 잘 나타남. 때로는 너무 얇고 투명하여 식별하기 어려움.

중층운



A.

▲ **Figure 5.3 Clouds found in the middle-altitude range** A. Altocumulus tend to form in patches composed of rolls or rounded masses.
B. Altostratus occur as grayish sheets covering a large portion of the sky. When visible, the Sun appears as a bright spot through these clouds.



B.

고적운: 둥근 덩어리나 두루마리 형태의 큰 조각으로 형성. 보통 물방울로 이루어져 구름의 윤곽이 뚜렷함.

고층운: 하늘의 많은 부분을 덮는 무정형의 회색 구름 층. 이슬비 형태 강수 동반하기도 함.

하층운

구름 형성

구름 분류

안개의 유형


강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

▼ **Figure 5.4 Stratocumulus clouds commonly form over midlatitude oceans** Satellite view of a large bank of stratocumulus clouds over the Pacific Ocean just south of San Diego, California.



▲ **Figure 5.5 Nimbostratus clouds are significant precipitation producers** These dark gray layers often exhibit a ragged-appearing base.

층적운: 길고 평행한 두루마리 혹은 부서진 공 모양으로 고적운과 유사하나 덩어리가 더 크게 부서진 조각임.

난층운: 지속적인 강수와 낮은 시정거리. 공기가 전선을 따라 강제 상승할 때처럼 안정한 조건에서 형성.

연직 발달운

▼ **Figure 5.6 Cumulus clouds, often called "fair-weather cloud"**
These small, white, billowy clouds generally form on sunny days.



적운: 둥근 지붕이나 탑으로 발달하는 독립적 인 덩어리. 맑은날 비균등 지표 가열로 인해 공기가 상승응결 고도 위로 상승할 때 형성

적란운: 크고 짙으며 부풀어 오른 모양. 거대한 탑 형태로 확장. 가끔 번개, 우박, 토네이도를 동반한 강한 비를 내리게 함.

다양한 구름들

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가


강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절



A.



B.

▲ Figure 5.8 Lenticular clouds A. These lens-shaped clouds are relatively common in mountainous areas. B. This diagram depicts the

Q) 렌즈운(Lenticular clouds)이 형성되는 원리를 설명하시오.



구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

1 구름 형성

2 구름 분류

3 안개의 유형

4 강수는 어떻게 형성되는가

5 강수의 형태

6 강수 측정

7 계획적 및 비의도적 기상조절

안개

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

구름과 안개는 생성되는 과정에 약간 차이가 있는데요. 구름은 공기의 상승 운동이 있어야 만들어집니다. '공기 상승 → 단열 팽창 → 온도 하강 → 이슬점 → 수증기 응결' 과정을 거치지요.



반면 **안개**는 바람이 세지 않고(3m/s 이하), 지표면 부근의 공기가 안정된 상태여야 합니다. 해가 뜨기 시작하면 지표면이 가열돼 공기의 순환이 활발해지기 때문에, 주로 공기의 움직임이 적은 밤이나 아침에 발생합니다.



Q) 구름과 안개의 차이점을 논하라.



안개의 종류

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

Table 5.2 | Basic Fog Types

Fog Groups	Fog Types	Mode of Formation and Characteristics
Fogs formed by cooling	Radiation fog	A nighttime phenomenon generated by radiation cooling of the ground and adjacent air. Usually forms in valleys with the surrounding hills fog free.
	Advection fog	Forms when warm, moist air flows over a cold surface and is chilled from below. Often a wintertime phenomenon in the Midwest, forming when warm Gulf air flows inland or when moist air flows over a cool ocean current.
	Upslope fog	When air flows up a mountain slope, or sometimes a gradually sloping landform, it expands and cools adiabatically.
Fogs formed by the addition of water vapor	Steam fog	When cool air moves over warm water, enough moisture may evaporate from the water surface to saturate the air above. Common on autumn mornings when the air is cool and the water in lakes or streams is still relatively warm.
	Frontal (precipitation) fog	Forms when raindrops falling from warm air above a frontal surface evaporate into the cooler air below and causes saturation. A wintertime phenomenon that produces cool damp days.

- 냉각에 의해 형성되는 안개(fogs formed by cooling)
- 증발에 의해 형성되는 안개(fogs formed by the addition of water vapor)

복사 안개(radiation fog)

구름 형성
구름 분류
안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절



A.



B.

- 지표 및 지표 부근 공기의 복사 냉각으로 형성.
- 맑고 상대습도가 높은 밤에 발생.
- 안개가 포함된 공기는 상대적으로 차갑고 밀도가 높아서 구릉성 지형에서 경사면을 따라 하강. 결국 골짜기에서 복사 안개가 가장 짙으며, 주변 산에서는 맑다.

이류 안개(advection fog)

구름 형성

구를 분류

안개의 유희

강수는 어떻게 형성되는가

간수의 혁태

가스 충전

계획적 및 비의도적 기상조절



- 고온 다습한 공기가 차가운 표면과 접촉하면 차가운 표면에 의해 생성된 차가운 공기와 섞이면서 대부분이 냉각되어 형성.
 - ex) 금문교 근처의 이류 안개

활승 안개(upslope fog)

구름 형성
구름 분류
안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가


강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절



- 습윤한 공기가 완만하게 경사진 평원을 따라 이동하거나 가파른 산의 경사면을 따라 상승할 경우에 생성.
- 상승에 의해 단열 팽창하면서 형성됨



김 안개(steam fog)

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정


계획적 및
비의도적
기상조절



▲ Figure 5.11 Steam fog occurs in the fall when cool air flows over a comparatively warm water body This image shows steam fog rising from Sierra Blanca Lake, Arizona.

- 차가운 공기가 따뜻한 수면 위로 이동하면 충분한 양의 수분이 수면에서 증발하여 수면 바로 위의 공기를 포화시킴.
- 맑고 선선한 가을아침 호수와 강에서 많이 발생
- 증발 안개, 물 안개 라고도 함.

전선 안개(frontal fog) 또는 강수 안개(precipitation fog)



- 따뜻한 공기가 차가운 공기 위로 이동하면서 비가 내리고 아래의 차가운 공기가 거의 포화상태에서 내린 비가 증발하여 안개를 형성할 수 있다.

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

안개 발생

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절



Q) 태평양 연안에서 짙은 안개가 상대적으로 자주 발생하는 이유는 무엇인가?

Q) 복사 안개가 상승한다고 할 때, 실제로 어떤 현상이 일어나는가?



안개 지도

구름 형성

구름 분류


안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절





구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

1 구름 형성

2 구름 분류

3 안개의 유형

4 강수는 어떻게 형성되는가

5 강수의 형태

6 강수 측정

7 계획적 및 비의도적 기상조절

강수 형성

구름 형성

구름 분류


안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절



Q) 구름 입자와 빗방울의 지름은 100배 정도 차이
가 난다. 이것이 의미하는 바는 무엇인가?


빙정설(베르예론 과정, Bergeron)

구름 형성
구름 분류
안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태
강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절



▲ Figure 5.14 Nature of the particles that are found in towering cumulonimbus clouds

한랭 구름(cold cloud)에는

-40°C 미만: 완전히 얼음 결정

-40°C ~ -15°C: 과냉각 물방울, 얼음 공존

-15°C ~ 0°C: 대부분 과냉각 물방울

- 과냉각 수: 공기 중의 순수한 물은 -40°C에 이르기 전에 얼지 않음. 0°C 아래의 액체 상태의 물을 과냉각수라고 부름
- 결빙핵: 과냉각 물방울과 접촉하여 얼게 만드는 고체 입자로 얼음 결정과 비슷한 모양을 가진다. 대기 중 희박하게 존재

빙정설(베르예론 과정, Bergeron)

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가

강수의 형태
강수 측정
계획적 및 비의도적 기상조절




Table 5.3 Relative Humidity with Respect to Ice When Relative Humidity with Respect to Water Is 100 Percent

Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	Relative Humidity with Respect To:	
	Water	Ice
0	100%	100%
-5	100%	105%
-10	100%	110%
-15	100%	115%
-20	100%	121%

- 얼음 결정이 액체 물방울보다 결속이 더 강하기 때문에 각 면에서 출입하는 물분자의 수는 얼음이 과냉각수보다 적음.
- 과냉각 물방울보다 얼음 결정 위에서 포화수증기압이 더 낮음. (-12°C 부근에서 차이가 가장 큼)

빙정설(베르예론 과정, Bergeron)

구름 형성
구름 분류
안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절




Figure 5.15 The Bergeron process. Ice crystals grow at the expense of cloud droplets until they are large enough to fall. The size of these particles has been greatly exaggerated.

- 과냉각 물방울과 빙정의 포화수증기압 차이로 인해 물방울 근처 수증기가 빙정 근처로 이동.
- 과냉각 물방울의 수증기압을 낮추므로 물방울면에서는 불포화, 빙정면에서는 과포화 상태.
- 이에 따라 물방울에서 증발한 수증기가 빙정에 승화하여 빙정이 성장하게 됨. (침적(deposition))
- 침적에 의해 어느 정도 크기인 빙정 또는 과냉각 물방울과 충돌하여 빨리 성장함 (부착(aggregation))
- 즉, 빙정이 충분히 커지면 중력에 의해 지표 방향으로 낙하.
- 부숴지면 새로운 결빙핵이 되어 연쇄 반응에 의해 많은 눈결정이 형성되며, 이러한 눈결정이 뭉쳐져서 눈송이와 같은 더 큰 덩어리가 됨.



종단 속도

구름 형성
구름 분류
안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태
강수 측정
계획적 및
비의도적
기상조절

Table 5.4 | Fall Velocity of Water Drops

Types	Diameter (millimeters)	Fall Velocity	
		(km/hr)	(mi/hr)
Small cloud droplets	0.01	0.01	0.006
Typical cloud droplets	0.02	0.04	0.03
Large cloud droplets	0.05	0.3	0.2
Drizzle droplets	0.5	7	4
Typical rain drops	2.0	23	14
Large rain drops	5.0	33	20

Data from Smithsonian Meteorological Tables.


- 비가 내리기 위해서는 충돌 과정 또는 병합 과정을 통한 성장이 필요
- 물방울의 반경이 $20 \mu\text{m}$ 보다 큰 구름 방울이 있어야 충돌 과정 또는 병합 과정에 의해 빗방울 형성 가능.
- 종단 속도는 물체가 낙하할 때 최대 속도이며, 공기 저항과 중력의 크기가 같을 때 생기는 속도임.
- 큰 물방울의 종단 속도가 작은 물방울의 종단 속도보다 크기 때문에 더 빨리 떨어지므로 충돌 및 병합이 발생함.

충돌 병합

구름 형성
구름 분류
안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가


강수의 형태
강수 측정
계획적 및
비의도적
기상조절




A. Because large cloud droplets fall more rapidly than smaller droplets, they are able to sweep up the smaller ones in their path and grow.



C. As the raindrop approaches 4 millimeters in size, it develops a depression in the bottom.



B. As drops increase in size, their fall velocity increases, resulting in increased air resistance, which causes the raindrop to flatten.



D. Finally, when the diameter exceeds about 5 millimeter, the depression grows upward almost explosively, forming donut-like ring of water that immediately breaks into smaller drops.

- 온난 구름은 구름 꼭대기의 온도가 $-15^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 보다 높아 빙정이 없다.
- 큰 구름 방울들이 낙하 속도가 빨라 작은 구름 방울을 낚아채 커진다.
- 커진 구름 방울은 낙하 속도가 증가하고 그 결과 공기 저항도 증가하여 빗방울이 편평해 진다.
- 빗방울이 4 mm에 이르면 바닥에 저압부가 발달한다.
- 빗방울이 지름 5 mm를 초과하면 저기압이 폭발적으로 위로 성장해서 금새 작은 물방울로 부서지는 도넛 모양의 물의 링을 형성한다.



충돌 병합

Q) 충돌-병합 과정이 Bergeron 과정과 다른 점은 무엇인가?

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

**Q) 중위도에서는 충돌-병합과정이 Bergeron 과정과 협력하여 대형
적란운에 의한 강수를 설명할 수 있다. 어떤 과정으로 강수를 설명
하는가?**



구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

1 구름 형성

2 구름 분류

3 안개의 유형

4 강수는 어떻게 형성되는가


5 강수의 형태

6 강수 측정

7 계획적 및 비의도적 기상조절

비, 눈

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태
강수 측정
계획적 및 비의도적 기상조절



비: 상층은 영하지만, 하강할수록 온도가 상승하여 지표면 근처 상공부터 지표면까지 온도가 영상인 경우에 해당

이슬비: 지름이 0.5 mm 미만인 빗방울

박무(mist): 지면에 닿을 수 있는 매우 작은 물방울을 포함한 강수(안개와 유사)

눈: 눈은 얼음 결정 집합체 형태의 겨울 강수의 한 종류

싸락눈(graupe): 낙하하는 눈 결정들이 과냉각 구름방울을 포획하여 성장한 결과(결착) 고유의 육면체 눈 결정 모양을 알아볼 수 없는 경우



꼬리 구름

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태
강수 측정
계획적 및 비의도적 기상조절



Q) 꼬리 구름은 무엇이며 어떤 조건에서 형성되는가?

진눈개비, 언 비

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절




Figure 5.17 Four precipitation types and their temperature profiles

진눈개비(sleet): 눈이 낙하하면서 영상인 기층을 통과하여 녹았다가, 지표에 도달하기 전에 다시 영하층을 통과하여 얼게 되면서 얼음싸라기로 지면에 도달하는 것

언 비(freezing rain) 또는 비얼음(glaze): 눈이 낙하하면서 영상인 기층을 통과하여 녹았다가, 지표면에 도달하기 전에 다시 영하층을 통과하여 과냉각 물방울로 지면에 도달하여 지면의 물체와 접촉하는 순간 얼음으로 변화하는 것



강수 형태


구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태
강수 측정
계획적 및 비의도적 기상조절

Table 5.5 | Types of Precipitation

Type	Approximate Size	State of Water	Description
Mist	0.005–0.05 mm	Liquid	Droplets large enough to be felt on the face when air is moving 1 meter/second. Associated with stratus clouds.
Drizzle	0.05–0.5 mm	Liquid	Small, uniform droplets that fall from stratus clouds, generally for several hours.
Rain	0.5–5 mm	Liquid	Generally produced by nimbostratus or cumulonimbus clouds. When heavy, size can be highly variable from one place to another.
Sleet	0.5–5 mm	Solid	Small, spherical to lumpy ice particles that form when raindrops freeze while falling through a layer of subfreezing air. Because the ice particles are small, any damage is generally minor. Sleet can make travel hazardous.
Freezing Rain (glaze)	Layers 1 mm–2 cm thick	Solid	Produced when supercooled raindrops freeze on contact with solid objects. Freezing rain can form a thick coating of ice that has sufficient weight to seriously damage trees and power lines.
Rime	Variable accumulations	Solid	Deposits usually consisting of ice feathers that point into the wind. These delicate frostlike accumulations form as supercooled cloud or fog droplets encounter objects and freeze on contact.
Snow	1 mm–2 cm	Solid	The crystalline nature of snow allows it to assume many shapes, including six-sided crystals, plates, and needles. Produced in supercooled clouds where water vapor is deposited as ice crystals that remain frozen during their descent.
Hail	5–10 cm or larger	Solid	Precipitation in the form of hard, rounded pellets or irregular lumps of ice. Produced in large convective cumulonimbus clouds, where frozen ice particles and supercooled water coexist.
Graupel	2–5 mm	Solid	"Soft hail" that forms as rime collects on snow crystals to produce irregular masses of "soft" ice. Because these particles are softer than hailstones, they normally flatten out upon impact.

진눈개비와 언비의 형성

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태
강수 측정
계획적 및 비의도적 기상조절



▲ Figure 5.20 Formation of sleet and freezing rain When rain passes through a cold layer of air and freezes, the resulting ice pellets are called sleet. Freezing rain forms under similar conditions, except the cold layer of air is not deep enough to refreeze the raindrops. These forms of precipitation occur often in the winter, when warm air (along a warm front) is forced over a layer of subfreezing air.

- 눈이 낙하하면서 겪는 주위 기온이 영하일 경우 지상에서 눈으로 내릴 수 있으나,
- 낙하하면서 겪는 기온과 해당 경로의 길이에 따라 지상에서 강수의 형태는 달라진다.

진눈개비와 비얼음

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절




Figure 5.21 Freezing rain results when supercooled raindrops freeze on contact with objects. In January 1998, an ice storm of epic proportions caused enormous damage in New England and southeastern Canada. Nearly 5 days of freezing rain (glaze) caused

Q) 진눈깨비와 비얼음이 무엇인지 설명하라. 두 형태의 강수가 형성되는 조건은 어떻게 다른가?


눈 결정

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태

강수 측정
계획적 및 비의도적 기상조절



Q) 눈 결정 모양이 육각형 구조를 하는 이유는 무엇인가?




Q) 눈 결정 모양에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?

우박

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태

강수 측정
계획적 및
비의도적
기상조절



<http://goo.gl/a34bP>

▲ SmartFigure 5.22 Formation of hailstones

A. Hailstones begin as small ice pellets that grow through the addition of supercooled water droplets as they move through a cloud. Updrafts carry stones upward, increasing the size of the hail by adding layers of ice. Eventually, the hailstones grow too large to be supported by the updraft, or encounter a downdraft. B. This cut hailstone, which fell over Coffeyville, Kansas, in 1970, originally weighed 0.75 kilogram (1.67 pounds).

Q) 우박은 어떻게 형성되고 어떤 요소가 우박의 최종 크기를 결정하는가?

상고대

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태
강수 측정
계획적 및 비의도적 기상조절

Q) 상고대는 무엇이며, 어떤 경우에 형성되는가?



▲ **Figure 5.25 Rime consists of delicate ice crystals** Rime forms when supercooled fog or cloud droplets freeze on contact with objects.



구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

1 구름 형성

2 구름 분류

3 안개의 유형

4 강수는 어떻게 형성되는가

5 강수의 형태

6 강수 측정

7 계획적 및 비의도적 기상조절

우량계

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태
강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절




Figure 5.26 Precipitation measurement **A.** The simplest gauge is any container left in the rain. **B.** The standard rain gauge increases the height of water collected by a factor of 10, allowing for accurate rainfall measurement to the nearest 0.025 centimeter (0.01 inch). Because the cross-sectional area of the measuring tube is only one-tenth as large as the collector, rainfall is magnified 10 times. **C.** The tipping-bucket rain gauge

Q) 뚜껑이 없는 통이 우량계를 대신 할 수 있지만 표준 우량계를 더 많이 쓴다. 표준 우량계를 사용할 때의 이점은 무엇인가?



우량계

Q) 표준 우량계 외에 사용하는 강수 측정 도구는 무엇인지 설명하시오.

Q) 강수량의 측정을 부정확하게 하는 요소는 무엇인가?

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태


강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

전지구 강수 관측 (Global Precipitation Measurement)

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태
강수 측정


계획적 및
비의도적
기상조절



- Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) : 열대지역과 아열대지역의 강수를 측정하기 위해 1997년에 그 임무를 시작
- Global Precipitation Measurement(GPM) : 인공위성 자료를 이용하는 강수량 추정에는 일반적으로 적외선, 마이크로파가 사용된다.
적외선 방법은 구름층을 통과할 수 없기 때문에 운정 온도, 구름의 면적, 형태 등의 여러 특성을 이용하는 간접적인 강수 추정방법 (정지 위성, 시간적인 분해능이 탁월)
마이크로파 방법은 마이크로파가 강수층을 통과할 때 강수 입자에 의해 산란되거나, 또는 강수층에서 방출되는 성질을 이용하는 직접적인 강수 추정 방법(극궤도 위성, 하루에 2회 정도의 관측)

기상 레이다(Doppler radar)

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태
강수 측정
계획적 및 비의도적 기상조절



▲ Figure 5.27 Doppler radar display produced by the National Weather Service. Colors indicate different intensities of precipitation. Note the band of heavy precipitation along the eastern seaboard.

기상 레이다는 발신기로 짧은 펄스 신호를 송출한 후 반사되는 신호를 이용하여 물체를 감지한다. 강수를 감지하기 위해서 3 ~ 10 nm의 파장이 이용된다.

Q) 기상 레이다의 장점과 단점은 무엇인가?




기상 레이다(weather radar)

- 구름 형성
- 구름 분류
- 안개의 유형
- 강수는 어떻게 형성되는가
- 강수의 형태
- 강수 측정
- 계획적 및 비의도적 기상조절



Q) 우리나라에 기상 레이더는 몇 기가 설치되어 있는가?





구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절

1 구름 형성

2 구름 분류

3 안개의 유형

4 강수는 어떻게 형성되는가

5 강수의 형태

6 강수 측정

7 계획적 및 비의도적 기상조절

구름 씨뿌리기

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태
강수 측정
계획적 및 비의도적 기상조절



▲ Figure 5.28 Cloud seeding Cessna aircraft equipped with silver iodide flares to supply freezing nuclei to supercooled clouds in order to trigger precipitation.

Q) 구름 씨뿌리기가 성공하기 위해서는 특정 기상 조건이 만족되어야 한다. 그 기상 조건은 무엇인가?

Q) 과냉각 구름에 대한 씨뿌리기에 아이오딘화 은 결정이 사용되는 이유는?

우박 억제

구름 형성
구름 분류
안개의 유형
강수는 어떻게 형성되는가
강수의 형태
강수 측정
계획적 및 비의도적 기상조절



▲ Figure 5.29 Hail damage to a soybean field north of Sioux Falls, South Dakota

Q) 우박 억제에 대한 현대적 시도는 무엇인가?

서리 방지

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절



▲ Figure 5.30 Two common frost-prevention methods

A. Sprinklers distribute water, which releases latent heat as it freezes on citrus. B. Wind machines mix warmer air aloft with cooler surface air.

Q) 과수원 난로(orchard heater), 스프링 클러 및 공기 혼합이 서리 방지에 어떻게 이용되는지 서술하라.

비행운

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게 형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및 비의도적 기상조절



Q) 비행운은 어떠한 경우 형성되며 비행운이 기후에 미치는 영향은 무엇인가?

▲ **Figure 5.32 Inadvertent increase in cloud cover** This photograph taken through the window of the International Space Station, shows contrails over the Rhone Valley in eastern France. It is estimated that these "artificial clouds" cover 0.1 percent of the planet's surface, and the percentages are far higher in places such as southern California and some parts of Europe, as illustrated here.



도시 효과

Q) 도시 및 도시의 풍하 쪽에서 많은 강수를 생성하는 데
기여하는 세 가지 요소는 무엇인가?

구름 형성

구름 분류

안개의 유형

강수는 어떻게
형성되는가

강수의 형태

강수 측정

계획적 및
비의도적
기상조절