

# 第 6 章 计算机的运算方法

6.1 无符号数和有符号数

6.2 数的定点表示和浮点表示

6.3 定点运算

6.4 浮点四则运算

6.5 算术逻辑单元



# 6.1 无符号数和有符号数

## 一、无符号数

寄存器的位数

反映无符号数的表示范围



8 位

0 ~ 255



16 位

0 ~ 65535

**n位无符号数表示范围 $0 \sim 2^n - 1$**

# 寄存器和存储器

- 算术运算指令使用寄存器，复杂数据（数组、结构体等）使用存储器
- 寄存器比存储器访问速度快
- 对存储器数据的操作需要加载（load）和存储（store）
  - 需要执行更多的指令
- 编译器必须对变量尽可能使用寄存器
  - 只有对最近使用少的变量才放到存储器中
  - 寄存器的优化很重要！

## 二、有符号数

### 6.1

#### 1. 机器数与真值

真值

带符号的数

+ 0.1011

- 0.1011

+ 1100

- 1100

机器数

符号数字化的数

0 | 1011

↑ 小数点的位置

1 | 1011

↑ 小数点的位置

0 | 1100

↑ 小数点的位置

1 | 1100

↑ 小数点的位置

## 2. 原码表示法


6.1

### (1) 定义

整数

$$[x]_{\text{原}} = \begin{cases} 0, x & 2^n > x \geq 0 \\ 2^n - x & 0 \geq x > -2^n \end{cases}$$

$x$  为真值       $n$  为整数的位数



带符号的绝对值表示

# 小数

## 6.1

$$[x]_{\text{原}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ 1 - x & 0 \geq x > -1 \end{cases}$$

$x$  为真值

如  $x = +0.1101$        $[x]_{\text{原}} = 0.1101$       用 **小数点** 将符号位和数值部分隔开

$x = -0.1101$        $[x]_{\text{原}} = 1 - (-0.1101) = 1.1101$

$x = +0.1000000$        $[x]_{\text{原}} = 0.1000000$       用 **小数点** 将符号位和数值部分隔开

$x = -0.1000000$        $[x]_{\text{原}} = 1 - (-0.1000000) = 1.1000000$

## (2) 举例

6.1

例 6.1 已知  $[x]_{\text{原}} = 1.0011$  求  $x - 0.0011$

解：由定义得

$$x = 1 - [x]_{\text{原}} = 1 - 1.0011 = -0.0011$$

例 6.2 已知  $[x]_{\text{原}} = 1,1100$  求  $x - 1100$

解：由定义得

$$x = 2^4 - [x]_{\text{原}} = 10000 - 1,1100 = -1100$$

例 6.3 已知  $[x]_{\text{原}} = 0.1101$  求  $x$

解: 根据定义  $\because [x]_{\text{原}} = 0.1101$

$$\therefore x = +0.1101$$

例 6.4 求  $x = 0$  的原码

解: 设  $x = +0.0000$   $[+0.0000]_{\text{原}} = 0.0000$

$x = -0.0000$   $[-0.0000]_{\text{原}} = 1.0000$

同理, 对于整数  $[+0]_{\text{原}} = 0,0000$

$[-0]_{\text{原}} = 1,0000$

$$\therefore [+0]_{\text{原}} \neq [-0]_{\text{原}}$$



# 原码的特点：简单、直观

## 6.1

但是用原码作加法时，会出现如下问题：

要求	数1	数2	实际操作	结果符号
加法	正	正	加	正
加法	正	负	减	可正可负
加法	负	正	减	可正可负
加法	负	负	加	负

能否 只作加法？

找到一个与负数等价的正数 来代替这个负数  
就可使 减  $\longrightarrow$  加



# 3. 补码表示法

## (1) 补的概念

### • 时钟

逆时针

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 3 \\ \hline 3 \end{array}$$

顺时针

$$\begin{array}{r} 6 \\ + 9 \\ \hline 15 \\ - 12 \\ \hline 3 \end{array}$$

可见  $-3$  可用  $+9$  代替 减法  $\rightarrow$  加法  
称  $+9$  是  $-3$  以  $12$  为模的 补数

记作  $-3 \equiv +9 \pmod{12}$

同理  $-4 \equiv +8 \pmod{12}$

$-5 \equiv +7 \pmod{12}$

时钟以  
12为模

# 结论

## 6.1

- 一个负数加上“模”即得该负数的补数
- 一个正数和一个负数互为补数时  
它们绝对值之和即为模数

• 计数器（模 16）  $1011 \longrightarrow 0000$  ?

$$\begin{array}{r} 1011 \\ - 1011 \\ \hline 0000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 0101 \\ \hline 10000 \end{array}$$

自然去掉

可见  $-1011$  可用  $+0101$  代替

记作  $-1011 \equiv +0101 \pmod{2^4}$

同理  $-011 \equiv +101 \pmod{2^3}$

$-0.1001 \equiv +1.0111 \pmod{2}$

# 6.1

$$\boxed{-1011 \equiv +0101 \pmod{2^4}}$$

**+ 10000**

**+ 0101**

**+ 10000**

**+ 10101**

$$\therefore +0101 \equiv +0101$$

**(mod 2<sup>4</sup>)**

丢掉

可见  $+0101 \xrightarrow{2} +0101$

01 ? + 0101  
└─→ - 1011

**? 0,0101  $\rightarrow$  + 0101**

**? 1,0101  $\rightarrow$  - 1011**

$$2^{4+1} - 1011 = 100000$$

– 1011

# 1,0101

 $(\text{mod } 2^{4+1})$ 

用 **逗号** 将符号位和数值部分隔开

### (3) 补码定义

6.1

整数

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} 0, x & 2^n > x \geq 0 \\ 2^{n+1} + x & 0 > x \geq -2^n \pmod{2^{n+1}} \end{cases}$$

$x$  为真值

$n$  为整数的位数

如

$$x = +1010$$

$$x = -1011000$$

$$[x]_{\text{补}} = 0,1010$$

$$\begin{aligned} [x]_{\text{补}} &= 2^{7+1} + (-1011000) \\ &= 100000000 \\ &\quad - 1011000 \\ &\hline &1,0101000 \end{aligned}$$

用 逗号 将符号位  
和数值部分隔开

1,0101000

# 小数

## 6.1

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ 2 + x & 0 > x \geq -1 \pmod{2} \end{cases}$$

$x$  为真值

如  $x = +0.1110$

$$[x]_{\text{补}} = 0.1110$$

用 小数点 将符号位  
和数值部分隔开

$x = -0.1100000$

$$\begin{aligned} [x]_{\text{补}} &= 2 + (-0.1100000) \\ &= 10.0000000 \\ &\quad - 0.1100000 \\ \hline &1.0100000 \end{aligned}$$

## (4) 求补码的快捷方式

6.1

设  $x = -1010$  时

$$\begin{aligned} \text{则 } [x]_{\text{补}} &= 2^{4+1} - 1010 &= 11111 + 1 - 1010 \\ &= 100000 &= 11111 + 1 \\ &\quad - 1010 &\quad - 1010 \\ \hline &= 1,0110 &\quad \boxed{10101} + 1 \\ & &= 1,0110 \end{aligned}$$

$$\text{又 } [x]_{\text{原}} = \boxed{1,1010}$$

当真值为负时，补码可用原码除符号位外  
每位取反，末位加1求得

## (5) 举例

6.1

例 6.5 已知  $[x]_{\text{补}} = 0.0001$

求  $x$

解：由定义得  $x = +0.0001$

例 6.6 已知  $[x]_{\text{补}} = 1.0001$

求  $x$

解：由定义得

$$\begin{aligned} x &= [x]_{\text{补}} - 2 \\ &= 1.0001 - 10.0000 \\ &= -0.1111 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [x]_{\text{补}} &\xrightarrow{?} [x]_{\text{原}} \\ [x]_{\text{原}} &= 1.1111 \\ \therefore x &= -0.1111 \end{aligned}$$





例 6.7 已知  $[x]_{\text{补}} = 1,1110$

6.1

求  $x$

解：由定义得

$$\begin{aligned}x &= [x]_{\text{补}} - 2^{4+1} \\&= 1,1110 - 100000 \\&= -0010\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}[x]_{\text{补}} &\xrightarrow{?} [x]_{\text{原}} \\[x]_{\text{原}} &= 1,0010 \\ \therefore x &= -0010\end{aligned}$$

当真值为负时，原码可用补码除符号位外  
每位取反，末位加1求得



# 练习 求下列真值的补码

6.1

真值	$[x]_{\text{补}}$	$[x]_{\text{原}}$
$x = +70 = 1000110$	0, 1000110	0, 1000110
$x = -70 = -1000110$	1, 0111010	1, 1000110
$x = 0.1110$	0.1110	0.1110
$x = -0.1110$	1.0010	1.1110
$x = \boxed{0.0000} [+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}}$	$\boxed{0.0000}$	0.0000
$x = \boxed{-0.0000}$	$\boxed{0.0000}$	1.0000
$x = -1.0000$	1.0000	不能表示

由小数补码定义 
$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ 2 + x & 0 > x \geq -1 \pmod{2} \end{cases}$$

$$[-1]_{\text{补}} = 2 + x = 10.0000 - 1.0000 = 1.0000$$



## 4. 反码表示法

6.1

### (1) 定义

整数

$$[x]_{\text{反}} = \begin{cases} 0, & x > 0 \\ (2^{n+1} - 1) + x & 0 \geq x > -2^n \end{cases} \pmod{2^{n+1}}$$

$x$  为真值

$n$  为整数的位数

如  $x = +1101$

$$[x]_{\text{反}} = 0,1101$$



用逗号将符号位  
和数值部分隔开

$x = -1101$

$$\begin{aligned} [x]_{\text{反}} &= (2^{4+1} - 1) - 1101 \\ &= 11111 - 1101 \\ &= 1,0010 \end{aligned}$$



# 小数

## 6.1

$$[x]_{\text{反}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ (2 - 2^{-n}) + x & 0 \geq x > -1 \pmod{2 - 2^{-n}} \end{cases}$$

$x$  为真值       $n$  为小数的位数

如

$$x = +0.1101$$

$$x = -0.1010$$

$$[x]_{\text{反}} = 0.1101$$

$$[x]_{\text{反}} = (2 - 2^{-4}) - 0.1010$$

$$= 1.1111 - 0.1010$$

$$= 1.0101$$

用 小数点 将符号位

和数值部分隔开



## (2) 举例

6.1

例6.8 已知  $[x]_{\text{反}} = 0,1110$  求  $x$

解: 由定义得  $x = +1110$

例6.9 已知  $[x]_{\text{反}} = 1,1110$  求  $x$

解: 由定义得 
$$\begin{aligned} x &= [x]_{\text{反}} - (2^{4+1} - 1) \\ &= 1,1110 - 11111 \\ &= -0001 \end{aligned}$$

例 6.10 求 0 的反码

解: 设  $x = +0.0000$   $[+0.0000]_{\text{反}} = 0.0000$

$x = -0.0000$   $[-0.0000]_{\text{反}} = 1.1111$

同理, 对于整数  $[+0]_{\text{反}} = 0,0000$   $[-0]_{\text{反}} = 1,1111$

$\therefore [+0]_{\text{反}} \neq [-0]_{\text{反}}$



# 三种机器数的小结

- 最高位为符号位，书写上用 “,”（整数）或 “.”（小数）将数值部分和符号位隔开
- 对于正数，原码 = 补码 = 反码
- 对于负数，符号位为 1，其数值部分  
原码除符号位外每位取反末位加 1 → 补码  
原码除符号位外每位取反 → 反码

**例6.11** 设机器数字长为8位（其中1位为符号位）**6.1**  
 对于整数，当其分别代表无符号数、原码、补码和反码时，对应的真值范围各为多少？

二进制代码	无符号数 对应的真值	原码对应 的真值	补码对应 的真值	反码对应 的真值
00000000	0	+0	<b>±0</b>	+0
00000001	1	+1	+1	+1
00000010	2	+2	+2	+2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
01111111	127	+127	+127	+127
10000000	128	-0	<b>-128</b>	-127
10000001	129	-1	-127	-126
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
11111101	253	-125	-3	-2
11111110	254	-126	-2	-1
11111111	255	-127	-1	-0

例6.12 已知  $[y]_{\text{补}}$  求  $[-y]_{\text{补}}$ 

解： 设  $[y]_{\text{补}} = y_0 \cdot y_1 y_2 \cdots y_n$

<I>  $[y]_{\text{补}} = 0 \cdot y_1 y_2 \cdots y_n$

$[y]_{\text{补}}$  连同符号位在内， 每位取反， 末位加 1

即得  $[-y]_{\text{补}}$

$$[-y]_{\text{补}} = 1 \cdot \overline{y_1} \overline{y_2} \cdots \overline{y_n} + 2^{-n}$$

<II>  $[y]_{\text{补}} = 1 \cdot y_1 y_2 \cdots y_n$

$[y]_{\text{补}}$  连同符号位在内， 每位取反， 末位加 1

即得  $[-y]_{\text{补}}$

$$[-y]_{\text{补}} = 0 \cdot \overline{y_1} \overline{y_2} \cdots \overline{y_n} + 2^{-n}$$



## 5. 移码表示法

6.1

补码表示很难直接判断其真值大小

如	十进制	二进制	补码	
	$x = +21$	+10101	0,10101	错 大
	$x = -21$	-10101	1,01011	
	$x = +31$	+11111	0,11111	错 大
	$x = -31$	-11111	1,00001	

$x + 2^5$


$+10101 + 100000 = 110101$	大	正确
$-10101 + 100000 = 001011$		
$+11111 + 100000 = 111111$	大	正确
$-11111 + 100000 = 000001$		

# (1) 移码定义

$$[x]_{\text{移}} = 2^n + x \quad (2^n > x \geq -2^n)$$

$x$  为真值,  $n$  为 整数的位数

移码在数轴上的表示



如  $x = 10100$

$$[x]_{\text{移}} = 2^5 + 10100 = 1,10100$$

$$x = -10100$$

$$[x]_{\text{移}} = 2^5 - 10100 = 0,01100$$

用 逗号 将符号位  
和数值部分隔开

## (2) 移码和补码的比较

设  $x = +1100100$

$$[x]_{\text{移}} = 2^7 + 1100100 = \mathbf{1},1100100$$

$$[x]_{\text{补}} = \mathbf{0},1100100$$

设  $x = -1100100$

$$[x]_{\text{移}} = 2^7 - 1100100 = \mathbf{0},0011100$$

$$[x]_{\text{补}} = \mathbf{1},0011100$$

补码与移码只差一个符号位

### (3) 真值、补码和移码的对照表

6.1

真值 $x$ ( $n=5$ )	$[x]_{\text{补}}$	$[x]_{\text{移}}$	$[x]_{\text{移}}$ 对应的 十进制整数
-100000	100000	000000	0
- 11111	100001	000001	1
- 11110	100010	000010	2
⋮	⋮	⋮	⋮
- 00001	111111	011111	31
± 00000	000000	100000	32
+ 00001	000001	100001	33
+ 00010	000010	100010	34
⋮	⋮	⋮	⋮
+ 11110	011110	111110	62
+ 11111	011111	111111	63

## (4) 移码的特点

6.1

➤ 当  $x = 0$  时  $[+0]_{\text{移}} = 2^5 + 0 = 1,00000$

$$[-0]_{\text{移}} = 2^5 - 0 = 1,00000$$

$$\therefore [+0]_{\text{移}} = [-0]_{\text{移}}$$

➤ 当  $n = 5$  时 最小的真值为  $-2^5 = -100000$

$$[-100000]_{\text{移}} = 2^5 - 100000 = 000000$$

可见，最小真值的移码为全 0

用移码表示浮点数的阶码

能方便地判断浮点数的阶码大小



# 作业

- 习题： 6.3, 6.6, 6.10



## 6.2 数的定点表示和浮点表示

小数点按约定方式标出，不占用专门硬件

### 一、定点表示



或



定点机

小数定点机

整数定点机

原码

$-(1 - 2^{-n}) \sim +(1 - 2^{-n})$

$-(2^n - 1) \sim +(2^n - 1)$

补码

$-1 \sim +(1 - 2^{-n})$

$-2^n \sim +(2^n - 1)$

反码

$-(1 - 2^{-n}) \sim +(1 - 2^{-n})$

$-(2^n - 1) \sim +(2^n - 1)$



## 二、浮点表示

## 6.2

$N = S \times r^j$  浮点数的一般形式

$S$  尾数  $j$  阶码  $r$  基数（基值）

计算机中  $r$  取 2、4、8、16 等

当  $r = 2$

$$N = 11.0101$$

二进制表示

$$\checkmark = 0.110101 \times 2^{10}$$

规格化数

$$= 1.10101 \times 2^1$$

$$= 1101.01 \times 2^{-10}$$


$$\checkmark = 0.00110101 \times 2^{100}$$

计算机中  $S$  小数、可正可负

$j$  整数、可正可负



# 1. 浮点数的表示形式



$S_f$  代表浮点数的符号

$n$  其位数反映浮点数的精度

$m$  其位数反映浮点数的表示范围


$j_f$  和  $m$  共同表示小数点的实际位置

## 2. 浮点数的表示范围

6.2

上溢 阶码 > 最大阶码

下溢 阶码 < 最小阶码 按 机器零 处理



## 练习

## 6.2

设机器数字长为 24 位，欲表示  $\pm 3$  万的十进制数，试问在保证数的最大精度的前提下，除阶符、数符各取 1 位外，阶码、尾数各取几位？

解：  $\because 2^{14} = 16384 \quad 2^{15} = 32768$

$\therefore$  15 位二进制数可反映  $\pm 3$  万之间的十进制数

$$2^{15} \times 0.\underbrace{\times \times \times \dots \times \times \times}_{15\text{位}}$$

$m = 4, 5, 6, \dots$

满足最大精度 可取  $m = 4, n = 18$

### 3. 浮点数的规格化形式

$r = 2$  尾数最高位为 1

$r = 4$  尾数最高 2 位不全为 0

$r = 8$  尾数最高 3 位不全为 0

基数不同，浮点数的规格化形式不同

### 4. 浮点数的规格化

$r = 2$  左规 尾数左移 1 位，阶码减 1

右规 尾数右移 1 位，阶码加 1

$r = 4$  左规 尾数左移 2 位，阶码减 1

右规 尾数右移 2 位，阶码加 1

$r = 8$  左规 尾数左移 3 位，阶码减 1

右规 尾数右移 3 位，阶码加 1

基数  $r$  越大，可表示的浮点数的范围越大

基数  $r$  越大，浮点数的精度降低

例如：设  $m = 4$ ,  $n = 10$ ,  $r = 2$

尾数规格化后的浮点数表示范围

最大正数  $2^{+1111} \times \underbrace{0.1111111111}_{10 \text{ 个 } 1} = 2^{15} \times (1 - 2^{-10})$

最小正数  $2^{-1111} \times \underbrace{0.1000000000}_{9 \text{ 个 } 0} = 2^{-15} \times 2^{-1} = 2^{-16}$

最大负数  $2^{-1111} \times (-\underbrace{0.1000000000}_{9 \text{ 个 } 0}) = -2^{-15} \times 2^{-1} = -2^{-16}$

最小负数  $2^{+1111} \times (-\underbrace{0.1111111111}_{10 \text{ 个 } 1}) = -2^{15} \times (1 - 2^{-10})$

### 三、举例

例 6.13 将  $+\frac{19}{128}$  写成二进制定点数、浮点数及在定点机和浮点机中的机器数形式。其中数值部分均取 10 位，数符取 1 位，浮点数阶码取 5 位（含 1 位阶符）。

解： 设  $x = +\frac{19}{128}$

二进制形式  $x = 0.0010011$

定点表示  $x = 0.0010011\mathbf{000}$

浮点规格化形式  $x = 0.1001100000 \times 2^{-10}$

定点机中  $[x]_{\text{原}} = [x]_{\text{补}} = [x]_{\text{反}} = 0.0010011000$

浮点机中  $[x]_{\text{原}} = 1, 0010; 0.1001100000$

$[x]_{\text{补}} = 1, 1110; 0.1001100000$

$[x]_{\text{反}} = 1, 1101; 0.1001100000$

**例 6.14** 将  $-58$  表示成二进制定点数和浮点数，**6.2**  
并写出它在定点机和浮点机中的三种机器数及阶码  
为移码、尾数为补码的形式（其他要求同上例）。

解： 设  $x = -58$

二进制形式  $x = -111010$

定点表示  $x = -0000111010$

浮点规格化形式  $x = -(0.1110100000) \times 2^{110}$

**定点机中**

$[x]_{\text{原}} = 1, 0000111010$

$[x]_{\text{补}} = 1, 1111000110$

$[x]_{\text{反}} = 1, 1111000101$

**浮点机中**

$[x]_{\text{原}} = 0, 0110; 1.1110100000$

$[x]_{\text{补}} = 0, 0110; 1.0001100000$


$[x]_{\text{反}} = 0, 0110; 1.0001011111$

$[x]_{\text{阶移、尾补}} = 1, 0110; 1.0001100000$





**例6.15** 写出对应下图所示的浮点数的补码形式。 6.2  
 形式。 设  $n = 10$ ,  $m = 4$ , 阶符、数符各取 1 位。



解:

真值

补码

最大正数	$2^{15} \times (1-2^{-10})$	0,1111; 0.1111111111
最小正数	$2^{-15} \times 2^{-10}$	1,0001; 0.0000000001
最大负数	$-2^{-15} \times 2^{-10}$	1,0001; 1.1111111111
最小负数	$-2^{15} \times (1-2^{-10})$	0,1111; 1.0000000001



# 机器零

## 6.2

- 当浮点数 **尾数为 0** 时，不论其阶码为何值按机器零处理
- 当浮点数 **阶码等于或小于它所表示的最小数** 时，不论尾数为何值，按机器零处理

如  $m = 4$        $n = 10$

当阶码和尾数都用补码表示时，机器零为

$\times, \times \times \times \times; \quad \mathbf{0.00} \quad \dots \quad \mathbf{0}$

(阶码 = -16)     $\mathbf{1, 0000}; \quad \times.\times\times \quad \dots \quad \times$

当阶码用移码，尾数用补码表示时，机器零为


$\mathbf{0, 0000}; \quad \mathbf{0.00} \quad \dots \quad \mathbf{0}$

有利于机器中“判 0”电路的实现



## 四、IEEE 754 标准

## 6.2



尾数用原码表示，规格化表示

非“0”的有效位最高位为“1”（第一位总为1，隐含）

	符号位 $S$	阶码	尾数	总位数
短实数	1	8	23	32
长实数	1	11	52	64
临时实数	1	15	64	80

## 6.3 定点运算

### 一、移位运算

#### 1. 移位的意义

$$15.\text{m} = 1500.\text{cm}$$

小数点右移 2 位

机器用语      15 相对于小数点 左移 2 位  
( 小数点不动 )

左移      绝对值扩大

右移      绝对值缩小

在计算机中，移位与加减配合，能够实现乘除运算

## 2. 算术移位规则

符号位不变

真值	码 制	添补代码
正数	原码、补码、反码	0
负数	原 码	0
	补 码	左移 添 0
		右移 添 1
	反 码	1

## 例6.16

## 6.3

设机器数字长为8位（含1位符号位），写出  $A = +26$  时，三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值，并分析结果的正确性。

解：  $A = +26 = +11010$

则  $[A]_{\text{原}} = [A]_{\text{补}} = [A]_{\text{反}} = 0,0011010$

移位操作	机 器 数	对应的真值
	$[A]_{\text{原}} = [A]_{\text{补}} = [A]_{\text{反}}$	
移位前	0,0011010	+26
左移一位	0,0110100	+52
左移两位	0,1101000	+104
右移一位	0,0001101	+13
右移两位	0,0000110	+6

## 例6.17

## 6.3

设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位），写出  $A = -26$  时，三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值，并分析结果的正确性。

解：  $A = -26 = -11010$

原码	移位操作	机 器 数	对应的真值
	移位前	1,0011010	- 26
	左移一位	1,0110100	- 52
	左移两位	1,1101000	- 104
	右移一位	1,0001101	- 13
	右移两位	1,0000110	- 6

## 6.3

补码



移位操作	机 器 数	对应的真值
移位前	1,1100110	- 26
左移一位	1,1001100	- 52
左移两位	1,0011000	- 104
右移一位	1,1110011	- 13
右移两位	1,1111001	- 7

反码

移位操作	机 器 数	对应的真值
移位前	1,1100101	- 26
左移一位	1,1001011	- 52
左移两位	1,0010111	- 104
右移一位	1,1110010	- 13
右移两位	1,1111001	- 6

# 3. 算术移位的硬件实现

6.3



(a) 真值为正

(b) 负数的原码

(c) 负数的补码

(d) 负数的反码

← 丢 1 出错

出错

正确

正确

→ 丢 1 影响精度

影响精度

影响精度

正确





# 4. 算术移位和逻辑移位的区别

6.3

算术移位      有符号数的移位

逻辑移位      无符号数的移位

逻辑左移      低位添 0，高位移丢

逻辑右移      高位添 0，低位移丢

例如      **01010011**


逻辑左移      **10100110**

算术左移      **00100110**

逻辑右移      **01011001**

算术右移      **11011001** (补码)

高位 1 移丢



# 作业

- 习题： 6.15, 6.16, 6.17



## 二、加减法运算

### 6.3

### 1. 补码加减运算公式

#### (1) 加法

**整数**  $[A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}} = [A+B]_{\text{补}} \pmod{2^{n+1}}$

**小数**  $[A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}} = [A+B]_{\text{补}} \pmod{2}$

#### (2) 减法

$$A-B = A+(-B)$$

**整数**  $[A-B]_{\text{补}} = [A+(-B)]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}} \pmod{2^{n+1}}$

**小数**  $[A-B]_{\text{补}} = [A+(-B)]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}} \pmod{2}$

连同符号位一起相加，符号位产生的进位自然丢掉



## 2. 举例

6.3

例 6.18 设  $A = 0.1011$ ,  $B = -0.0101$

求  $[A + B]_{\text{补}}$

验证

解:  $[A]_{\text{补}} = 0.1011$

$+ [B]_{\text{补}} = 1.1011$

$[A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}} = 10.0110 = [A + B]_{\text{补}}$

$\therefore A + B = 0.0110$

$$\begin{array}{r} 0.1011 \\ - 0.0101 \\ \hline 0.0110 \end{array}$$

例 6.19 设  $A = -9$ ,  $B = -5$

求  $[A + B]_{\text{补}}$

验证

解:  $[A]_{\text{补}} = 1, 0111$

$+ [B]_{\text{补}} = 1, 1011$

$[A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}} = 11, 0010 = [A + B]_{\text{补}}$

$\therefore A + B = -1110$

$$\begin{array}{r} -1001 \\ + -0101 \\ \hline -1110 \end{array}$$



## 例 6.20 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位） **6.3**

且  $A = 15$ ,  $B = 24$ , 用补码求  $A - B$

解:  $A = 15 = 0001111$

$$B = 24 = 0011000$$

$$[A]_{\text{补}} = 0, 0001111 \quad [B]_{\text{补}} = 0, 0011000$$

$$+ [-B]_{\text{补}} = 1, 1101000$$

---

$$[A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}} = 1, 1110111 = [A - B]_{\text{补}}$$

$$\therefore A - B = -1001 = -9$$

练习 1 设  $x = \frac{9}{16}$   $y = \frac{11}{16}$ , 用补码求  $x + y$

$$x + y = -0.1100 = -\frac{12}{16} \quad \text{错}$$

练习 2 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）  
且  $A = -97$ ,  $B = +41$ , 用补码求  $A - B$

$$A - B = +1110110 = +118 \quad \text{错}$$

### 3. 溢出判断

## 6.3

#### (1) 一位符号位判溢出

参加操作的 **两个数**（减法时即为被减数和“求补”以后的减数）**符号相同**，其结果的符号与原操作数的符号不同，即为溢出

硬件实现

**最高有效位的进位  $\oplus$  符号位的进位 = 1      溢出**

如

$1 \oplus 0 = 1$	} 有 溢出
$0 \oplus 1 = 1$	
$0 \oplus 0 = 0$	} 无 溢出
$1 \oplus 1 = 0$	



## (2) 两位符号位判溢出

6.3

$$[x]_{\text{补}'} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ 4 + x & 0 > x \geq -1 \pmod{4} \end{cases}$$

$$[x]_{\text{补}'} + [y]_{\text{补}'} = [x + y]_{\text{补}'} \pmod{4}$$

$$[x - y]_{\text{补}'} = [x]_{\text{补}'} + [-y]_{\text{补}'} \pmod{4}$$


结果的双符号位	相同	未溢出	00, ×××××
			11, ×××××

结果的双符号位	不同	溢出	10, ×××××
			01, ×××××

最高符号位 代表其 真正的符号



## 4. 补码加减法的硬件配置



A、X 均  $n+1$  位

用减法标记  $G_S$  控制求补逻辑



# 作业

- 习题： 6.19



# 三、乘法运算

## 1. 分析笔算乘法

$$A = -0.1101 \quad B = 0.1011$$

$$A \times B = -0.10001111 \quad \text{乘积的符号心算求得}$$

$$\begin{array}{r}
 0.1101 \\
 \times 0.1011 \\
 \hline
 1101 \\
 1101 \\
 0000 \\
 1101 \\
 \hline
 0.10001111
 \end{array}$$

- ✓ 符号位单独处理
- ✓ 乘数的某一位决定是否加被乘数
- ? 4个位积一起相加
- ✓ 乘积的位数扩大一倍

## 2. 笔算乘法改进

6.3

$$A \cdot B = A \cdot 0.1011$$

$$= 0.1A + 0.00A + 0.001A + 0.0001A$$

$$= 0.1A + 0.00A + 0.001(A + 0.1A)$$

$$= 0.1A + 0.01[0 \cdot A + 0.1(A + 0.1A)]$$

右移一位

$$= 0.1\{A + 0.1[0 \cdot A + 0.1(A + 0.1A)]\}$$

$$= 2^{-1}\{A + 2^{-1}[0 \cdot A + 2^{-1}(A + 2^{-1}(A + 0))]\}$$

第一步 被乘数  $A + 0$

第二步 右移一位，得新的部分积

第三步 部分积 + 被乘数

⋮

第八步 右移一位，得结果

①

②

③

⑧



### 3. 改进后的笔算乘法过程（竖式） 6.3

部分积	乘数	说明
$\begin{array}{r} 0.0000 \\ + 0.1101 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 1011 \\ \hline \end{array}$	初态，部分积 = 0 乘数为 1，加被乘数
$\begin{array}{r} 0.1101 \\ 0.0110 \\ + 0.1101 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 1101 \\ \hline \end{array}$	→ 1，形成新的部分积 乘数为 1，加被乘数
$\begin{array}{r} 1.0011 \\ 0.1001 \\ + 0.0000 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \\ 1110 \\ \hline \end{array}$	→ 1，形成新的部分积 乘数为 0，加 0
$\begin{array}{r} 0.1001 \\ 0.0100 \\ + 0.1101 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 11 \\ 1111 \\ \hline \end{array}$	→ 1，形成新的部分积 乘数为 1，加被乘数
$\begin{array}{r} 1.0001 \\ 0.1000 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 111 \\ 1111 \\ \hline \end{array}$	→ 1，得结果

- 乘法 运算可用 加和移位实现  
 $n = 4$ , 加 4 次, 移 4 次
- 由乘数的末位决定被乘数是否与原部分积相加,  
然后  $\rightarrow$  1 位形成新的部分积, 同时 乘数  $\rightarrow$  1 位  
(末位移丢), 空出高位存放部分积的低位。
- 被乘数只与部分积的高位相加

硬件      3 个寄存器, 具有移位功能

1 个全加器



## 4. 原码乘法

### (1) 原码一位乘运算规则

以小数为例

$$\text{设}[x]_{\text{原}} = x_0 \cdot x_1 x_2 \cdots x_n$$

$$[y]_{\text{原}} = y_0 \cdot y_1 y_2 \cdots y_n$$

$$\begin{aligned} [x \cdot y]_{\text{原}} &= (x_0 \oplus y_0) \cdot (0 \cdot x_1 x_2 \cdots x_n) (0 \cdot y_1 y_2 \cdots y_n) \\ &= (x_0 \oplus y_0) \cdot x^* y^* \end{aligned}$$

式中  $x^* = 0 \cdot x_1 x_2 \cdots x_n$  为  $x$  的绝对值

$y^* = 0 \cdot y_1 y_2 \cdots y_n$  为  $y$  的绝对值

乘积的符号位单独处理  $x_0 \oplus y_0$

数值部分为绝对值相乘  $x^* \cdot y^*$

## (2) 原码一位乘递推公式

$$\begin{aligned}
 x^* \cdot y^* &= x^*(0.y_1y_2 \dots y_n) \\
 &= x^*(y_12^{-1} + y_22^{-2} + \dots + y_n2^{-n}) \\
 &= 2^{-1}(y_1x^* + 2^{-1}(y_2x^* + \dots 2^{-1}(y_nx^* + \underbrace{0}_{z_0}) \dots)) \\
 &\quad \underbrace{\dots}_{z_n} \quad \underbrace{\quad}_{z_1}
 \end{aligned}$$

$$z_0 = 0$$

$$z_1 = 2^{-1}(y_nx^* + z_0)$$

$$z_2 = 2^{-1}(y_{n-1}x^* + z_1)$$

$$\vdots$$

$$z_n = 2^{-1}(y_1x^* + z_{n-1})$$

例6.21 已知  $x = -0.1110$   $y = 0.1101$  求  $[x \cdot y]_{\text{原}}$  **6.3**

解: 数值部分的运算

部分积	乘数	说明
0.0000	<u>1101</u>	部分积 初态 $z_0 = 0$
+ 0.1110		+ $x^*$
0.1110		
逻辑右移 0.0111	<u>0110</u>	$\rightarrow 1$ , 得 $z_1$
+ 0.0000		+ 0
0.0111	0	
逻辑右移 0.0011	<u>1011</u>	$\rightarrow 1$ , 得 $z_2$
+ 0.1110		+ $x^*$
1.0001	10	
逻辑右移 0.1000	<u>1101</u>	$\rightarrow 1$ , 得 $z_3$
+ 0.1110		+ $x^*$
1.0110	110	
逻辑右移 0.1011	0110	$\rightarrow 1$ , 得 $z_4$



## 例6.21 结果

6.3

① 乘积的符号位  $x_0 \oplus y_0 = 1 \oplus 0 = 1$

② 数值部分按绝对值相乘

$$x^* \cdot y^* = 0.10110110$$

$$\text{则 } [x \cdot y]_{\text{原}} = 1.10110110$$

特点     绝对值运算


用移位的次数判断乘法是否结束

逻辑移位



### (3) 原码一位乘的硬件配置

6.3



A、X、Q 均  $n+1$  位

移位和加受末位乘数控制

## (4) 原码两位乘

6.3

原码乘

符号位 和 数值位 部分 分开运算

两位乘

每次用 乘数的 2 位判断 原部分积  
是否加 和 如何加 被乘数

乘数 $y_{n-1}y_n$	新的部分积
0 0	加 “0” → 2
0 1	加 1 倍的被乘数 → 2
1 0	加 2 倍的被乘数 → 2
1 1	加 3 倍的被乘数 → 2

$$\begin{array}{r} 3 ? \quad 4 \quad 100 \\ -1 \quad -01 \\ \hline 3 \quad 11 \end{array}$$

先 减 1 倍 的被乘数  
再 加 4 倍 的被乘数

## (5) 原码两位乘运算规则

6.3

乘数判断位 $y_{n-1}y_n$	标志位 $C_j$	操作内容
0 0	0	$z \rightarrow 2, y^* \rightarrow 2, C_j$ 保持 “0”
0 1	0	$z+x^* \rightarrow 2, y^* \rightarrow 2, C_j$ 保持 “0”
1 0	0	$z+2x^* \rightarrow 2, y^* \rightarrow 2, C_j$ 保持 “0”
1 1	0	$z-x^* \rightarrow 2, y^* \rightarrow 2, C_j$ 置 “1”
0 0	1	$z+x^* \rightarrow 2, y^* \rightarrow 2, C_j$ 置 “0”
0 1	1	$z+2x^* \rightarrow 2, y^* \rightarrow 2, C_j$ 置 “0”
1 0	1	$z-x^* \rightarrow 2, y^* \rightarrow 2, C_j$ 保持 “1”
1 1	1	$z \rightarrow 2, y^* \rightarrow 2, C_j$ 保持 “1”

共有操作     $+x^*$      $+2x^*$      $-x^*$      $\rightarrow 2$

实际操作     $+ [x^*]_{\text{补}}$      $+ [2x^*]_{\text{补}}$      $+ [-x^*]_{\text{补}}$      $\rightarrow 2$  补码移

例6.22 已知  $x = 0.111111$   $y = -0.111001$  求  $[x \cdot y]_{\text{原}}$

6.3

解：数值部分补码运算

补码右移

补码右移

补码右移

	乘数	$C_j$	说明
000.000000 + 000.111111	00.111001	0	初态 $z_0 = 0$ $+ x^*, C_j = 0$
000.111111 000.001111	11 001110	0	$\rightarrow 2$ $+ 2x^*, C_j = 0$
+ 001.111110 010.001101	11		
000.100011 + 111.000001	0111 0011	0	$\rightarrow 2$ $- x^*, C_j = 1$
111.100100 111.111001	0111		
+ 000.111111 000.111000	000111 00	1	$\rightarrow 2$ $+ x^*, C_j = 0$
	000111		



## 例6.22 结果

6.3

① 乘积的符号位  $x_0 \oplus y_0 = 0 \oplus 1 = 1$

② 数值部分的运算

$$x^* \cdot y^* = 0.111000000111$$

$$\text{则 } [x \cdot y]_{\text{原}} = 1.111000000111$$

特点     绝对值的补码运算

用移位的次数判断乘法是否结束

算术移位



## (6) 原码两位乘和原码一位乘比较 6.3

	原码一位乘	原码两位乘
符号位	$x_0 \oplus y_0$	$x_0 \oplus y_0$
操作数	绝对值	绝对值的补码
移位	逻辑右移	算术右移
移位次数	$n$	$\frac{n}{2}$ ( $n$ 为偶数)
最多加法次数	$n$	$\frac{n}{2} + 1$ ( $n$ 为偶数)

思考  $n$  为奇数时，原码两位乘 移？次 最多加？次



# 作业

- 习题： 6.19, 6.20





## 5. 补码乘法

### 6.3

#### (1) 补码一位乘运算规则

以小数为例 设被乘数  $[x]_{\text{补}} = x_0.x_1x_2 \cdots x_n$   
乘数  $[y]_{\text{补}} = y_0.y_1y_2 \cdots y_n$

① 被乘数任意，乘数为正

同原码乘 但加和移位按补码规则运算  
乘积的符号自然形成

② 被乘数任意，乘数为负

乘数 $[y]_{\text{补}}$ ，去掉符号位，操作同 ①

最后加 $[-x]_{\text{补}}$ ，校正



### ③ Booth 算法（被乘数、乘数符号任意） 6.3

设  $[x]_{\text{补}} = x_0 x_1 x_2 \cdots x_n$      $[y]_{\text{补}} = y_0 y_1 y_2 \cdots y_n$

$[x \cdot y]_{\text{补}}$

$$-[x]_{\text{补}} = +[-x]_{\text{补}}$$

$$= [x]_{\text{补}} (0 y_1 \cdots y_n) - [x]_{\text{补}} \cdot y_0$$

$$= [x]_{\text{补}} (y_1 2^{-1} + y_2 2^{-2} + \cdots + y_n 2^{-n}) - [x]_{\text{补}} \cdot y_0$$

$$2^{-1} = 2^0 - 2^{-1}$$

$$= [x]_{\text{补}} (-y_0 + y_1 2^{-1} + y_2 2^{-2} + \cdots + y_n 2^{-n})$$

$$2^{-2} = 2^{-1} - 2^{-2}$$

$$= [x]_{\text{补}} [-y_0 + (y_1 - y_1 2^{-1}) + (y_2 2^{-1} - y_2 2^{-2}) + \cdots + (y_n 2^{-(n-1)} - y_n 2^{-n})]$$

$$= [x]_{\text{补}} [(y_1 - y_0) + (y_2 - y_1) 2^{-1} + \cdots + (y_n - y_{n-1}) 2^{-(n-1)} + (0 - y_n) 2^{-n}]$$

$$= [x]_{\text{补}} [(y_1 - y_0) + (y_2 - y_1) 2^{-1} + \cdots + (y_{n+1} - y_n) 2^{-n}]$$

附加位  $y_{n+1}$

## ④ Booth 算法递推公式

6.3

$$[z_0]_{\text{补}} = 0$$

$$[z_1]_{\text{补}} = 2^{-1} \{ (y_{n+1} - y_n) [x]_{\text{补}} + [z_0]_{\text{补}} \} \quad y_{n+1} = 0$$

⋮

$$[z_n]_{\text{补}} = 2^{-1} \{ (y_2 - y_1) [x]_{\text{补}} + [z_{n-1}]_{\text{补}} \}$$

$$[x \cdot y]_{\text{补}} = [z_n]_{\text{补}} + (y_1 - y_0) [x]_{\text{补}}$$

最后一步不移位

如何实现  
 $y_{i+1} - y_i$  ?

$y_i$	$y_{i+1}$	$y_{i+1} - y_i$	操作
0	0	0	$\rightarrow 1$
0	1	1	$+ [x]_{\text{补}} \rightarrow 1$
1	0	-1	$+ [-x]_{\text{补}} \rightarrow 1$
1	1	0	$\rightarrow 1$

例6.23 已知  $x = +0.0011$   $y = -0.1011$  求  $[x \cdot y]_{\text{补}}$  **6.3**

解:

0 0 . 0 0 0 0	1 . 0 1 0 <u>1</u> <u>0</u>	
+ 1 1 . 1 1 0 1		$+[-x]_{\text{补}}$

$$[x]_{\text{补}} = 0.0011$$

$$[y]_{\text{补}} = 1.0101$$

$$[-x]_{\text{补}} = 1.1101$$

补码  
右移

1 1 . 1 1 0 1		
1 1 . <u>1</u> 1 1 0	1 <u>1</u> 0 1 <u>0</u> <u>1</u>	$\rightarrow 1$
+ 0 0 . 0 0 1 1		$+ [x]_{\text{补}}$

补码  
右移

0 0 . 0 0 0 1	1	
0 0 . <u>0</u> 0 0 0	1 1 <u>1</u> 0 <u>1</u> <u>0</u>	$\rightarrow 1$
+ 1 1 . 1 1 0 1		$+ [-x]_{\text{补}}$

补码  
右移

1 1 . 1 1 0 1	1 1	
1 1 . <u>1</u> 1 1 0	1 1 1 <u>1</u> 0 <u>1</u>	$\rightarrow 1$
+ 0 0 . 0 0 1 1		$+ [x]_{\text{补}}$

补码  
右移

0 0 . 0 0 0 1	1 1 1	
0 0 . <u>0</u> 0 0 0	1 1 1 1 <u>1</u> <u>0</u>	$\rightarrow 1$
+ 1 1 . 1 1 0 1		$+ [-x]_{\text{补}}$

1 1 . 1 1 0 1	1 1 1 1	
---------------	---------	--


最后一步不移位

$$\therefore [x \cdot y]_{\text{补}} = 1.11011111$$



## (2) Booth 算法的硬件配置

6.3



A、X、Q 均  $n+2$  位  
移位和加受末两位乘数控制

# 乘法小结

- 整数乘法与小数乘法完全相同  
可用 **逗号** 代替小数点
- 原码乘 符号位 **单独处理**  
补码乘 符号位 **自然形成**
- 原码乘去掉符号位运算 即为无符号数乘法
- 不同的乘法运算需有不同的硬件支持

## 四、除法运算

6.3

### 1. 分析笔算除法

$$x = -0.1011 \quad y = 0.1101 \quad \text{求 } x \div y$$

$$\begin{array}{r} \phantom{0.} 0.1101 \\ 0.1101 \overline{) 0.101101} \\ \underline{0.01101} \phantom{0} \\ 0.010010 \\ \underline{0.001101} \phantom{0} \\ 0.00010100 \\ \underline{0.00001101} \phantom{0} \\ 0.00000111 \end{array}$$

✓ 商符单独处理

? 心算上商

? 余数不动低位补“0”  
减右移一位的除数

? 上商位置不固定

$$x \div y = -0.1101 \quad \text{商符心算求得}$$

$$\text{余数 } 0.00000111$$



## 2. 笔算除法和机器除法的比较

### 6.3

#### 笔算除法

商符单独处理

心算上商

余数 **不动** 低位补“0”  
**减** 右移一位 的除数

2 倍字长加法器

上商位置 **不固定**

#### 机器除法

符号位异或形成

$|x| - |y| > 0$  上商 1

$|x| - |y| < 0$  上商 0

余数 **左移一位** 低位补“0”  
**减** 除数

1 倍字长加法器

在寄存器 **最末位** 上商  
**原部分商** 左移一位





### 3. 原码除法

6.3

以小数为例

$$[x]_{\text{原}} = x_0 \cdot x_1 x_2 \dots x_n$$

$$[y]_{\text{原}} = y_0 \cdot y_1 y_2 \dots y_n$$

$$\left[\frac{x}{y}\right]_{\text{原}} = (x_0 \oplus y_0) \cdot \frac{x^*}{y^*}$$

式中  $x^* = 0.x_1 x_2 \dots x_n$  为  $x$  的绝对值  
 $y^* = 0.y_1 y_2 \dots y_n$  为  $y$  的绝对值

商的符号位单独处理  $x_0 \oplus y_0$

数值部分为绝对值相除  $\frac{x^*}{y^*}$

约定 小数定点除法  $x^* < y^*$  整数定点除法  $x^* > y^*$   
被除数不等于 0  
除数不能为 0

# (1) 恢复余数法 (余数为负, 需加上除数) 6.3

例6.24  $x = -0.1011$   $y = -0.1101$  求  $[\frac{x}{y}]_{\text{原}}$

解:  $[x]_{\text{原}} = 1.1011$   $[y]_{\text{原}} = 1.1101$   $[y^*]_{\text{补}} = 0.1101$   $[-y^*]_{\text{补}} = 1.0011$

①  $x_0 \oplus y_0 = 1 \oplus 1 = 0$

② 被除数 (余数)	商	说 明
0.1011	0.0000	
+ 1.0011		$+ [-y^*]_{\text{补}}$
1.1110	0	余数为负, 上商 0
+ 0.1101		恢复余数 $+ [y^*]_{\text{补}}$
0.1011	0	恢复后的余数
逻辑左移 1.0110	0	$\leftarrow 1$
+ 1.0011		$+ [-y^*]_{\text{补}}$
0.1001	01	余数为正, 上商 1
逻辑左移 1.0010	01	$\leftarrow 1$
+ 1.0011		$+ [-y^*]_{\text{补}}$

## 6.3

被除数 (余数)	商	说 明
0.0101	011	余数为正, 上商 1
逻辑左移 0.1010	011	← 1
+ 1.0011		+ $[-y^*]_{\text{补}}$
1.1101	0110	余数为负, 上商 0
+ 0.1101		恢复余数 + $[y^*]_{\text{补}}$
0.1010	0110	恢复后的余数
逻辑左移 1.0100	0110	← 1
+ 1.0011		+ $[-y^*]_{\text{补}}$
0.0111	01101	余数为正, 上商 1

$$\frac{x^*}{y^*} = 0.1101$$

$$\therefore \left[ \frac{x}{y} \right]_{\text{原}} = 0.1101$$

余数为正 上商 1

余数为负 上商 0, 恢复余数

上商 5 次

第一次上商判溢出

移 4 次



## (2) 不恢复余数法（加减交替法）

6.3

### • 恢复余数法运算规则

余数  $R_i > 0$  上商 “1” ,  $2R_i - y^*$

余数  $R_i < 0$  上商 “0” ,  $R_i + y^*$  恢复余数

$$2(R_i + y^*) - y^* = 2R_i + y^*$$

### • 不恢复余数法运算规则

上商 “1”  $2R_i - y^*$

上商 “0”  $2R_i + y^*$

加减交替



# 例6.25 $x = -0.1011$ $y = -0.1101$ 求 $[\frac{x}{y}]_{\text{原}}$ 6.3

解:	0.1011	0.0000		$[x]_{\text{原}} = 1.1011$
	+1.0011		$+[-y^*]_{\text{补}}$	
逻辑左移	1.1110	0	余数为负, 上商 0	$[y]_{\text{原}} = 1.1101$
	1.1100	0	← 1	$[x^*]_{\text{补}} = 0.1011$
	+0.1101		$+ [y^*]_{\text{补}}$	$[y^*]_{\text{补}} = 0.1101$
逻辑左移	0.1001	01	余数为正, 上商 1	$[-y^*]_{\text{补}} = 1.0011$
	1.0010	01	← 1	
	+1.0011		$+ [-y^*]_{\text{补}}$	
逻辑左移	0.0101	011	余数为正, 上商 1	
	0.1010	011	← 1	
	+1.0011		$+ [-y^*]_{\text{补}}$	
逻辑左移	1.1101	0110	余数为负, 上商 0	
	1.1010	0110	← 1	
	+0.1101		$+ [y^*]_{\text{补}}$	
	0.0111	01101	余数为正, 上商 1	

## 例6.25 结果

6.3

$$\textcircled{1} x_0 \oplus y_0 = 1 \oplus 1 = 0$$

$$\textcircled{2} \frac{x^*}{y^*} = 0.1101$$

$$\therefore \left[ \frac{x}{y} \right]_{\text{原}} = 0.1101$$

特点 上商  $n+1$  次


第一次上商判溢出

移  $n$  次，加  $n+1$  次

用移位的次数判断除法是否结束



### (3) 原码加减交替除法硬件配置



A、X、Q 均  $n+1$  位  
用  $Q_n$  控制加减交替

## 4. 补码除法

6.3

### (1) 商值的确定

#### ① 比较被除数和除数绝对值的大小

$x$  与  $y$  同号

$$x = 0.1011 \quad [x]_{\text{补}} = 0.1011$$

$$y = 0.0011 \quad [y]_{\text{补}} = \boxed{0}.0011$$

$$[x]_{\text{补}} = 0.1011$$

$$+ [-y]_{\text{补}} = 1.1101$$

$$\hline [R_i]_{\text{补}} = \boxed{0}.1000$$

$$x^* > y^*$$

$[R_i]_{\text{补}}$  与  $[y]_{\text{补}}$  同号

“够减”

$$x = -0.0011 \quad [x]_{\text{补}} = 1.1101$$

$$y = -0.1011 \quad [y]_{\text{补}} = \boxed{1}.0101$$

$$[x]_{\text{补}} = 1.1101$$

$$+ [-y]_{\text{补}} = 0.1011$$

$$\hline [R_i]_{\text{补}} = \boxed{0}.1000$$

$$x^* < y^*$$

$[R_i]_{\text{补}}$  与  $[y]_{\text{补}}$  异号

“不够减”





# 6.3

## $x$ 与 $y$ 异号

$$x = 0.1011 \quad [x]_{\text{补}} = 0.1011$$

$$y = -0.0011 \quad [y]_{\text{补}} = \boxed{1}.1101$$

$$[x]_{\text{补}} = 0.1011$$

$$+ [y]_{\text{补}} = 1.1101$$

$$\hline [R_i]_{\text{补}} = \boxed{0}.1000$$

$$x^* > y^*$$

$[R_i]_{\text{补}}$  与  $[y]_{\text{补}}$  异号

“够减”

$$x = -0.0011 \quad [x]_{\text{补}} = 1.1101$$

$$y = 0.1011 \quad [y]_{\text{补}} = \boxed{0}.1011$$

$$[x]_{\text{补}} = 1.1101$$

$$+ [y]_{\text{补}} = 0.1011$$

$$\hline [R_i]_{\text{补}} = \boxed{0}.1000$$

$$x^* < y^*$$

$[R_i]_{\text{补}}$  与  $[y]_{\text{补}}$  同号

“不够减”

## 小结

$[x]_{\text{补}}$ 和 $[y]_{\text{补}}$	求 $[R_i]_{\text{补}}$	$[R_i]_{\text{补}}$ 与 $[y]_{\text{补}}$
同号	$[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}}$	同号, “够减”
异号	$[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}}$	异号, “够减”



## ② 商值的确定 末位恒置“1”法

6.3

$[x]_{\text{补}}$  与  $[y]_{\text{补}}$  同号  
正商

$\times.\underbrace{\times\times\times\times}_{\text{原码}}1$

按原码上商

“够减”上“1”  
“不够减”上“0”

$[x]_{\text{补}}$  与  $[y]_{\text{补}}$  异号  
负商

$1.\underbrace{\times\times\times\times}_{\text{反码}}1$

按反码上商

“够减”上“0”  
“不够减”上“1”

小 结

$[x]_{\text{补}}$ 与 $[y]_{\text{补}}$	商	$[R_i]_{\text{补}}$ 与 $[y]_{\text{补}}$	商 值
同 号	正	够减 (同号)	1
		不够减 (异号)	0
异 号	负	够减 (异号)	0
		不够减 (同号)	1

简 化 为


$[R_i]_{\text{补}}$ 与 $[y]_{\text{补}}$	商值
同 号	1
异 号	0



## (2) 商符的形成

6.3

除法过程中自然形成



### (3) 新余数的获得

加减交替

$[R_i]_{\text{补}}$ 和 $[y]_{\text{补}}$	商	新余数
同 号	1	$2[R_i]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$
异 号	0	$2[R_i]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}}$

例6.26 设  $x = -0.1011$   $y = 0.1101$   
求  $[\frac{x}{y}]_{\text{补}}$  并还原成真值

解:  $[x]_{\text{补}} = 1.0101$   $[y]_{\text{补}} = 0.1101$   $[-y]_{\text{补}} = 1.0011$

	1.0101	0.0000	
	+ 0.1101		异号做加法
逻辑左移	0.0010	1	同号上“1”
	0.0100	1	←1
	+ 1.0011		+ $[-y]_{\text{补}}$
逻辑左移	1.0111	10	异号上“0”
	0.1110	10	←1
	+ 0.1101		+ $[y]_{\text{补}}$
逻辑左移	1.1011	100	异号上“0”
	1.0110	100	←1
	+ 0.1101		+ $[y]_{\text{补}}$
逻辑左移	0.0011	1001	同号上“1”
	0.0110	10011	←1 末位恒置“1”

$$\therefore [\frac{x}{y}]_{\text{补}} = 1.0011$$

$$\text{则 } \frac{x}{y} = -0.1101$$

## (4) 小结

## 6.3

- 补码除法共上商  $n+1$  次（末位恒置 1）  
第一次为商符
- 第一次商可判溢出
- 加  $n$  次 移  $n$  次
- 用移位的次数判断除法是否结束
- 精度误差最大为  $2^{-n}$

## (5) 补码除和原码除（加减交替法）比较

6.3

	原码除	补码除
商符	$x_0 \oplus y_0$	自然形成
操作数	绝对值补码	补码
上商原则	余数的正负	比较余数和除数的符号
上商次数	$n + 1$	$n + 1$
加法次数	$n + 1$	$n$ （恒置1）
移位	逻辑左移	逻辑左移
移位次数	$n$	$n$
第一步操作	$[x^*]_{\text{补}} - [y^*]_{\text{补}}$	同号 $[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}}$ 异号 $[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}}$

# 作业

- 习题： 6.21, 6.23





## 6.4 浮点四则运算

### 一、浮点加减运算

$$x = S_x \cdot 2^{j_x} \quad y = S_y \cdot 2^{j_y}$$

#### 1. 对阶

##### (1) 求阶差

$$\Delta j = j_x - j_y = \begin{cases} = 0 & j_x = j_y & \text{已对齐} \\ > 0 & j_x > j_y & \begin{cases} x \text{ 向 } y \text{ 看齐} & S_x \leftarrow 1, j_x - 1 \\ y \text{ 向 } x \text{ 看齐} & \checkmark S_y \rightarrow 1, j_y + 1 \end{cases} \\ < 0 & j_x < j_y & \begin{cases} x \text{ 向 } y \text{ 看齐} & \checkmark S_x \rightarrow 1, j_x + 1 \\ y \text{ 向 } x \text{ 看齐} & S_y \leftarrow 1, j_y - 1 \end{cases} \end{cases}$$

##### (2) 对阶原则

小阶向大阶看齐



例如  $x = 0.1101 \times 2^{01}$      $y = (-0.1010) \times 2^{11}$     **6.4**

求  $x+y$

解:  $[x]_{\text{补}} = 00, 01; 00.1101$      $[y]_{\text{补}} = 00, 11; 11.0110$

## 1. 对阶

① 求阶差  $[\Delta j]_{\text{补}} = [j_x]_{\text{补}} - [j_y]_{\text{补}} = 00, 01$

$$\begin{array}{r} + \quad 11, 01 \\ \hline 11, 10 \end{array}$$

阶差为负 ( $-2$ )     $\therefore S_x \rightarrow 2 \quad j_x + 2$

② 对阶     $[x]_{\text{补}}' = 00, 11; 00.0011$

## 2. 尾数求和

$$\begin{array}{r} [S_x]_{\text{补}}' = 00.0011 \quad \text{对阶后的}[S_x]_{\text{补}}' \\ + \quad [S_y]_{\text{补}} = 11.0110 \\ \hline 11.1001 \\ \therefore [x+y]_{\text{补}} = 00, 11; 11. 1001 \end{array}$$

### 3. 规格化

## 6.4

#### (1) 规格化数的定义

$$r = 2 \quad \frac{1}{2} \leq |S| < 1$$

#### (2) 规格化数的判断

$S > 0$	规格化形式	$S < 0$	规格化形式
真值	$0.1 \times \times \dots \times$	真值	$-0.1 \times \times \dots \times$
原码	$0.\boxed{1} \times \times \dots \times$	原码	$1.\boxed{1} \times \times \dots \times$
补码	$\boxed{0.1} \times \times \dots \times$	补码	$\boxed{1.0} \times \times \dots \times$
反码	$0.1 \times \times \dots \times$	反码	$1.0 \times \times \dots \times$

原码 不论正数、负数，第一数位为1

补码 符号位和第一数位不同



# 特例

## 6.4

$$S = -\frac{1}{2} = -0.100 \dots 0$$

$$[S]_{\text{原}} = 1.100 \dots 0$$

$$[S]_{\text{补}} = \boxed{1.1}00 \dots 0$$

$\therefore [-\frac{1}{2}]_{\text{补}}$  不是规格化的数

$$S = -1$$

$$[S]_{\text{补}} = \boxed{1.0}00 \dots 0$$

$\therefore [-1]_{\text{补}}$  是规格化的数

### (3) 左规

尾数左移一位，阶码减 1，直到数符和第一数位不同为止

上例  $[x+y]_{\text{补}} = 00, 11; 11. 1001$

左规后  $[x+y]_{\text{补}} = 00, 10; 11. 0010$

$$\therefore x + y = (-0.1110) \times 2^{10}$$

### (4) 右规

当尾数溢出 ( $>1$ ) 时，需右规

即尾数出现  $01. \times \times \dots \times$  或  $10. \times \times \dots \times$  时

尾数右移一位，阶码加 1

## 例6.27 $x = 0.1101 \times 2^{10}$ $y = 0.1011 \times 2^{01}$ 6.4

求  $x+y$  (除阶符、数符外, 阶码取 3 位, 尾数取 6 位)

解:  $[x]_{\text{补}} = 00, 010; 00. 110100$   
 $[y]_{\text{补}} = 00, 001; 00. 101100$

### ① 对阶

$$\begin{array}{r} [\Delta j]_{\text{补}} = [j_x]_{\text{补}} - [j_y]_{\text{补}} = 00, 010 \\ + 11, 111 \\ \hline 100, 001 \end{array}$$

阶差为 +1  $\therefore S_y \rightarrow 1, j_y + 1$

$$\therefore [y]_{\text{补}}' = 00, 010; 00. 010110$$

### ② 尾数求和

$$\begin{array}{r} [S_x]_{\text{补}} = 00. 110100 \\ + [S_y]_{\text{补}}' = 00. 010110 \\ \hline 01. 001010 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{对阶后的 } [S_y]_{\text{补}}' \\ \text{尾数溢出需右规} \end{array}$$

### ③ 右规

$$[x+y]_{\text{补}} = 00, 010; 01. 001010$$

右规后

$$[x+y]_{\text{补}} = 00, 011; 00. 100101$$

$$\therefore x+y = 0. 100101 \times 2^{11}$$

## 4. 舍入

在 对阶 和 右规 过程中，可能出现 尾数末位丢失 引起误差，需考虑舍入

(1) 0 舍 1 入法

(2) 恒置 “1” 法

## 6.4

例 6.28  $x = (-\frac{5}{8}) \times 2^{-5}$   $y = (-\frac{7}{8}) \times 2^{-4}$

求  $x-y$  (除阶符、数符外, 阶码取 3 位, 尾数取 6 位)

解:  $x = (-0.101000) \times 2^{-101}$   $y = (0.111000) \times 2^{-100}$

$[x]_{\text{补}} = 11, 011; 11. 011000$   $[y]_{\text{补}} = 11, 100; 00. 111000$

① 对阶

$$\begin{array}{rcl}
 [\Delta j]_{\text{补}} = [j_x]_{\text{补}} - [j_y]_{\text{补}} & = & 11, 011 \\
 & + & 00, 100 \\
 \hline
 & & 11, 111
 \end{array}$$

阶差为  $-1$   $\therefore S_x \longrightarrow 1, j_x + 1$

$\therefore [x]_{\text{补}}' = 11, 100; 11. 101100$





## ② 尾数求和

$$\begin{array}{r}
 [S_x]_{\text{补}'} = 11.101100 \\
 + [-S_y]_{\text{补}} = 11.001000 \\
 \hline
 110.110100
 \end{array}$$

## ③ 右规

$$[x - y]_{\text{补}} = 11, 100; 10.110100$$

右规后


$$[x - y]_{\text{补}} = 11, 101; 11.011010$$

$$\begin{aligned}
 \therefore x - y &= (-0.100110) \times 2^{-11} \\
 &= \left(-\frac{19}{32}\right) \times 2^{-3}
 \end{aligned}$$

## 5. 溢出判断

6.4

设机器数为补码，尾数为规格化形式，并假设阶符取 2 位，阶码的数值部分取 7 位，数符取 2 位，尾数取  $n$  位，则该补码在数轴上的表示为



## 二、浮点乘除运算

$$x = S_x \cdot 2^{j_x} \quad y = S_y \cdot 2^{j_y}$$

### 1. 乘法

$$x \cdot y = (S_x \cdot S_y) \times 2^{j_x + j_y}$$

### 2. 除法

$$\frac{x}{y} = \frac{S_x}{S_y} \times 2^{j_x - j_y}$$

### 3. 步骤

(1) 阶码采用 **补码定点加**（乘法）**减**（除法）运算

(2) 尾数乘除同 **定点** 运算

(3) 规格化


### 4. 浮点运算部件

阶码运算部件，尾数运算部件



# 6.5 算术逻辑单元

## 一、ALU 电路



组合逻辑电路

$K_i$  不同取值

$F_i$  不同

## 四位 ALU 74181

$M = 0$       算术运算


$M = 1$       逻辑运算

$S_3 \sim S_0$       不同取值，可做不同运算

## 二、快速进位链

6.5

### 1. 并行加法器



$$S_i = \overline{A_i} \overline{B_i} C_{i-1} + \overline{A_i} B_i \overline{C_{i-1}} + A_i \overline{B_i} \overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1}$$

$$C_i = \overline{A_i} B_i C_{i-1} + A_i \overline{B_i} C_{i-1} + A_i B_i \overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1}$$

$$= A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1}$$

$$d_i = A_i B_i \quad \text{本地进位}$$

$$t_i = A_i + B_i \quad \text{传送条件}$$

则  $C_i = d_i + t_i C_{i-1}$



## 2. 串行进位链

6.5

进位链

传送进位的电路

串行进位链

进位串行传送

以 4 位全加器为例，每一位的进位表达式为


$$C_0 = d_0 + t_0 C_{-1} = \overline{\overline{d_0} \cdot \overline{t_0 C_{-1}}}$$

$$C_1 = d_1 + t_1 C_0$$

$$C_2 = d_2 + t_2 C_1$$

$$C_3 = d_3 + t_3 C_2$$

设与非门的级延迟时间为  $t_y$



4位全加器产生进位的全部时间为  $8t_y$

$n$  位全加器产生进位的全部时间为  $2nt_y$

### 3. 并行进位链（先行进位，跳跃进位）

6.5

$n$  位加法器的进位同时产生 以 4 位加法器为例


$$C_0 = d_0 + t_0 C_{-1}$$

$$C_1 = d_1 + t_1 C_0 = d_1 + t_1 d_0 + t_1 t_0 C_{-1}$$

$$C_2 = d_2 + t_2 C_1 = d_2 + t_2 d_1 + t_2 t_1 d_0 + t_2 t_1 t_0 C_{-1}$$

$$C_3 = d_3 + t_3 C_2 = d_3 + t_3 d_2 + t_3 t_2 d_1 + t_3 t_2 t_1 d_0 + t_3 t_2 t_1 t_0 C_{-1}$$


当  $d_i t_i$  形成后，只需  $2.5t_y$  产生全部进位



# (1) 单重分组跳跃进位链

6.5

$n$  位全加器分若干小组，小组内的进位同时产生，  
小组与小组之间采用串行进位 以  $n = 16$  为例



当  $d_i t_i$  形成后

经  $2.5 t_y$

产生  $C_3 \sim C_0$

$5 t_y$

产生  $C_7 \sim C_4$

$7.5 t_y$

产生  $C_{11} \sim C_8$

$10 t_y$

产生  $C_{15} \sim C_{12}$




## (2) 双重分组跳跃进位链

6.5

$n$  位全加器分若干大组，大组中又包含若干小组。每个大组中小组的最高位进位同时产生。大组与大组之间采用串行进位。

以  $n = 32$  为例



### (3) 双重分组跳跃进位链 大组进位分析

6.5

以第 8 小组为例

$$\begin{aligned} C_3 &= d_3 + t_3 C_2 = \underbrace{d_3 + t_3 d_2 + t_3 t_2 d_1 + t_3 t_2 t_1 d_0}_{D_8} + \underbrace{t_3 t_2 t_1 t_0}_{T_8} C_{-1} \\ &= D_8 + T_8 C_{-1} \end{aligned}$$

$D_8$  小组的本地进位 与外来进位无关

$T_8$  小组的传送条件 与外来进位无关 传递外来进位

同理 第 7 小组  $C_7 = D_7 + T_7 C_3$

第 6 小组  $C_{11} = D_6 + T_6 C_7$

第 5 小组  $C_{15} = D_5 + T_5 C_{11}$

进一步展开得

$$C_3 = D_8 + T_8 C_{-1}$$


$$C_7 = D_7 + T_7 C_3 = D_7 + T_7 D_8 + T_7 T_8 C_{-1}$$

$$C_{11} = D_6 + T_6 C_7 = D_6 + T_6 D_7 + T_6 T_7 D_8 + T_6 T_7 T_8 C_{-1}$$

$$C_{15} = D_5 + T_5 C_{11} = D_5 + T_5 D_6 + T_5 T_6 D_7 + T_5 T_6 T_7 D_8 + T_5 T_6 T_7 T_8 C_{-1}$$


## (4) 双重分组跳跃进位链的 **大组** 进位线路 6.5

以第 2 大组为例




## (5) 双重分组跳跃进位链的 小组 进位线路 6.5

以第 8 小组为例 只产生 低 3 位 的进位和 本小组的  $D_8 T_8$



## (6) $n=16$ 双重分组跳跃进位链

6.5



当  $d_i, t_i$  和  $C_{-1}$  形成后


经 $2.5 t_y$	产生 $C_2, C_1, C_0, D_5 \sim D_8, T_5 \sim T_8$
经 $5 t_y$	产生 $C_{15}, C_{11}, C_7, C_3$
经 $7.5 t_y$	产生 $C_{14} \sim C_{12}, C_{10} \sim C_8, C_6 \sim C_4$

串行进位链 经  $32 t_y$  产生 全部进位

单重分组跳跃进位链 经  $10 t_y$  产生 全部进位

# (7) $n=32$ 双重分组跳跃进位链

6.5



当  $d_i t_i$  形成后 经  $2.5 t_y$  产生  $C_2$ 、 $C_1$ 、 $C_0$ 、 $D_1 \sim D_8$ 、 $T_1 \sim T_8$

$5 t_y$  产生  $C_{15}$ 、 $C_{11}$ 、 $C_7$ 、 $C_3$

$7.5 t_y$  产生  $C_{18} \sim C_{16}$ 、 $C_{14} \sim C_{12}$ 、 $C_{10} \sim C_8$ 、 $C_6 \sim C_4$   
 $C_{31}$ 、 $C_{27}$ 、 $C_{23}$ 、 $C_{19}$

**10  $t_y$**  产生  $C_{30} \sim C_{28}$ 、 $C_{26} \sim C_{24}$ 、 $C_{22} \sim C_{20}$



# 作业

- 习题： 6.27, 6.31

