

ACT-2010

Séries Chronologiques

Exercices et solutions

Mis à jour le 9 octobre 2013
François Pelletier
École d'Actuariat, Université Laval

1 Modèles classiques pour séries chronologiques

1.1 Zone de stationnarité pour AR(2) (Théorique)

On obtient les racines de l'équation caractéristique en utilisant la formule quadratique habituelle

$$\frac{\phi_1 \pm \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}}{-2\phi_2}$$

On considère les inverses des deux racines, A_1 et A_2 .

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{2\phi_2}{-\phi_1 - \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}} \\ &= \frac{2\phi_2}{-\phi_1 - \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}} \left[\frac{-\phi_1 + \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}}{-\phi_1 + \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}} \right] \\ &= \frac{2\phi_2(-\phi_1 + \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2})}{\phi_1^2 - (\phi_1^2 + 4\phi_2)} \\ &= \frac{\phi_1 - \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}}{2} \\ A_2 &= \frac{\phi_1 + \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}}{2} \end{aligned}$$

Il y a 2 situations possibles : soit les racines sont réelles ($\phi_1^2 + 4\phi_2 > 0$) ou elles sont complexes ($\phi_1^2 + 4\phi_2 < 0$).

- **Racines réelles** : Comme les racines doivent être plus grandes que 1, alors nécessairement leurs inverses $|A_1| < 1$ et $|A_2| < 1$. Nous avons donc :

$$\begin{aligned} -1 &< \frac{\phi_1 - \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}}{2} < \frac{\phi_1 + \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}}{2} < 1 \\ \Leftrightarrow -2 &< \phi_1 - \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2} < \phi_1 + \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2} < 2 \end{aligned}$$

En observant la première inégalité, on a :

$$\begin{aligned} -2 < \phi_1 - \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2} &\Leftrightarrow \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2} < \phi_1 + 2 \\ &\Leftrightarrow \phi_1^2 + 4\phi_2 < \phi_1^2 + 4\phi_1 + 4 \\ &\Leftrightarrow \phi_2 < \phi_1 + 1 \\ &\Leftrightarrow \phi_2 - \phi_1 < 1 \end{aligned}$$

Ce qui correspond à la seconde condition. En considérant la seconde inégalité, on obtient, de la même façon, la première inégalité :

$$\begin{aligned} \phi_1 + \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2} &< 2 \\ \Leftrightarrow \phi_1 + \phi_2 &< 1 \end{aligned}$$

Ces deux conditions réunies avec un discriminant positif forment la région de stationnarité pour des racines réelles.

- **Racines complexes :** On considère la situation où $\phi_1^2 + 4\phi_2 < 0$. Ici, on aura des conjugués complexes et $|A_1| = |A_2| < 1$ seulement si $|A_1|^2 < 1$.

$$\begin{aligned} |A_1|^2 &= \frac{\phi_1^2 + (-\phi_1^2 - 4\phi_2)}{4} = -\phi_2 \\ &\Leftrightarrow \phi_2 > -1 \\ &\Leftrightarrow |\phi_2| < 1 \end{aligned}$$

Ce résultat réuni avec un discriminant négatif forment la région de stationnarité pour des racines complexes.

1.2 Ordre d'intégration (Théorique)

1. On obtient ce résultat par récurrence. Par exemple, pour $k = 2$, on a :

$$\begin{aligned}
 (1 - B)^2(a_0 + a_1t + a_2t^2) &= (1 - B)((a_0 + a_1t + a_2t^2) \\
 &\quad - (a_0 + a_1(t - 1) + a_2(t - 1)^2)) \\
 &= (1 - B)(a_1 + a_2(2t + 1)) \\
 &= (a_1 + a_2(2t + 1)) - (a_1 + a_2(2(t - 1) + 1)) \\
 &= 2a_2
 \end{aligned}$$

En général, on obtient :

$$\begin{aligned}
 (1 - B)^k(a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_kt^k) &= (1 - B)^{k-1}((a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_kt^k) \\
 &\quad - (a_0 + a_1(t - 1) + a_2(t - 1)^2 + \dots + a_k(t - 1)^k)) \\
 &= (1 - B)^{k-1}(a_1 + 2a_2t + \dots + a_k(t^k - (t - 1)^k))
 \end{aligned}$$

On remarque qu'à chaque itération, le premier terme de la série disparaît. Ainsi, après k itérations, il ne restera que le terme en a_k avec son coefficient, qui correspond à $k!$. On obtient ainsi la solution générale.

2. Une série est dite stationnaire lorsque chaque terme est un terme d'erreur dont la distribution est constante au fil du temps. Ainsi, la distribution de la différence de deux termes consécutifs de la série sera aussi constante au fil du temps. Par exemple :

$$\begin{aligned}
 \epsilon_t &\sim N(0, \sigma^2) \\
 \epsilon_t - \epsilon_{t-1} &\sim N(0, 2\sigma^2)
 \end{aligned}$$

1.3 Inversion de processus d'ordre 1 (Théorique)

1. Un processus AR(1) est défini par $y_t = \gamma_1 y_{t-1} + \epsilon_t$. En développant le terme y_{t-1} , on obtient $y_t = \gamma_1^2 y_{t-2} + \gamma_1 \epsilon_{t-1} + \epsilon_t$. De manière récursive, on obtient $y_t = \gamma_1^t \epsilon_0 + \gamma_1^{t-1} \epsilon_1 + \dots + \gamma_1 \epsilon_{t-1} + \epsilon_t$. ainsi, en faisant tendre $t \rightarrow \infty$, on obtient une représentation MA(∞).
2. Un processus MA(1) est défini par $y_t = \epsilon_t - \theta_1 \epsilon_{t-1}$. On cherche à substituer le terme ϵ_{t-1} . On développe le terme précédent de la série : $y_{t-1} = \epsilon_{t-1} - \theta_1 \epsilon_{t-2}$ et on substitue dans la première expression pour obtenir $y_t = \epsilon_t - \theta_1 y_{t-1} - \theta_1^2 \epsilon_{t-2}$. De manière récursive, on obtient $y_t = -\theta_1^t y_0 - \theta_1^{t-1} y_1 - \dots - \theta_1 y_{t-1} + \epsilon_t$. Lorsque $t \rightarrow \infty$, on obtient une représentation AR(∞).

1.4 Construction d'une série autorégressive (Calculatrice)

On utilise la formule $y_t = \gamma_1 y_{t-1} + \epsilon_t$.

	γ	
$N(0, 1)$	-0,5	0,5
-1,21	-1,2100	-1,2100
0,28	0,8850	-0,3250
1,08	0,6375	0,9175
-2,35	-2,6688	-1,8913
0,43	1,7644	-0,5156
0,51	-0,3722	0,2522
-0,57	-0,3839	-0,4439
-0,55	-0,3580	-0,7720
-0,56	-0,3810	-0,9460
-0,89	-0,6995	-1,3630

Les séries avec une corrélation négative ont tendance à aller dans la direction contraire des termes précédents alors que celles avec une corrélation positive ont tendance à aller dans la même direction que les termes précédents.

Le tableur **constructionserieAR.ods** contient les calculs effectués.



Cette création est mise à disposition selon le contrat Paternité-Partage à l'identique 2.5 Canada de Creative Commons disponible à l'adresse <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ca/deed.fr>

En vertu de ce contrat, vous êtes libre de :

- **partager** — reproduire, distribuer et communiquer l'œuvre ;
- **remixer** — adapter l'œuvre ;
- utiliser cette œuvre à des fins commerciales.

Selon les conditions suivantes :



Attribution — Vous devez attribuer l'œuvre de la manière indiquée par l'auteur de l'œuvre ou le titulaire des droits (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre).



Partage à l'identique — Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette œuvre, vous n'avez le droit de distribuer votre création que sous une licence identique ou similaire à celle-ci.