

関数体の紹介

Riemann 予想と ABC 予想の類似

グミ

自己紹介

一時期主食がグミだったので、グミと名乗っています。

(今はグミをあまり食べないため、汁なし担々麺と名乗るべき)

数学科の修士卒で、専攻は整数論でした。

今は数学とあまり関係ない仕事をしてしまっています。




図 1: <https://x.com/GummyCandy1206>

関数体とは

このスライドでは有限体上の 1 変数有理関数体やその有限次拡大のことを単に関数体と呼ぶ。

たとえば……

$$\frac{2T + 1}{T + 2} \in \mathbb{F}_3(T)$$

$$\frac{2T + 3}{4T + 5} \in \mathbb{F}_7(T)$$

※ \mathbb{F}_q は位数は q の有限体

関数体と特徴

関数体は代数体と似ている。

たとえば……

有理数体	有限体上の1変数有理関数体
整数環	有限体上の1変数多項式環 A
素数 p	既約多項式 P
$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, (m \neq 0)$ は有限	$A/fA, (f \neq 0)$ は有限
$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ は位数 $p-1$ の巡回群	$(A/PA)^*$ は位数 $ P -1$ の巡回群

$$\ast A := F_q[T]$$

$$\ast |P| := \#(A/PA)$$

類似点

Euler のトーシェント関数が同様に定義出来る。 また、Euler の定理も同様に成り立つ。

Theorem 1: Euler の定理.

$f \in A, A \neq 0$ とする。 また、 $a \in A$ を f と互いに素な元とする。 このとき、次が成り立つ。

$$a^{\Phi(f)} \equiv 1 \pmod{f}$$

よって、Fermat の小定理も同様に成り立つ。

また、zeta 関数も同様に定義できる。

Definition 1: zeta 関数.

$$\zeta_A(s) := \sum_{f \in A, f \text{ monic}} \frac{1}{|f|^s}$$

では、相違点は……？

相違点

整数の場合より、証明が容易なケースがある。

例えば……

関数体バージョンの Riemann 予想は 1948 年に Weil によって既に証明されている。

Theorem 2: 関数体バージョンの Riemann 予想.

K を $\mathbb{F}_q(T)$ の有限次拡大体とする。 $\zeta_K(s)$ の零点の実部は $\frac{1}{2}$ である。

Bombieri による、より初等的な証明が院生向けの教科書に載っている。
[1]

→頑張れば修士・学部生でも理解できるかも？

さらに……

関数体バージョンの Fermat の最終定理も証明済み。

Theorem 3: 関数体バージョンの Fermat の最終定理.

K を関数体とし、その定数体 F は完全であるとする。 N を F の標数 p を割り切らない数とする。

次の場合は $X^N + Y^N = 1$ は定数以外の解を持たない。

- K の種数 g_K が0で、 $N \geq 3$ のとき。
- $g_K \geq 1$ で、 $N > 6g_K - 3$ のとき。

※ $x^n + y^n = z^n$ の両辺を z^n で割れば、 $X^n + Y^n = 1$ の形になる。

誰が最初に証明したかはリサーチ不足……

さらにさらに……

関数体バージョンの ABC 予想も証明済み。

Theorem 4: 関数体バージョンの ABC 予想 (定理) .

K を関数体とし、その定数体 F は完全であるとする。 $u, v \in K^*$ を $u + v = 1$ を満たすものとする。 このとき、次が成り立つ。

$$\deg_s u = \deg_s v \leq 2g_K - 2 + \sum_{P \in \text{Supp}(A+B+C)} \deg_K P$$

ここで、 A と B はそれぞれ u と v の K における zero divisor で、 C はそれらの K における polar divisor である。

※ 元の ABC 予想は次のように書きなおせる。

$$u := \frac{A}{C}, v := \frac{B}{C}, \text{ht}\left(\frac{m}{n}\right) := \max(\log|m|, \log|n|)$$

$$\max(\text{ht}(u), \text{ht}(v)) \leq m_\varepsilon + (1 + \varepsilon) \sum_{p \mid ABC} \log p$$

まとめ

- 関数体は代数体と似ている。
- 関数体バージョンの Riemann 予想、Fermat の最終定理、ABC 予想は証明済み。
- それらの証明は院生向けの教科書に載っている。[1]

整数論に興味のある方は、関数体も学んでみるとこれらの証明を理解できるかも？

参考文献

- [1] M. Rosen, Number theory in function fields, vol. 210. Grad. Texts Math., vol. 210. New York, NY: Springer, 2002.

(補記)

- 関数体では整数論の定理だけでなく、他にも Riemann-Roch の定理や、Riemann-Hurwitz の定理も同様に成り立つ。
- 関数体バージョンの ABC 定理の証明は Riemann-Hurwitz の定理を用いる。
- 関数体バージョンの Fermat の最終定理の証明は ABC 定理を用いる。
- 円分体に対応する円分関数体が定義できる。
- ideal 類群も同様に定義できる。
- 関数体バージョンの Kronecker-Weber の定理も成り立つ。

(補記) 年表

西暦	出来事
1670	Fermat 予想が提示される
1859	Riemann 予想が提示される
1948	Weil が関数体バージョンの Riemann 予想を証明する
1985	ABC 予想が提示される
(不明)	関数体バージョンの ABC 予想、Fermat の最終定理が証明される
1995	Wiles が Fermat の最終定理を証明する
2020	望月氏の ABC 予想の証明論文が『RIMS』に掲載される

すべて関数体バージョンが先行して証明されている（と思う）。

※ 年表のソースは Wikipedia です。

全くの余談

$$11^{\ln 11} = 314.159789\dots$$

100π に近い。なんで？