

估算群体中的 indel 附近 单核苷酸突变率相对增加的模型

假设 indel 的发生率 μ_i 很小, 并且是中性的. 对于 indel 和非 indel 等位基因, 令 μ 和 μ_{het} 分别代表纯合子和杂合子中的中性核苷酸突变, 并且令 $f = \mu_{\text{het}}/\mu$. 指定 N_i 和 N_{ni} 分别代表 indel 和非 indel 附近自 MRCA 之后的中性突变数. 我们要寻求期望值 $E(N_i)$ 和 $E(N_{\text{ni}})$.




Figure 1: n 个基因的样本中 k 个基因含有中性 indel I 的中性系谱. 回溯到 I 的时间为 T , T^* 代表回溯到样本共同祖先 MRCA 的额外的时间. I 处的世系数为 ν .

在图 1 的系谱中, n 个基因的样本中 k 个携带 indel, 由 $k \geq 1$ 且 $n - k \geq 1$, 可知 $1 \leq k \leq n - 1$; I 处的世系数为 ν , 由 $\nu \geq 2$ 且 $n - k \geq \nu - 1$, 可知 $2 \leq \nu \leq n - k + 1$. 以 $2N_e$ 个世代为单位衡量所有时间, 其中 N_e 代表有效群体大小. 回溯到 I 的时间是 T , T^* 代表回溯到样本共同祖先 MRCA 的额外的时间. 忽略 k 和 n 的相关性.

根据标准的中性突变模型 (Kimura 1983; Watterson 1975) 有:

$$E(S) = \mu E(T_{\text{tot}}). \quad (1)$$

这个模型的基本假设是:

- 每个子代相对于亲代的突变个数服从泊松分布, 平均值为 μ ;
- μ 为常数, 与群体大小、基因型和时间无关;
- 无选择和重组.

对于一个 indel, T_{het} 和 T_{hom} 分别代表 indel 在杂合子和纯合子中经历的时间. 可知:

$$T = T_{\text{het}} + T_{\text{hom}}, \quad (2)$$

根据方程 1 和 2 可以得到 $E(N_i)$:

$$\begin{aligned} E(N_i) &= 2N_e[\mu_{\text{het}}E(T_{\text{het}}) + \mu E(T_{\text{hom}}) + \mu E(T^*)] \\ &= 2N_e\mu\left[\frac{\mu_{\text{het}}}{\mu}E(T_{\text{het}}) + E(T_{\text{hom}}) + E(T^*)\right] \\ &= \frac{\theta}{2}[fE(T_{\text{het}}) + E(T_{\text{hom}}) + E(T^*)] \\ &= \frac{\theta}{2}[fE(T_{\text{het}}) + fE(T_{\text{hom}}) - fE(T_{\text{hom}}) + E(T_{\text{hom}}) + E(T^*)] \\ &= \frac{\theta}{2}[fE(T) + E(T^*) - (f-1)E(T_{\text{hom}})], \end{aligned} \quad (3)$$

其中 $\theta = 4N_e\mu$.

在过去的 t 时刻, indel 的频率是 $X(t)$, 则:

- indel 在杂合子中的条件概率为 $1 - X(t)$;
- indel 在纯合子中的条件概率为 $X(t)$;
- 非 indel 在杂合子中的条件概率为 $X(t)$;
- 非 indel 在纯合子中的条件概率为 $1 - X(t)$.

在 t 时刻 indel 纯合性的指示函数为:

$$\chi_{\text{hom}}(t) = \begin{cases} 1 & \text{如果 indel 在时刻 } t \text{ 处于纯合子,} \\ 0 & \text{如果 indel 在时刻 } t \text{ 处于杂合子.} \end{cases} \quad (4)$$

因此,

$$T_{\text{hom}} = \int_0^T \chi_{\text{hom}}(t) dt. \quad (5)$$

这导出了条件期望

$$E[T_{\text{hom}}|X(0) = x] = E \left\{ E \left[\int_0^T \chi_{\text{hom}}(t) dt \mid T, X(0) = x \right] \right\} \quad (6)$$

缩写

DNA Deoxyribonucleic acid, 脱氧核糖核酸

MRCA Most Recent Common Ancestor, 最近共同祖先

Indel Insertion/Deletion, 插入/缺失

符号

μ The mean number of mutations, 突变数的平均值

t The number of generations since the MRCA of two sampled homologous sequences, 从 MRCA 到两个抽样的同源序列的世代数

S The number of mutations that have occurred in the descent to the two descendent sequences, 向下到这两个后代的序列过程中产生的突变数

T_{tot} The sum of the lengths of the branches of the genealogy of a sample, 一个样本的系谱中所有分支长度的总和

函数

$E()$ Expected value, 期望值

$\text{Var}()$ Variance of expected value, 期望值的方差

名词

Alleles 等位基因

Coalescent process 溯祖过程

Conditional expectation 条件期望

Demographics 人口统计学

Distribution 分布

Equation 方程

Fitness 适合度

Forces 力量

Gene tree 基因树

Genealogy 系谱

Heterozygote 杂合子

Hitchhiking 搭乘效应

Homologous sequences 同源序列

Homozygote 纯合子

Indicator function 指示函数

Lineage 世系

Moment generating function 矩母函数

Mutations 突变

Patterns 样式

Pedigree 家谱

Polymorphism 多态性

Restriction map 限制性图谱

Sample 样本

Sampled allele 样本等位基因

Sampling 抽样

Segregating sites 隔离位点

Stochastic process 随机过程

Variations 变异

短语

Properties of genealogy 系谱特性

Statistical properties of genealogy 系谱的统计特性

The sampling that produces one generation from the last 上一代形成下一代的模式,
代间模式

Samples of allele 等位基因样本

Bear, bearing, bore 携带

Selectively maintained 选择性保留地

Infinite-sites model 无限位点模型

Infinite allele model 无限等位基因模型

参考文献