

大招 17 判二面角的锐钝问题(三种方法,法三百分百准确,但是耗时较长)




大招内容展示

法一：直接观察

设二面角的平面角为 α ，两个平面的法向量为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ ，求二面角的成角的余弦时，需要通过图形直观感知——也就是老师们常说的由图可知。当 α 为锐角时， $\cos\alpha = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ ；当 α 为钝角时， $\cos\alpha = -|\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ 。

法二：法向量内外分析（直接观察法的变形）

四种情况的分析



当两个半平面的法向量同时都指向二面角的内侧或外侧时，二面角的平面角与两向量的夹角互补： $\cos\alpha = -|\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ 。

当两个半平面的法向量一个指向外侧，一个指向内侧时，此时，二面角的平面角与两向量的夹角相等， $\cos\alpha = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ 。

总结规律（同负异正）

	$\vec{n}_2$ 内	外
$\vec{n}_1$ 内	$\cos\alpha = - \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $	$\cos\alpha = \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $
外	$\cos\alpha = \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $	$\cos\alpha = - \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $

法三：同等异补（万能办法）

设平面 α 和 β 的法向量分别为 $\vec{m}, \vec{n}$ ，在平面 α 和 β 内各取一点 A, B （两点均不在二面角的棱上），则有：

当 $\overrightarrow{AB}$ 与两个法向量的夹角同为钝角或锐角，即 $(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{m}, \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})$ 同号时，二面角的大小与两个法向量的夹角相等。

当 $\overrightarrow{AB}$ 与一个法向量的夹角为锐角、与另一个夹角为钝角，即 $(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{m}, \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})$ 异号时，二面角的大小与两个法向量的夹角互补。

从而得名：同等异补，即向量与法向量同号时二面角大小即为法向量的夹角大小，异号时则互补。

注意：一般先用法一法二，如果不敢确定再用法三兜底

【概念辨析：线面角与二面角】

共同点：均把空间角转化为方向向量与平面法向量的夹角。

线面角：设直线方向向量为 a ，平面法向量为 n ，则 $\sin\theta = \frac{|a \cdot n|}{|a||n|}$ $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，无需判断锐钝。

二面角：设两平面法向量为 n_1, n_2 ，则二面角可能等于两法向量的夹角或其补角，必须结合“直接观察、法向量内外分析、同等异补”判断符号。



大招举例展示

【题型：棱锥二面角判定】

【典例 1】 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ，且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$ 。


(1) 证明：平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ；

(2) 若 $PA = PD = AB = DC$ ， $\angle APD = 90^\circ$ ，求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值。

【答案】 (1) 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ；(2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

【答案思路】 (1) 由已知可得 $AB \perp AP$ ， $CD \perp PD$ ，再由 $AB \parallel CD$ 可得 $AB \perp PD$ ，由线面垂直的判定定理可得 $AB \perp$ 平面 PAD ，再由面面垂直的判定定理即可求证；

(2) 分别取 AD ， BC 的中点 O ， E ，连接 OP ， OE ，证明 OA, OE, OP 两两垂直，如图建立空间直角坐标系，求得平面 PCB 的法向量为 $\vec{n}$ 和平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{m}$ ，利用空间向量夹角公式以及同角三角函数基本关系即可求解。



【详细解析】

【步骤 1 证明面面垂直】

(1) $\because \angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$,

$\therefore PA \perp AB, PD \perp CD$,

又 $\because AB \parallel CD$,

$\therefore PD \perp AB$ 。

又 $\because PD \cap PA = P, PD, PA \subset$ 平面 PAD ,

$\therefore AB \perp$ 平面 PAD ，又 $AB \subset$ 平面 PAB ，平面 $PAB \perp$ 平面 PAD 。

【步骤 2 建系求法向量】


(2) 取 AD 中点 O ， BC 中点 E ，连接 PO ， OE ，

$\because AB \parallel CD$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形，

【步骤 3 判断法向量方向】

检验学习效果的时候到啦



令 $y = 1$ ，则 $z = \sqrt{2}$ ， $x = 0$ ，可得平面 PBC 的 $(0, 1, \sqrt{2})$ ，($z > 0$ ，方向向上，由图可知指向)。
 $\because \angle ADP = 90^\circ$ ，

$\therefore OE \parallel AB$, 由 (1) 知, $AB \perp$ 平面 PAD ,

$\therefore OE \perp$ 平面 PAD ,

又 PO 、 $AD \subset$ 平面 PAD ,


$\therefore OE \perp PO, OE \perp AD$,

又 $PA = PD$,

$\therefore PO \perp AD$,

$\therefore PO$ 、 OE 、 AD 两两垂直.

$\therefore$ 以 O 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系 $O - xyz$.



设 $PA = 2$,

$\therefore D(-\sqrt{2}, 0, 0)$ 、 $B(\sqrt{2}, 2, 0)$ 、 $P(0, 0, \sqrt{2})$ 、 $C(-\sqrt{2}, 2, 0)$,

$\therefore \overrightarrow{PD} = (-\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2})$ 、 $\overrightarrow{PB} = (\sqrt{2}, 2, -\sqrt{2})$ 、 $\overrightarrow{BC} = (-2\sqrt{2}, 0, 0)$,

设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面 PBC 的法向量,

$$\text{由 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PB} = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0, \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} \sqrt{2}x + 2y - \sqrt{2}z = 0, \\ -2\sqrt{2}x = 0. \end{cases}$$

$\therefore PD \perp PA$,

又知 $AB \perp$ 平面 PAD , $PD \subset$ 平面 PAD ,

$\therefore PD \perp AB$, 又 $PA \cap AB = A$,

$\therefore PD \perp$ 平面 PAB ,

即 $\overrightarrow{DP}$ 是平面 PAB 的一个法向量, $\overrightarrow{DP} = (\sqrt{2}, 0,$

$z > 0$, 方向向上, 由图可知指向二面角的外侧).

【步骤4 计算二面角】

$$\therefore \cos \alpha = -\cos \langle \overrightarrow{DP}, \vec{n} \rangle = -\frac{\overrightarrow{DP} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{DP}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{-2}{2\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

都是外侧, 同负异正可得“-”)

故二面角 $A - PB - C$ 的平面角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

【题后反思】 虽然法向量的选择不同, 但是最终计算出的结果是相同的.

【温馨提醒】 高考对空间向量与立体几何的考查主要体现在以下几个方面:

- ① 求异面直线所成的角, 关键是转化为两直线的方向向量的夹角;
- ② 求直线与平面所成的角, 关键是转化为直线的方向向量和平面的法向量的夹角;
- ③ 求二面角, 关键是转化为两平面的法向量的夹角, 建立空间直角坐标系和表示出所需点的坐标是解题的关键, 判断二面角是锐角还是钝角是一个易错点.

【举一反三】

【题型：圆锥二面角求值】


1. 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PO = \frac{\sqrt{6}}{6} DO$.

(1) 证明: $PA \perp$ 平面 PBC ;

(2) 求二面角 $B - PC - E$ 的余弦值.

【答案】 (1) $PA \perp$ 平面 PBC ; (2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

【答案思路】 (1) 法一: 统一设定尺度, 用勾股定理得到两条关键垂直关系, 再判定线面垂直.




【详细解析】 (1) 【法一】：勾股运算法证明 【步骤 1 计算关键线段】 由题设，知$\triangle DAE$为等边三角形，设$AE = 1$， 则$DO = \frac{\sqrt{3}}{2}$，$CO = BO = \frac{1}{2}AE = \frac{1}{2}$，$\therefore PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO = \frac{\sqrt{2}}{4}$， $PC = \sqrt{PO^2 + OC^2} = \frac{\sqrt{6}}{4} = PB = PA$	【步骤 2 判定线面垂直】 又$\triangle ABC$为等边三角形，则$\frac{BA}{\sin 60^\circ} = 2OA$，$\therefore$ $BA = \frac{\sqrt{3}}{2}$， $PA^2 + PB^2 = \frac{3}{4} = AB^2$，则$\angle APB = 90^\circ$，$\therefore$ $PA \perp PB$， 同理$PA \perp PC$，又$PC \cap PB = P$，$\therefore PA \perp$平面 PBC；
---	---

【答案思路】(1) 法二：建立空间直角坐标系，用两个点积为 0 验证线面垂直。


【详细解析】 【法二】：空间直角坐标系法 【步骤 1 建立坐标系】 不妨设$AB = 2\sqrt{3}$，则$AE = AD = \frac{AB}{\sin 60^\circ} = 4$， 由圆锥性质知$DO \perp$平面$ABC$， $\therefore DO = \sqrt{AD^2 - AO^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$，$\therefore$ $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO = \sqrt{2}$。 $\because O$是$\triangle ABC$的外心，因此$AE \perp BC$。 在底面过O作BC的平行线与AB的交点为W， 以O为原点，$\overrightarrow{OW}$方向为x轴正方向，$\overrightarrow{OE}$方向为y轴正方向，$\overrightarrow{OD}$方向为z轴正方向，建 立空间直角坐标系$O - xyz$， 则$A(0, -2, 0)$，$B(\sqrt{3}, 1, 0)$，$C(-\sqrt{3}, 1, 0)$， $E(0, 2, 0)$，$P(0, 0, \sqrt{2})$。 $\therefore \overrightarrow{AP} = (0, 2, \sqrt{2})$，$\overrightarrow{BP} = (-\sqrt{3}, -1, \sqrt{2})$，$\overrightarrow{CP} =$ $(\sqrt{3}, -1, \sqrt{2})$。	【步骤 2 验证线面垂直】 故$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 - 2 + 2 = 0$，$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CP} = 0 -$ $2 + 2 = 0$。 $\therefore AP \perp BP$，$AP \perp CP$。 又$BP \cap CP = P$，故$AP \perp$平面PBC。
--	---


【答案思路】(1) 法三：先证明一条底面弦垂直相关平面，再利用勾股关系补足另一条垂线。

【详细解析】 【法三】：	【步骤 2 构造直角关系】 设$AE \cap BC = F$，则F为BC的中点，连结PF。 设$DO = a$，且$PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO$， 则$AF = \frac{\sqrt{3}}{2}a$，$PA = \frac{\sqrt{2}}{2}a$，$PF = \frac{1}{2}a$。 因此$PA^2 + PF^2 = AF^2$，从而$PA \perp PF$。 又$\because PF \cap BC = F$，$\therefore PA \perp$平面$PBC$。
--	--

 【步骤 1 证明关键垂直】 $\because \triangle ABC$ 是底面圆 O 的内接正三角形, 且 AE 为底面直径, $\therefore AE \perp BC$. $\because DO$ (即 PO) 垂直于底面, BC 在底面内, $\therefore PO \perp BC$. 又 $\because PO \subset$ 平面 PAE, $AE \subset$ 平面 PAE, $PO \cap AE = O$, $\therefore BC \perp$ 平面 PAE. 又 $\because PA \subset$ 平面 PAE, $\therefore PA \perp BC$.	
--	--

【答案思路】(1) 法四: 选取空间基底, 计算关键向量点积并判定线面垂直。

【详细解析】 【法四】: 空间基底向量法  【步骤 1 表示基底向量】 如图所示, 圆锥底面圆 O 半径为 R, 连结 DE, $AE = AD = DE$, 易得 $OD = \sqrt{3}R$,	【步骤 2 验证垂直关系】 $\because PO = \frac{\sqrt{6}}{6} OD$, $\therefore PO = \frac{\sqrt{2}}{2} R$. 以 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD}$ 为基底, $OD \perp$ 平面 ABC, 则 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD},$ $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD}, \text{ 且 } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{1}{2}R^2, \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = 0$ $\therefore \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = \left(-\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD}\right) \cdot \left(-\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD}\right) = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} + \frac{1}{6} \overrightarrow{OD}^2 = 0.$ 故 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$. $\therefore \overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$, 即 $AP \perp BP$. 同理 $AP \perp CP$. 又 $BP \cap CP = P$, $\therefore AP \perp$ 平面 PBC.
---	--



【难度】 0.65

【知识点】面面角的向量求法

【方法总览】 (1) 要证明 $PA \perp$ 平面 PBC , 只需证明 $PA \perp PB$, $PA \perp PC$ 即可;

(2) 方法一: 过 O 作 $ON \parallel BC$ 交 AB 于点 N , 以 O 为坐标原点, OA 为 x 轴, ON 为 y 轴建立如图所示的空间直角坐标系, 分别算出平面 PCB 的一个法向量 $\vec{n}$, 平面 PCE 的一个法向量为 $\vec{m}$, 利用公式 $\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| |\vec{m}|}$ 计算即可得到答案.


【答案思路】(2) 法一：求两个平面的法向量，用直接观察判定二面角为锐角，再取正余弦值。

【详细解析】

(2) 【法一】：空间直角坐标系法

【步骤 1 建系求法向量】

过 O 作 $ON \parallel BC$ 交 AB 于点 N , $\because PO \perp$ 平面 ABC , 以 O 为坐标原点, OA 为 x 轴, ON 为 y 轴建立如图所示的空间直角坐标系,



则

【步骤2 求另一法向量并判角】

设平面 PCE 的一个法向量为 $\vec{m} = (x_2, y_2, z_2)$

由 $\begin{cases} \overrightarrow{m} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \overrightarrow{m} \cdot \overrightarrow{PE} = 0 \end{cases}$, 得

$$\begin{cases} -x_2 - \sqrt{3}y_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \\ -2x_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x_2 = 1, \text{ 得 } z_2 = -\sqrt{2}, y_2 = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore \vec{m} = (1, \frac{\sqrt{3}}{3}, -\sqrt{2})$$

$$\text{故} \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$


设二面角 $B-PC-E$ 的大小为 θ , 由图可知二面角为锐二面角, $\therefore \cos \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.


$E(-\frac{1}{2}, 0, 0), P(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{4}), B(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0), C(-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, 0)$ $\vec{PC} = (-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}), \vec{PB} = (-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}),$ $\vec{PE} = (-\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{4}),$ 设平面PCB的一个法向量为 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1)$, 由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{PC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{PB} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} -x_1 - \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \\ -x_1 + \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \end{cases}$, 令 $x_1 = \sqrt{2}$, 得 $z_1 = -1, y_1 = 0$, $\therefore \vec{n} = (\sqrt{2}, 0, -1)$,	
---	--

【答案思路】(2) 法二：作出二面角的平面角，在直角三角形中求其余弦。

【详细解析】 【法二】【最优解】：几何法 【步骤 1 作出平面角】 设 $BC \cap AE = F$ ，易知 F 是 BC 的中点，过 F 作 $FG \parallel AP$ 交 PE 于 G ，取 PC 的中点 H ，联结 GH ，则 $HF \parallel PB$ 。 由 $PA \perp$ 平面 PBC ，得 $FG \perp$ 平面 PBC 。 由(1)可得， $BC^2 = PB^2 + PC^2$ ，得 $PB \perp PC$ 。 $\therefore FH \perp PC$ ，根据三垂线定理，得 $GH \perp PC$ 。 $\therefore \angle GHF$ 是二面角 $B - PC - E$ 的平面角。	【步骤 2 计算平面角】 设圆 O 的半径为 r ，则 $AF = AB \sin 60^\circ = \frac{3}{2}r$ ， $AE = 2r$ ， $EF = \frac{1}{2}r$ ， $\frac{EF}{AF} = \frac{1}{3}$ ， $\therefore FG = \frac{1}{4}PA$ ， $FH = \frac{1}{2}PB = \frac{1}{2}PA$ ， $\frac{FG}{FH} = \frac{1}{2}$ 。 在 $Rt \triangle GFH$ 中， $\tan \angle GHF = \frac{FG}{FH} = \frac{1}{2}$ ， $\cos \angle GHF = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。 $\therefore$ 二面角 $B - PC - E$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。
---	--

【答案思路】(2) 法三：确定点在另一平面上的正射影，用射影面积比求二面角余弦。

【详细解析】 【法三】：射影面积法  【步骤 1 确定正射影】 如图所示，在 PE 上取点 H ，使 $HE = \frac{1}{4}PE$ ，	【步骤 2 计算面积比】 在 $\triangle PCE$ 中，令 $PC = PE = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ，则 $CE = 1$ ， 易知 $S_{\triangle PCE} = \frac{\sqrt{5}}{4}$ 。 $\therefore S_{\triangle PCH} = \frac{3}{4}S_{\triangle PCE} = \frac{3\sqrt{5}}{16}$ 。 又 $S_{\triangle PCN} = \frac{1}{2}S_{\triangle PBC} = \frac{3}{8}$ ，故 $\cos \theta = \frac{S_{\triangle PCN}}{S_{\triangle PCH}} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{3\sqrt{5}}{16}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。 $\therefore$ 二面角 $B - PC - E$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。
--	---

设 $BC \cap AE = N$，连结 NH。 由 (1) 知 $NE = \frac{1}{4}AE$，$\therefore NH \parallel PA$。故 $NH \perp$ 平面 PBC。 $\therefore$，点 H 在面 PBC 上的射影为 N。 故由射影面积法可知二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为 $\cos\theta = \frac{S_{\triangle PCN}}{S_{\triangle PCH}}$。	
---	--

【整体点评】本题以圆锥为载体，隐含条件是圆锥的轴垂直于底面，(1) 方法一：利用勾股数进行运算证明，是在给出数据去证明垂直时的常用方法；方法二：选择建系利用空间向量法，给空间立体感较弱的学生提供了可行的途径；方法三：利用线面垂直，结合勾股定理可证出；方法四：利用空间基底解决问题，此解法在解答题中用的比较少；


(2) 方法一：建系利用空间向量法求解二面角，属于解答题中求角的常规方法；方法二：利用几何法，通过三垂线法作出二面角，求解三角形进行求解二面角，适合立体感强的学生；方法三：利用射影面积法求解二面角，提高解题速度。



大招应用专训

【题型：棱锥二面角判定】

2. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形， $\angle DAB=60^\circ$, $AB=2AD$, $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 。



(1) 证明： $PA \perp BD$ ；

(2) 若 $PD=AD$ ，求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值。

【答案】(1) 见解析 (2) $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$

【难度】0.65

【答案思路】(1) 用余弦定理与线面垂直补足两条垂线；(2) 建系求两法向量，再用“同角异补”判定二面角与法向量夹角相等。

【详细解析】 【步骤 1 证明线线垂直】 (1) $\because \angle DAB=60^\circ$, $AB=2AD$， 由余弦定理得 $BD=\sqrt{3}AD$， 从而 $BD^2+AD^2=AB^2$	【步骤 2 建系求法向量】 (2) 以 D 为坐标原点，AD 的长为单位长，射线 DA 为 x 轴的正半轴建立空间坐标系 则 $A(1, 0, 0)$, $B(0, \sqrt{3}, 0)$, $C(-1, \sqrt{3}, 0)$, $P(0, 0, 1)$
---	---

又 $\because PD \perp$ 平面 $ABCD$, $BD \subset$ 平面 $ABCD$,
 $\therefore PD \perp BD$.
 故 $BD \perp AD$, 即 $BD \perp$ 平面 PAD ,
 故 $PA \perp BD$

设平面 PAB 的法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - z = 0 \\ x - \sqrt{3}y = 0 \end{cases}, \text{解得 } \vec{n} = (\sqrt{3}, 1, \sqrt{3})$$

 平面 PBC 的法向量 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则

$$\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{3}y - z = 0 \\ x = 0 \end{cases}, \text{解得 } \vec{m} = (0, -1, -\sqrt{3})$$


【步骤3 同等异补判符号】

取半平面 PAB 内点 A 与半平面 PBC 内点 C .

$\because AC \cdot \vec{n} = -\sqrt{3} < 0, AC \cdot \vec{m} = -\sqrt{3} < 0$.
 $\therefore$

两点积同号, 由“同等异补”, 二面角等于两

$$\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = -\frac{2\sqrt{7}}{7}$$




考点: 本题考查线线垂直 二面角

点评: 解决本题的关键是用向量法证明注意计算准确性

【题型: 三棱锥二面角求值】

3. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SB \perp$ 底面 ABC , 且 $SB = AB = 2, BC = \sqrt{6}, \angle ABC = \frac{\pi}{2}$, D 、 E 分别是 SA 、 SC 的中点.



(1) 求证: 平面 $ACD \perp$ 平面 BCD ;

(2) 求二面角 $S-BD-E$ 的平面角的大小.

【答案】(I) 证明过程详见解析；(II) $\frac{\pi}{3}$.

【难度】0.65


【答案思路】(I) 已知 SB 、 AB 、 BC 两两互相垂直，故可建立空间直角坐标系如下图。根据线段长度可求出相应点的坐标，从而可推出 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ ， $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$ ，则

$AD \perp$ 平面 BCD ， $\therefore$ 平面 $ACD \perp$ 平面 BCD 。

(II) 求出两个平面的法向量，利用法向量夹角与二面角平面角的关系求出平面角的大小。

【详细解析】

【步骤 1 建系证明面面垂直】



$\because \angle ABC = \frac{\pi}{2}, \therefore BA \perp BC$

(I) 又因 $SB \perp$ 平面 ABC ， $\therefore$ 建立如上图所示的坐标系。

$\therefore A(2, 0, 0), B(0, 0, 0), C(0, \sqrt{6}, 0)$,

$D(1, 0, 1), E(0, \frac{\sqrt{6}}{2}, 1), S(0, 0, 2)$

易得， $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, 1)$ ， $\overrightarrow{BC} = (0, \sqrt{6}, 0)$ ， $\overrightarrow{BD} = (1, 0, 1)$

又 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ ， $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$ ，

$\therefore \overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{BC}$ ， $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{BD}$ ，

$\therefore AD \perp BC$ ， $AD \perp BD$

又 $BC \cap BD = B$ ， $\therefore AD \perp$ 平面 BCD

又因 $AD \subset$ 平面 ACD ，

$\therefore$ 平面 $ACD \perp$ 平面 BCD 。

【步骤 2 求两个法向量】

$\overrightarrow{BE} = (0, \frac{\sqrt{6}}{2}, 1)$

(II) 又

设平面 BDE 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，

则 $\begin{cases} \overrightarrow{BE} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{BD} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}$ ，即 $\begin{cases} \frac{\sqrt{6}}{2}y + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$

$\therefore \vec{n} = (-1, -\frac{\sqrt{6}}{3}, 1)$

又因平面 SBD 的法向量为 $\overrightarrow{BC} = (0, \sqrt{6}, 0)$

$\therefore \cos \langle \overrightarrow{BC}, \vec{n} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{BC}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{-2}{\sqrt{6} \times \sqrt{\frac{8}{3}}} = -\frac{1}{2}$


【步骤 3 判断锐钝并求值】

由图可得二面角为锐角， $\therefore$ 二面角 $S-BD-E$ 的平面角的大小为 $\frac{\pi}{3}$ 。

考点：□平面与平面的垂直的证明 二面角大小的求法。

【题型：棱锥二面角求值】

4. 如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中， $\triangle ABC \cong \triangle SAB$ ， $\angle SAB = \angle ABC = 90^\circ$ ， $SA = AB = 2AD = 2$ ， $SD = CD = \sqrt{5}$ ， $\tan \angle BCD = 2$ 。



- (1) 求证: 平面 $SAB \perp$ 平面 SBC ;
 (2) 求证: $AD \parallel$ 平面 SBC ;
 (3) 求二面角 $A-SD-C$ 的余弦值.

【答案】(1) 证明见解析; (2) 证明见解析; (3) $-\frac{\sqrt{6}}{6}$.

【难度】0.4

【知识点】线面垂直证明线线垂直、求二面角、证明面面垂直、证明线面平行

【答案思路】(1) 先利用线面垂直的判定定理与性质定理证得 $BC \perp$ 平面 SAB , 再用面面垂直的判定定理证平面 $SAB \perp$ 平面 SBC ;

(2) 先利用平行四边形证得 $AD \parallel BC$, 再利用线面平行的判定定理证 $AD \parallel$ 平面 SBC ;

(3) 利用空间向量求二面角, 先分别求得面 SAD 的法向量为 $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$, 平面 SCD 的法向量 $\vec{n} = (2, -1, 1)$, 利用夹角公式即可求得.

【详细解析】

【步骤1 证明面面垂直】

(1) $\because \angle SAB = 90^\circ$,
 $\therefore SA \perp AB$,
 又 $SA = 2AD = 2, SD = \sqrt{5}$, 由勾股定理知,
 $SA \perp AD$,
 又 $AB \cap AD = A$,
 $\therefore SA \perp$ 面 $ABCD$, $BC \subset$ 面 $ABCD$,
 $\therefore SA \perp BC$,
 又 $\angle ABC = 90^\circ$, 即 $AB \perp BC$, 且 $SA \cap AB = A$,
 $\therefore BC \perp$ 平面 SAB ,
 又 $BC \subset$ 面 SBC ,
 $\therefore$ 平面 $SAB \perp$ 平面 SBC .

【步骤2 证明线面平行】

(2) 如图所示, 过 D 作 $DE \perp BC$, 则 $DE \parallel AB$
 在直角 $\triangle DEC$ 中, $\because \tan \angle BCD = 2, CD = \sqrt{5}$,
 可得 $BE = CE = 1, DE = 2$,
 $\therefore DE = AB$,
 $\therefore$ 四边形 $ABED$ 为矩形,
 $\therefore AD \parallel BC$,
 又 $AD \not\subset$ 平面 $SBC, BC \subset$ 平面 SBC ,
 $\therefore AD \parallel$ 平面 SBC .

【步骤3 判断钝角并求值】


(3) 由题意可知二面角 $A-SD-C$ 为钝角, 设为 θ .

由(1), (2)可知, SA, AD, AB 两两垂直, 如图, 以 A 坐标系原点, 以 AD, AB, AS 为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 可知平面 SAD 的法向量为 $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$, 设平面 SCD 的法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 又 $S(0, 0, 2), D(1, 0, 0), C(2, 2, 0), \overrightarrow{DS} = (-1, 0, 2), \overrightarrow{DC} = (1, 2, 0)$,

$\therefore \begin{cases} \overrightarrow{DS} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} -x + 2z = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$, 令 $x = 2$,
 得 $\vec{n} = (2, -1, 1)$,

$\therefore \cos \theta = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{AB}| |\vec{n}|} = \frac{-2}{2 \times \sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{6}}{6}$.

$\therefore$ 二面角 $A-SD-C$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{6}}{6}$




--	--

【点睛】本题考查了证明面面垂直和线面平行，考查了线面平行的判定定理，线面垂直的判定与性质定理，面面垂直的判定定理，考查了面面角，解题的关键是建立空间直角坐标系，确定平面的法向量，属于中档题.

【题型：动点二面角最值】

5. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $PA = AB = 2$ ， E ， F 分别在棱 PB ， BC 上.



- (1) 当 E 为棱 PB 中点时，求证： $AE \perp EF$ ；
 (2) 当 F 为棱 BC 中点时，求平面 AEF 与平面 PDC 所成的二面角余弦值的最大值.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$.


【难度】0.65

【知识点】面面角的向量求法、空间位置关系的向量证明

【答案思路】(1) 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}\}$ 为正交基底建立空间坐标系 $A-xyz$ ，设 $F(2, a, 0)$ ($0 \leq a \leq 2$)，由 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{EF} = 0$ ，即可证明；


(2) 分别求出平面 AEF 与平面 PDC 的法向量，由二面角的向量公式结合二次函数的性质即可得出答案.

【详细解析】 【步骤1 证明线线垂直】 (1) $\because$ 底面$ABCD$为正方形，$\therefore AB \perp AD$， 又$\because PA \perp$平面$ABCD$，$AB, AD \subset$平面$ABCD$， $\therefore PA \perp AB$，$PA \perp AD$. 以$\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}\}$为正交基底建立空间坐标系$A-xyz$， 则$A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$，$P(0,0,2)$.	【步骤3 求两个法向量】 设平面PCD的法向量为$\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$，则 $\begin{cases} \overrightarrow{PD} \cdot \vec{n}_1 = 2y_1 - 2z_1 = 0, \\ \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n}_1 = 2x_1 = 0, \end{cases}$ 取$z_1 = 1$，则$\vec{n}_1 = (0, 1, 1)$是平面PCD的一个法向量， 设平面AEF的法向量为$\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$，则 $\begin{cases} \overrightarrow{AE} \cdot \vec{n}_2 = bx_2 + (2-b)z_2 = 0, \\ \overrightarrow{AF} \cdot \vec{n}_2 = 2x_2 + y_2 = 0, \end{cases}$ 取$z_2 = b$，则$\vec{n}_2 = (b-2, -2(b-2), b)$是平面$AEF$的一个法向量. 【步骤4 求余弦最大值】 设平面AEF与平面PDC所成角为α，
--	---

 当E为棱PB中点时, $E(1,0,1)$, 设 $F(2,a,0)(0 \leq a \leq 2)$, 则 $\overrightarrow{AE} = (1,0,1)$, $\overrightarrow{EF} = (1,a,-1)$, $\therefore \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{EF} = 1 \times 1 + 0 \times a + 1 \times (-1) = 0$, $\therefore AE \perp EF$. 【步骤2 参数化动点】 (2) 当F为棱BC中点时, $F(2,1,0)$, 设 $E(b,0,2-b)(0 \leq b \leq 2)$, 则 $\overrightarrow{AE} = (b,0,2-b)$, $\overrightarrow{AF} = (2,1,0)$, $\overrightarrow{PD} = (0,2,-2)$, $\overrightarrow{DC} = (2,0,0)$.	则 $\cos \alpha = \cos \langle \overrightarrow{n_1}, \overrightarrow{n_2} \rangle = \frac{ \overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2} }{ \overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2} } = \frac{ -2(b-2)+b }{\sqrt{2} \sqrt{5(b-2)^2+b^2}} = \frac{4-b}{2\sqrt{3b^2-10b+10}}.$ 令 $t = 4 - b \in [2,4]$, 则 $\cos \alpha = \frac{t}{2\sqrt{3t^2-14t+18}} = \frac{1}{2\sqrt{\frac{18}{t^2}-\frac{14}{t}+3}},$ $\therefore$ 当 $\frac{1}{t} = \frac{7}{18}$, 即 $b = \frac{10}{7}$ 时, $\cos \alpha$ 取最大值 $\frac{3\sqrt{10}}{10}.$ $\therefore$ 平面AEF与平面PDC所成的二面角余弦值的最大值为 $\frac{3\sqrt{10}}{10}.$
---	--

【题型：视图二面角求值】

6. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的直观图 (如图(1)) 及左视图 (如图(2)), 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, $PA=PB$.



图(1)

图(2)

- (1) 求证: $AD \perp PB$;
- (2) 求异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值;
- (3) 求平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

【答案】 (1) 证明见解析; (2) $\frac{1}{3}$; (3) $\frac{\pi}{4}$.

【难度】 0.85

【知识点】 线面垂直证明线线垂直、面面角的向量求法、异面直线夹角的向量求法

【答案思路】 (1) 取 AB 的中点 O , 连接 PO , 结合面面垂直的性质判断得到 $AD \perp$ 平面 PAB , 然后证明 $AD \perp PB$ 即可;

(2) 过 O 作 AD 的平行线为 x 轴, 以 OB 、 OP 所在直线分别为 y 、 z 轴, 建立空间直角坐标


系, 再根据直线夹角的向量公式求解即可;

(3) 建立空间直角坐标系, 然后表示平面的法向量, 运用向量的夹角公式得到平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

【详细解析】

【步骤 1 证明线线垂直】

(1) 取 AB 的中点 O , 连接 PO , $\because PA=PB$, 则 $PO \perp AB$,



又 $\because$ 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD=AB$, $PO \subset$ 平面 PAB ,

$\therefore PO \perp$ 平面 $ABCD$,


$\therefore PO \perp AD$, 而 $AD \perp AB$, $PO \cap AB=O$,

$\therefore AD \perp$ 平面 PAB ,

$\therefore AD \perp PB$.

【步骤 2 求异面直线夹角】

(2) 过 O 作 AD 的平行线为 x 轴, 以 OB 、 OP 所在直线分别为 y 、 z 轴, 建立如图空间直角坐标系, 则 $A(0, -1, 0)$, $D(2, -1, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(2, 1, 0)$, $P(0, 0, 2)$, 则 $\overrightarrow{PD} = (2, -1, -2)$, $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$,



$$\text{故 } \cos \langle \overrightarrow{PD}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{PD}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} = \frac{-2}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} \times 2} = -\frac{1}{3},$$

即异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值为 $\frac{1}{3}$.

【步骤 3 求锐二面角】

(3) 易得平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, 0, 0)$.

设平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$,

由 (2) 知 $\overrightarrow{PD} = (2, -1, -2)$, $\overrightarrow{CD} = (0, -2, 0)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PD} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 2x - y - 2z = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x =$$


$$1, \text{ 则 } \vec{m} = (1, 0, 1), \text{ 则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} =$$

$$\frac{1}{\sqrt{2} \times 1} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

即平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小为 $\frac{\pi}{4}$.

【题型：线面角向量求值】

7. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, E 是线段 SB 上的一点, $SA \perp AC$, $AE \perp BC$, $AB = BC = \sqrt{2}$, $SA = AC = 2$.



(1)证明: $SA \perp$ 平面 ABC ;

(2)若平面 $ACE \perp$ 平面 SBC , 求直线 SC 与平面 ACE 所成角的大小.

【答案】(1)证明见解析

(2) 30°

【难度】0.65

【知识点】线面角的向量求法、证明线面垂直


【迁移说明】本题沿用“方向向量—法向量夹角”的共同原理;线面角规定为锐角或直角,计算时取绝对值,无需再判锐钝.

【答案思路】(1)先证明出,利用线面垂直的判定定理得到 $BC \perp$ 平面 SAB ,证明出 $BC \perp SA$,再用线面垂直的判定定理证明 $SA \perp$ 平面 ABC ;

(2)取 AC 的中点 O , 连接 OB , 以 O 为原点, OB , OC 所在的直线分别为 x 轴、 y 轴, 过点 O 与 AS 平行的直线为 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 用向量法求解.

【详细解析】 【步骤 1 证明线面垂直】 (1) $\because AB = BC = \sqrt{2}$, $AC = 2$, $AB^2 + BC^2 = AC^2$, $\therefore \angle ABC = 90^\circ$, 即 $BC \perp AB$. 又 $\because AE \perp BC$, $AB \cap AE = A$, $AE, AB \subset$ 平面 SAB, $\therefore BC \perp$ 平面 SAB. 又 $\because SA \subset$ 平面 SAB, $\therefore BC \perp SA$ $\because SA \perp AC$, $AC \cap BC = C$, $AC, BC \subset$ 平面 ABC, $\therefore SA \perp$ 平面 ABC. 【步骤 2 建系求法向量】 (2) 取 AC 的中点 O, 连接 OB, 则 $OB \perp AC$. 以 O 为原点, OB, OC 所在的直线分别为 x 轴、y 轴, 过点 O 与 AS 平行的直线为 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $A(0, -1, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $S(0, -1, 2)$.	【步骤 3 列向量并定参数】 $\therefore \overrightarrow{AC} = (0, 2, 0)$, $\overrightarrow{BC} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{BS} = (-1, -1, 2)$, $\overrightarrow{SC} = (0, 2, -2)$ 设平面 SBC 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ 则由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BS} = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} -x + y = 0 \\ -x - y + 2z = 0 \end{cases}$ 令 $x = 1$, 得 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 设 $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BS}$, $\lambda \in (0, 1]$, 则 $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BE} - \overrightarrow{BC} = (1 - \lambda, -1 - \lambda, 2\lambda)$. 设平面 ACE 的法向量为 $\vec{m} = (x', y', z')$ 则由 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CE} = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} 2y' = 0 \\ (1 - \lambda)x' + (-1 - \lambda)y' + 2\lambda z' = 0 \end{cases}$ 令 $x' = 1$, 得 $\vec{m} = (1, 0, \frac{\lambda-1}{2\lambda})$ $\because$ 平面 $ACE \perp$ 平面 SBC, $\therefore \vec{n} \cdot \vec{m} = 0$, 即 $1 + \frac{\lambda-1}{2\lambda} = 0$ 解得 $\lambda = \frac{1}{3}$, $\therefore \vec{m} = (1, 0, -1)$
--	--

2) .



【步骤4 计算线面角】

设直线 SC 与平面 ACE 所成角为 θ ,

$$\therefore \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{SC}, \vec{m} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{SC} \cdot \vec{m}|}{|\overrightarrow{SC}| |\vec{m}|} =$$

$$\frac{|0+0+2|}{|\sqrt{1+0+1}| \times |0+4+4|} = \frac{1}{2},$$

故直线 SC 与平面 ACE 所成角为 30° .