

第2课时 倾斜角与斜率

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] C

[详解] $\because O, O_3$ 都为五角星的中心点, $\therefore OO_3$ 平分第三颗小星的一个角; 又五角星的内角为 36° , 可知 $\angle BAO_3 = 18^\circ$. 过 O_3 作 x 轴的平行线 O_3E , 则 $\angle OO_3E = \alpha \approx 16^\circ$, 所以直线 AB 的倾斜角约为 $18^\circ - 16^\circ = 2^\circ$. 故选: C.

2. [答案] A

[详解] 直线 PA 的斜率为 $k_{PA} = (-2+1)/(1-0) = -1$, 直线 PB 的斜率为 $k_{PB} = (1+1)/(2-0) = 1$. 数形结合: 当过 P 的直线 l 绕 P 从 PA 旋转到 PB (保持与线段 AB 有公共点) 时, 其斜率介于 k_{PA} 与 k_{PB} 之间, 故 $k \in [-1, 1]$. 故选: A.

3. [答案] C

[详解] $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且 $\sin \alpha = 3/5 > 0$, 故 α 为锐角或钝角. 当 α 为锐角时, $\cos \alpha = 4/5, k = \tan \alpha = 3/4$; 当 α 为钝角时, $\cos \alpha = -4/5, k = \tan \alpha = -3/4$. 故直线 l 的斜率是 $3/4$ 或 $-3/4$. 选: C.

4. [答案] B

[详解] $\alpha \in [0, \pi), -1 \leq k \leq \sqrt{3}$ 即 $-1 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$. 当 $0 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$ 时, $\alpha \in [0, \pi/3]$; 当 $-1 \leq \tan \alpha < 0$ 时, $\alpha \in [3\pi/4, \pi)$. 所以 $\alpha \in [0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$. 故选: B.

5. [答案] A

[详解] $k_t = (t^2 - 1)/(3 - 2) = t^2 - 1$. 由 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ 得 $t^2 \in [0, 2]$, 故 $k \in [-1, 1]$, 即 $\tan \theta \in [-1, 1]$ (θ 为倾斜角), 得 $\theta \in [0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$. 选: A.

6. [答案] BCD

[详解] 倾斜角为钝角 $\Leftrightarrow$ 斜率存在且为负, 即 A, B 横坐标不等且 $k_{AB} < 0$. $k_{AB} = (1+a-a)/[(1-a)-3] = 1/(-2-a) < 0$, 得 $a+2 > 0$, 即 $a > -2$. 又 $a = -2$ 时 A, B 重合? $a = -2$ 时 $A(3, -1), B(3, -2)$, 横坐标相同、斜率不存在, 倾斜角 90° , 不在“钝角”取值内且 $a > -2$ 已排除. 故 $a > -2$, 选项 $0, 1, 2$ 满足. 选: BCD.

7. [答案] C

[详解] 三点共线 $\Leftrightarrow k_{AB} = k_{AC}$. $k_{AB} = (2-3)/(3+2) = -1/5$; $k_{AC} = (m-3)/(1/2+2) = (m-3)/(5/2) = 2(m-3)/5$. 令 $2(m-3)/5 = -1/5$, 得 $2(m-3) = -1, m = 5/2$. 故选: C.

8. [答案] B

[详解] $\tan \alpha = k_{OA} = \sqrt{2}$. m' 的倾斜角为 2α , 故 $k = \tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 2\sqrt{2}/(1-2) = -2\sqrt{2}$. 选: B. (合理性: $\tan \alpha = \sqrt{2} > 1, \alpha \in (\pi/4, \pi/2), 2\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 确为钝角, $\tan 2\alpha < 0$)

9. [答案] B

[详解] $\sin 210^\circ = -1/2$, 直线方程即 $-x - y - 2 = 0$, $y = -x - 2$, 斜率 $k = 2 \sin 210^\circ = -1$, 故倾斜角为 135° . 选: B.

10. [答案] $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

[详解] 三点能构成三角形 $\Leftrightarrow$ 三点不共线. 由 $k_{AB} \neq k_{AC}$, 即 $(k-1)/(-2-3) \neq (1-1)/(8-3)$, 得 $(k-1)/(-5) \neq 0, k-1 \neq 0, k \neq 1$. 故 k 的取值范围为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

11.[答案] $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3})$

[详解] 正切函数 $k = \tan \alpha$ 在 $[\pi/6, \pi/3)$ 上单调递增, 故 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3)$ 时 $\tan \alpha \in [\tan(\pi/6), \tan(\pi/3)) = [\sqrt{3}/3, \sqrt{3})$, 即斜率 $k \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3})$.

12.[答案] $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$

[详解]

$\theta \in [\pi/4, \pi/2)$ 时,

$k = \tan \theta \in [\tan(\pi/4), +\infty) = [1, +\infty)$;

$\theta \in (\pi/2, 2\pi/3]$ 时,

$k = \tan \theta \in (-\infty, \tan(2\pi/3)] = (-\infty, -\sqrt{3}]$.

故 k 的取值范围为 $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$.

13.[答案] $-2-\sqrt{3}$

[详解] l_1 的斜率为 -1 , 其倾斜角为 135° , 故 l_2 的倾斜角为 $135^\circ - 30^\circ = 105^\circ$.

$k_2 = \tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = (\tan 60^\circ + \tan 45^\circ)/(1 - \tan 60^\circ \cdot \tan 45^\circ) = (\sqrt{3} + 1)/(1 - \sqrt{3}) = (\sqrt{3} + 1)^2/[(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})] = (4 + 2\sqrt{3})/(-2) = -2 - \sqrt{3}$.

所以直线 l_2 的斜率为 $-2 - \sqrt{3}$.

14.[答案] $a = 1$

[详解] 由斜率公式 $k = [(a+1) - (-1)]/(2-a) = (a+2)/(2-a) = 3$ (须 $a \neq 2$),

去分母得 $a+2 = 3(2-a) = 6-3a$, $4a = 4$, $a = 1$, 且 $a = 1 \neq 2$ 满足条件. 所以 $a = 1$.

15.[答案] 120°

[详解] l_2 与 l_1 垂直, 则 l_2 的向上方向与 x 轴正向所成的角为 $30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$ (在 l_2 向上方向取与 l_1 垂直且指向左上的一侧, 另一直线方向与之共线). 由倾斜角的定义及 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, 得 l_2 的倾斜角为 120° .

(说明: 两直线垂直时倾斜角关系的斜率判据在 §2.2.3 学习, 本题只需用平面几何角的运算作答.)

16.[答案] (1) 60° ; (2) 150° ; (3) 90° ; (4) 0° .

[详解] (1) $k = \sqrt{3}$, $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$;

(2) 化为 $y = -(\sqrt{3}/3)x - \sqrt{3}/3$, $k = -\sqrt{3}/3$, $\tan \alpha = -\sqrt{3}/3$, $\alpha = 150^\circ$;

(3) 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角 $\alpha = 90^\circ$;

(4) 直线与 x 轴平行, 倾斜角 $\alpha = 0^\circ$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记