

第一章 空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

第1课时 空间向量及其运算

【学习目标】

1. 理解空间向量及其相关概念（模、零向量、单位向量、相等与相反、共线与共面），会用有向线段表示空间向量；
2. 掌握线性运算（加减、数乘）的法则与运算律，理解共线、共面的充要条件；
3. 掌握数量积的概念与运算律，会求夹角、投影向量，并能用数量积求距离。



知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的概念

1. 定义：在空间，我们把具有大小和方向的量叫做空间向量。与必修2平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为0，是概念题易错点。

2. (1) 字母表示法：用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ 表示。(2) 几何表示法：用有向线段表示，其长度表示空间向量的模。即若向量 $\vec{a}$ 的起点是 A 、终点是 B ，则向量 $\vec{a}$ 也可记作 $\overrightarrow{AB}$ ，其模记为 $|\overrightarrow{AB}|$ 。字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区分，避免混淆。

3. 几类特殊向量（见下表）；规定：零向量与任意向量平行。即对任意向量 $\vec{a}$ ，都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$ 。概念辨析高频条目，判定按定义逐条核对；注意共线向量不要求在同一直线上（平行或重合均可），且零向量与任意向量平行（衔接条目5）。

名称	定义	表示
零向量	长度为 <u>0</u> 的向量叫做零向量	记作 <u>0</u>
单位向量	模等于 <u>1</u> 的向量	用 e 表示， $ e = 1$
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向 <u>相反</u> 的向量	记作 $-\vec{a}$
共线向量或平行向量	表示若干空间向量的有向线段所在的直线 <u>互相平行</u> 或 <u>重合</u>	记作 $\vec{a} \parallel \vec{b}$
相等向量	方向相同且 <u>模相等</u> 的向量	记作 $\vec{a} = \vec{b}$

【诊断分析】 判断正误（正确的打“√”，错误的打“×”）

(1) 两个空间向量的模相等，则这两个向量相等。(×)

【解析】模相等方向未必相同，还可能相反或斜交，两向量未必相等，故×。

(2) 相等向量一定是共线向量。(√)

【解析】相等向量方向相同，所在直线平行或重合，符合共线向量（平行向量）定义，故√。

◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1. 加法可按三角形法则或平行四边形法则作出；减法 $\vec{a} - \vec{b}$ 为减向量终点指向被减向量终点；数乘 $\lambda \vec{a}$ ：当 $\lambda > 0$ 时与 $\vec{a}$ 方向相同，当 $\lambda < 0$ 时方向相反，当 $\lambda = 0$ 时 $\lambda \vec{a} = \vec{0}$ 。全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见条目9与10。

2. 共线的充要条件：对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$)， $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在实数 λ ，使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ 。证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与条目9共面充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

运算	法则要点	运算律举例
加法	三角形法则 / 平行四边形法则（与平面向量一致）	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
减法	减向量终点指向被减向量终点	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
数乘	实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积仍为向量	$(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$
共线	$\vec{a} \parallel \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$)	$\vec{a} = \lambda\vec{b}$

【诊断分析】 判断正误（正确的打“√”，错误的打“×”）

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, $\vec{b} \parallel \vec{c}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$. (×)

【解析】平行传递需 $\vec{b} \neq \vec{0}$; $\vec{b} = \vec{0}$ 时零向量与任意向量平行, 传递性失效, 故 ×.

(2) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则存在唯一实数 λ , 使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$. (×)

【解析】缺 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 前提; 且 $\vec{a} = \vec{0}$ 时 λ 不唯一, 故 ×.

◆ 知识点三 空间向量的夹角、数量积与共面

1. 夹角: 已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 在空间中任取一点 O , 作 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$, 则大小在 $[0^\circ, 180^\circ]$ 内的 $\angle AOB$ 称为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$; 当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时, 称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 互相垂直, 记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$.

夹角范围 (0° 到 180°) 是数量积正负讨论的前提; 易混点: 几何角 (如异面直线所成角) 与向量夹角可能互补, 运算前先分清求的是哪个角.

2. 数量积: 定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$; 规定零向量与任意向量的数量积为 0. 性质: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$.


【微提醒】零向量与任意向量的数量积为 0. 求空间角与距离的核心运算 (支撑条目 16、17、34); 注意数量积不满足结合律, 零向量与任意向量的数量积为 0.

3. 投影向量: (1) 在空间, 向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影:

数量积几何意义的载体, 条目 33 余弦定理与条目 38 点面距的推导都基于投影; 易错点: 投影向量是向量、投影长度是数量.

如图①, 先将它们平移到同一平面 α 内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$, $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量.

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②.



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影:

如图③, 分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线, 垂足分别为 A', B' , 得到向量 $\vec{A'B'}$, 向量 $\vec{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量.

4. 共面的充要条件: 向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$. 证四点共面、线共面的标准工具; 易错点: 定理前提是 p 与 a, b 不共线, 此前提不可漏, 且实数对存在唯一.

概念	要点	记号 / 范围
夹角	$\angle AOB$ ($\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$)	$0^\circ \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq 180^\circ$
数量积	$\vec{a}$ 的模与 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上投影的数量之积	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
投影向量	与 $\vec{b}$ 同向 ($\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle > 0$ 时)	模为 $ \vec{a} \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
共面	存在 (x, y) 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ 不共线)	$\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面


【诊断分析】判断正误 (正确的打“√”, 错误的打“×”)

(1) 若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ 不共线), 则 $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面. (√)

【解析】 $\vec{p}$ 是 $\vec{a}, \vec{b}$ 的线性组合, 由共面向量定理知三向量共面, 故 √.

(2) 两个非零空间向量的数量积大于 0, 则这两个向量的夹角为锐角. (×)

【解析】数量积大于 0 仅保证 $\cos \theta > 0$, 夹角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ)$; $\theta = 0^\circ$ (同向) 时数量积也为正而非锐角, 故 ×.



考点探究 素养提升

◆ 探究点一 | 空间向量的概念辨析 例 1 (简单

(知识点一)) ★典型性理由: 模、方向、零向量、单位向量、相反向量五类概念

一题尽扫, 概念辨析母题 下列说法正确的是 ()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
 B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
 C. 零向量是没有方向的向量;
 D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

【分析】根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案.

【详解】解: 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错;

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则它们的和为零向量, B 对; 零向量的方向是任意的, C 错;

两个单位向量只是模都为 1, 方向不一定相同, D 错. 故选: B.

变式 1 (简单 (知识点一)) 下列说法错误的是 ()

- A. 零向量与任意向量都平行;
 B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
 C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
 D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$


【答案】D

【素养小结】①识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型。②操作: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定。③收束: 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选。

◆ 探究点二 | 空间向量的线性运算 例 1 (简单 (知识点二)) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $\vec{CA} = \vec{a}, \vec{CB} = \vec{b}, \vec{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

【分析】连接 CA_1 , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1}$, 结合已知即可求表达式。

【详解】连接 CA_1 , 则 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA_1} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$.




故答案为: $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

变式 1 (简单 (知识点二)) 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AD} = \vec{b}, \vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{D_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

【答案】 $\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$

【素养小结】①识别: 在几何体中给出若干已知向量、要求表示指定向量时, 判归本题型。②操作: 为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链, 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换, 最后合并化简得表达式。③收束: 复查每段方向与起讫点, 防抄错向量。

◆ 探究点三 | 用基底表示向量 例 1 (简单 (知识点二)) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{A_1E} = \frac{1}{4}\vec{A_1C_1}$, 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.



【分析】结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得 x, y 的值。

【详解】 $\vec{AE} = \vec{AA_1} + \vec{A_1E} = \vec{AA_1} + \frac{1}{4}\vec{A_1C_1} = \vec{AA_1} + \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AD})$, 所以 $x = 1, y = \frac{1}{4}$. 故答案为: $1; \frac{1}{4}$

变式 1 (简单 (知识点二)) 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $\vec{A_1E} = \frac{1}{2}\vec{A_1C_1}$, 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

【答案】 $x = 1, y = \frac{1}{2}$

【素养小结】①识别: 指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底向量的线性组合并求系数时, 判归本题型。②操作: 先把目标向量沿几何路径分解为基底向量的和, 再把各段按比例关系代入基底。③收束: 比较等式两边系数求出待定值, 防漏写中间段。

◆ 探究点四 | 共面向量的判定 例 1 (简单 (知识点三)) 有下列说法:

- ①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面; ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③若 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$, 则 P, M, A, B 共面; ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$. 其中正确的是 ()

- A. ①②③④; B. ①③④;
 C. ①③; D. ②④

【分析】利用空间向量共面定理逐一判断即可。

【详解】若 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 由 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 知 $\vec{p}$ 一定与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面,

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 则满足共面定理, $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, ①对;

同理③对; 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 则不一定有 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 故②不对; 同理④不对, 故选: C.

变式 1 (简单 (知识点三)) 已知 $\vec{MP} = 3\vec{MA} - 2\vec{MB}$, 判断 P, M, A, B 四点是否共面, 并说明理由。

【答案】共面 ($\vec{MP}$ 可由 $\vec{MA}, \vec{MB}$ 线性表示, 故 $\vec{MP}, \vec{MA}, \vec{MB}$ 共面, 即 P 在平面 MAB 内)

【素养小结】①识别：题干给出 $p=xa+yb$ 或 $MP=xMA+yMB$ 一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时，判归本题型。②操作：核对充要条件的前提（两向量不共线或三点不共线）是否齐备，再对缺前提的说法举共线反例排除。③收束：最后汇总正确序号定选项。

◆ 探究点五 | 数量积的概念与运算律 例1（简单（知识点三））设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量，下列各式中正确的有（ ）

- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
 B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
 C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
 D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

【分析】根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可；

【详解】解：对于 A: $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$ ，故 A 正确；

对于 B: 因为向量不能做除法，即 $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ 无意义，故 B 错误；

对于 C: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ，故 C 错误；


对于 D: $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$ ，故 D 正确；故选：AD

变式 1（简单（知识点三））已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ ，则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____。

【答案】 -11

【素养小结】①识别：题干列出数量积相关的若干等式（平方、商式、乘积展开）要求判断正误时，判归本题型。②操作：按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 逐式展开核验，展开后移项验算。③收束：警惕向量无除法、数量积无结合律等误用。

◆ 探究点六 | 数量积求夹角与投影（非坐标法） 例1（中档（知识点三））如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，求向量 $\vec{BC_1}$ 与 $\vec{AC}$ 的夹角的大小。



【分析】方法 1：结合图形，平移向量，利用空间向量的夹角定义来求，但要注意向量夹角的范围；

方法 2：先求 $\vec{BC_1} \cdot \vec{AC}$ ，再利用公式 $\cos \langle \vec{BC_1}, \vec{AC} \rangle = \frac{\vec{BC_1} \cdot \vec{AC}}{|\vec{BC_1}| \cdot |\vec{AC}|}$ 求 $\cos \langle \vec{BC_1}, \vec{AC} \rangle$ ，最后确定 $\langle \vec{BC_1}, \vec{AC} \rangle$ 即可。

【详解】解：方法 1：因为 $\vec{AD_1} = \vec{BC_1}$ ，所以 $\angle CAD_1$ 的大小就等于 $\langle \vec{BC_1}, \vec{AC} \rangle$

因为 $\triangle CAD_1$ 为等边三角形，所以 $\angle CAD_1 = 60^\circ$ ，所以 $\vec{BC_1}$ 与 $\vec{AC}$ 的夹角的大小为 60° 。

方法 2. 设正方体的棱长为 1， $\vec{BC_1} \cdot \vec{AC} = (\vec{BC} + \vec{CC_1}) \cdot (\vec{AB} + \vec{BC}) = (\vec{AD} + \vec{AA_1}) \cdot (\vec{AB} + \vec{AD}) = \vec{AD} \cdot \vec{AB} + |\vec{AD}|^2 + \vec{AA_1} \cdot \vec{AB} + \vec{AA_1} \cdot \vec{AD} = 0 + |\vec{AD}|^2 + 0 + 0 = |\vec{AD}|^2 = 1$ 又因为 $|\vec{BC_1}| = \sqrt{2}, |\vec{AC}| = \sqrt{2}$ ，所以 $\cos \langle \vec{BC_1}, \vec{AC} \rangle = \frac{\vec{BC_1} \cdot \vec{AC}}{|\vec{BC_1}| \cdot |\vec{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ ，因为 $\langle \vec{BC_1}, \vec{AC} \rangle \in [0, \pi]$ ，所以 $\vec{BC_1}$ 与 $\vec{AC}$ 的夹角的大小为 60° 。

变式 1（中档（知识点三））在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = 2, AD = 2, AA_1 = 1$ ，则向量 $\vec{AB_1}$ 与 $\vec{AC}$ 夹角的余弦值为_____。

【答案】 $\frac{\sqrt{10}}{5}$

【素养小结】①识别：题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时，判归本题型。②操作：先平移向量使起点共点或选不共面的三个向量作基底，再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长。③收束：最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角。

◆ 探究点七 | 数量积条件求参（夹角与垂直）

例 1（中档（知识点三））★典型性理由：数量积条件翻译成不等式再

剔除共线解，条件求参高考高频母题 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，且 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ ，则使向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是_____。

【分析】根据 $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \cdot (\lambda \vec{a} - 2\vec{b}) < 0$ ，得出方程求得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$ ，若向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时，则存在实数 $k < 0$ 使得 $\vec{a} + \lambda \vec{b} = k(\lambda \vec{a} - 2\vec{b})$ 成立，得到方程组 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$

无解，即可得到答案。

【详解】由向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，且 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ ，可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$ ，

因为向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角，可得 $\cos \langle \vec{a} + \lambda \vec{b}, \lambda \vec{a} - 2\vec{b} \rangle < 0$ 且 $\cos \langle \vec{a} + \lambda \vec{b}, \lambda \vec{a} - 2\vec{b} \rangle \neq -1$ ，由 $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \cdot$


$(\lambda \vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 即 $\lambda \vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda \vec{b}^2 < 0$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$, 解得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 存在实数 $k < 0$, 使得 $\vec{a} + \lambda \vec{b} = k(\lambda \vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 可得
$$\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$$
, 此时方程组无解, 所以不存在实数 k 使得向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线, 所以实数 λ 的取值范围是 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$.

变式 1 (简单 (知识点三)) 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} + \lambda \vec{b}$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ$, $\vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$

【素养小结】 ①识别: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型。②操作: 第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程 (锐角 $\cos > 0$ 、钝角 $\cos < 0$ 、垂直 $\cos = 0$)。③收束: 再求解并剔除使两向量共线的参数, 最后写出参数值或取值范围。

◆ 探究点八 | 数量积求距离 (展开法) 例 1 (中档 (知识点三)) 如图, 在大小为 45° 的二面角 $AEFD$ 中, 四边形 $ABFE$, $CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是 ()



- A. $\sqrt{3}$;
B. $\sqrt{2}$;
C. 1;
D. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

【分析】 由 $\vec{DB} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}$, 利用数量积运算性质展开即可得到答案

【详解】 $\because \vec{DB} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}$, $\therefore |\vec{DB}|^2 = |\vec{BF}|^2 + |\vec{FE}|^2 + |\vec{ED}|^2 + 2\vec{BF} \cdot \vec{FE} + 2\vec{FE} \cdot \vec{ED} + 2\vec{BF} \cdot \vec{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$ 故 $|\vec{DB}| = \sqrt{3 - \sqrt{2}}$ 故选 D

【点睛】 本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础。

变式 1 (简单 (知识点三)) 在大小为 60° 的二面角 $A-EF-D$ 中, 四边形 $ABFE$, $CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离为 _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【素养小结】 ①识别: 题干在含二面角的拼接图形中求两点距离时, 判归本题型。②操作: 第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链, 再对模平方作数量积展开, 逐项代入模长与夹角 (端点处两条垂线段的夹角由二面角决定, 注意取 45° 还是 135°)。③收束: 最后开方得距离。

◆ 探究点九 | 数量积求距离 (折叠矩形) 例 1 (中档 (知识点三))


★ 典型性理由: 折叠背景下向量链平方展开求距离, 方法可迁移到任意折叠距离问题

已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使平面 ABC 与平面 ACD 垂直, 则 $|\vec{BD}| =$ ()。

- A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$;
B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$;
C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$;
D. 2

【分析】 过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 由 $\vec{BD} = \vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND}$, 平方后结合长度和垂直关系可得解。

【详解】



过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 则可得 $AM = \frac{1}{2}$, $BM = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $CN = \frac{1}{2}$, $DN = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $MN = 1$. 由于 $\vec{BD} = \vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND}$, 所以 $|\vec{BD}|^2 = (\vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND})^2 = |\vec{BM}|^2 + |\vec{MN}|^2 + |\vec{ND}|^2 + 2(\vec{BM} \cdot \vec{MN} + \vec{MN} \cdot \vec{ND} + \vec{BM} \cdot \vec{ND}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$, 所以 $|\vec{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 故选: A.

【点睛】 本题主要考查了空间向量数量积的应用, 属于基础题。

变式 1 (中档 (知识点三)) 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 60° , 则 $|\vec{BD}| =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{13}}{2}$

【素养小结】 ①识别: 题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时, 判归本题型。②操作: 第一步在折后图形中过两点对折痕作垂线定出垂足, 再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开。③收束: 最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离。

1. (简单(知识点三)) 已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____. (提示: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$)

【答案】3

2. (简单(知识点二)) 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$;
B. 2;
C. $-\frac{1}{2}$;
D. 3

【答案】B

3. (简单(知识点三)) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量, 则“ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件;
B. 必要不充分条件;
C. 充要条件;
D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

4. (简单(知识点二)) 在空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 AB, CD 的中点, 则 $\frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC}) =$ ()

- A. $2\vec{EF}$;
B. $-\vec{EF}$;
C. $\vec{FE}$;
D. $\vec{EF}$

【答案】D

5. (简单(知识点三)) 已知 $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 3$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$ _____. (提示: 先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, 再对 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b})^2$ 展开)

【答案】 $\sqrt{13}$