

第二章 平面解析几何

2.5.2 椭圆的几何性质

【学习目标】

1. 掌握椭圆的范围、对称性、顶点、长轴与短轴、离心率等简单几何性质,会用离心率刻画并比较椭圆的扁平程度;
2. 会依条件(长轴、离心率、过点、焦点位置等)求椭圆的标准方程,能判定点与椭圆的位置关系;
3. 能综合运用定义与性质处理焦点三角形、中心弦拼合、距离最值与实际情境问题,会用同焦点椭圆族、蒙日圆等结论求解.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 椭圆的简单几何性质

1. 范围:_____ (用 a, b 表示 x, y 的范围); 对称性: 椭圆关于_____ 对称; 顶点: $(\pm a, 0), (0, \pm b)$; 长轴长_____, 短轴长_____; 离心率 $e = c/a$, 范围_____, e 越大椭圆越_____.

[注意] 离心率刻画“扁”的程度: b/a 越小 (e 越大) 越扁; $a^2 = b^2 + c^2$ 是三个基本量的纽带, 与双曲线差号勿混.

◆ 知识点二 依条件求标准方程·点与椭圆位置

1. 待定系数: 先定焦点位置设标准形, 由条件(长轴、离心率、过点等)列方程组解 a^2, b^2 ; 含参方程看_____ 分母定焦点位置.

[注意] 点 $P(x_0, y_0)$ 与椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的位置: 把坐标代入左端, 大于 1 在外、等于 1 在上、小于 1 在内.

◆ 知识点三 性质与定义的综合应用

1. 常用拼合: 过焦点的弦与另一侧焦半径凑 $4a$; 中心对称弦与两焦点构成平行四边形; 点到直线距离最值可参数化 ($x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$) 或平移切线求.

[注意] 同焦点椭圆族: $a^2 - b^2 = c^2$ 为定值, 焦点随大分母在何轴; 蒙日圆: 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的两条互相垂直切线的交点轨迹为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ (本课时讲解位内容).

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 椭圆的离心率 e 越小, 椭圆越扁. ()

(2) 椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 关于 x 轴、 y 轴和原点都对称. ()

(3) 点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 内部的充要条件是 $x_0^2/a^2 + y_0^2/b^2 < 1$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 依条件求方程·点与椭圆位置

例 1 [简单(知识点二)] 设点 M 是椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一动点, 椭圆的长轴为 $4\sqrt{3}$, 离心率为 $\sqrt{6}/3$, 求椭圆 C 的方程.

变式 2 [简单(知识点二)] 写出一个焦点在 x 轴上, 且离心率为 $\sqrt{6}/3$ 的椭圆的标准方程:_____.

变式 3 [简单(知识点二)] 若点 $A(m, 1)$ 在椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 的内部, 则实数 m 的取值范围是_____.

变式 4 [简单(知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/9 + y^2/b^2 = 1 (b > 0)$ 上的动点 P 到右焦点距离的最小值为 $3 - 2\sqrt{2}$, 则 $b =$ ()

- A. 1 B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

②操作: 待定系数设标准形, a, b, c 三量两个方程即可定; 开放题先写 a^2, b^2 的约束关系再取特值; 点位

判定代入左端与1比大小. ③收束: 焦点位置由“大分母”或题设限定认准; 开放题结论须注明不唯一, 并给出通式或两例.

◆ 探究点二 性质与结论的应用

例 5 [简单(知识点三)] 若过圆 $x^2 + y^2 = 8$ 上任一点向椭圆 $x^2/6 + y^2/b^2 = 1 (0 < b < \sqrt{6})$ 作切线, 且两条切线互相垂直, 则 $b^2 =$ ()

- A. 1 B. 3
C. 2 D. 5

变式 6 [简单(知识点三)] 已知椭圆 C 的方程为 $9x^2 + 4y^2 = 36$: (1) 与椭圆 C 有相同焦点的椭圆有多少个? 写出其中两个椭圆的方程; (2) 与椭圆 C 有相同焦点且经过点 $(4, \sqrt{5})$ 的椭圆有几个? 写出符合条件的椭圆方程.

变式 7 [简单(知识点三)] 已知点 A, B 是椭圆 $x^2/16 + y^2/12 = 1$ 上不关于长轴对称的两点, 且 A, B 两点到点 $M(m, 0)$ 的距离相等, 求实数 m 的取值范围.

变式 8 [简单(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 四点 $P_1(1, 1), P_2(0, 1), P_3(-1, \sqrt{3}/2), P_4(1, \sqrt{3}/2)$ 中恰有三点在椭圆 C 上, 求 C 的方程.

变式 9 [简单(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 直线 l 经过椭圆的右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点(点 P 在第二象限). 若点 Q 关于 x 轴的对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 则直线 l 的方程是_____.

变式 10 [简单(知识点三)] 天文学家开普勒的行星运动定律可表述为: 绕同一中心天体的所有行星的椭圆轨道的半长轴 a 的三次方跟它的公转周期 T 的二次方的比值都相等, 即 $a^3/T^2 = k, k = GM/4\pi^2$, 其中 M 为中心天体质量, G 为引力常量. 已知地球绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 1.5

亿千米, 地球的公转周期为 1 年, 距离太阳最远的冥王星绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 60 亿千米, 取 $\sqrt{10} = 3.1$, 则冥王星的公转周期约为 ()

- A. 157 年 B. 220 年
C. 248 年 D. 256 年

②操作: 先辨认性质结论(蒙日圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 、同焦点族 $a^2 - b^2$ 定值、中心对称拼合 $4a$), 把几何条件翻译成 a, b, c 的方程; 对称等距问题设坐标代入距离公式约去公因式. ③收束: 约分前先证公因式非零(反设重合导矛盾); 定号条件(象限、范围)最后回验一遍, 两端开闭看等号能否取到.

◆ 探究点三 综合拼合与最值

例 11 [中档(知识点三)] AB 是平面上长度为 4 的一条线段, P 是平面上一个动点, 且 $|PA| + |PB| = 6, M$ 是 AB 的中点, 则 $|PM|$ 的取值范围是_____.

变式 12 [中档(知识点三)] 设椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 过原点 O 的动直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 那么 $\triangle ABF$ 的周长的取值范围为_____.

变式 13 [中档(知识点三)] 点 P 在椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 上, 点 P 到直线 $3x - 4y = 24$ 的最大距离和最小距离为_____.

变式 14 [中档(知识点三)] 在大西北的荒漠上, A, B 两地相距 2 km, 正准备在荒漠上围成一片以 AB 为一条对角线的平行四边形区域, 建立农艺园. 按照规划, 围墙总长度为 8 km. (1) 农艺园的最大面积能达到多少? (2) 该荒漠上有一条直线型水沟刚好过点 A , 且与 AB 成 45° 角, 现要对整条水沟进行加固改造, 但考虑到今后农艺园内的水沟要重新设计改造, 因此该水沟被农艺园围住的部分暂不加固, 那么暂不加固的部分有多长?

②操作: 先把几何情境翻译成椭圆(定义三查: 定值、定值大于焦距、剔退化), 再选工具——中心对

称拼 $2a$ 、参数化或平移切线求最值、设 $x = my$ 避斜率讨论. ③收束: 范围题开闭端逐一交代(退化位取开、可取位取闭); 实际题答数带单位, 模型前提(不退化、不共线)在文首声明.

◆ 探究点四 压轴构形

例 15 [难(知识点三)] 椭圆 $C: x^2/18 + y^2/b^2 = 1$ 的上、下顶点分别为 A, C , 如图, 点 B 在椭圆上, 平面四边形 $ABCD$ 满足 $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$, 且 $S_{\triangle ABC} = 2S_{\triangle ADC}$, 则该椭圆的短轴长为_____.

[图注: 椭圆长轴在 x 轴 ($a^2 = 18$), A 为上顶点、 C 为下顶点, B, D 在椭圆上, 四边形 $ABCD$ 以 AC 为对角线. 照录自源]

变式 16 [难(知识点三)] (多选题) 画法几何的创始人——法国数学家加斯帕尔·蒙日发现: 与椭圆相切的两条垂直切线的交点的轨迹是以椭圆中心为圆心的圆, 我们通常称这个圆为蒙日圆. 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点, A, B 为椭圆上两个动点, 直线 l 的方程为 $bx + ay - a^2 - b^2 = 0$, 下列说法正确的是()

- A. C 的蒙日圆的方程为 $x^2 + y^2 = 3b^2$
- B. 对直线 l 上任意一点 P , $PA \cdot PB > 0$
- C. 过点 A 作 l 的垂线, 垂足为 H , 则 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b$
- D. 若矩形 $MNGH$ 的四条边均与 C 相切, 则矩形 $MNGH$ 面积的最大值为 $6b^2$

②操作: 直角转直径圆(圆周角定理逆用)先证共圆; 蒙日圆题先化简 a, b, c 关系再逐项核对; 切线矩形用外接圆直径 + 均值不等式. ③收束: 多选题逐项独立判定、反例一举即错; 存在性核验(构型可取)随题载明防假解.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单(知识点一)] 下列四个椭圆中, 形状最扁的是()

- A. $x^2/20 + y^2/9 = 1$
- B. $x^2/20 + y^2/10 = 1$
- C. $x^2/20 + y^2/11 = 1$
- D. $x^2/20 + y^2/12 = 1$

18. [简单(知识点三)] 已知两定点 $A(-2, 0)$ 和 $B(2, 0)$, 动点 $P(x, y)$ 在直线 $l: y = x + 4$ 上移动, 椭圆 C 以 A, B 为焦点且经过点 P , 则椭圆 C 的离心率的最大值为()

- A. $\sqrt{10}/10$
- B. $\sqrt{10}/5$
- C. $\sqrt{5}/5$
- D. $2\sqrt{5}/5$

19. [简单(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{6}/3$, 直线 $ax - by = 0$ 与圆 $M: x^2 + y^2 - mx + 1/4 = 0$ 相切, 则实数 m 的值是()

- A. ± 1
- B. ± 2
- C. ± 4
- D. ± 8

20. [简单(知识点一)] 椭圆 $x^2/5 + y^2/m = 1$ 的焦点坐标是_____.

21. [简单(知识点一)] 根据下列条件, 求椭圆的离心率: (1) 长轴与短轴之比为 $3 : 2$; (2) 以短轴的两个端点和一个焦点为顶点的三角形是等边三角形.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记