

第2课时 空间向量的数量积

【学习目标】

1. 理解空间向量夹角、数量积与投影向量的概念,掌握数量积的运算律;
2. 会用数量积(基底法)求空间向量的夹角与投影向量;
3. 掌握用数量积求空间中两点间的距离(展开法与折叠模型),体会向量运算的几何本质.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的夹角

1. 夹角: 已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 在空间中任取一点 O , 作 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$, 则大小在 $[0, \pi]$ 内的 $\angle AOB$ 称为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$; 当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时, 称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$.

[注意] 夹角范围 (0° 到 180°) 是数量积正负讨论的前提; 易混点: 几何角 (如异面直线所成角) 与向量夹角可能互补, 运算前先分清求的是哪个角.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 两个非零空间向量的夹角大小与这两个向量起点的位置有关. ()
- (2) 空间向量的夹角与异面直线所成角的取值范围相同. ()

◆ 知识点二 空间向量的数量积

1. 数量积: 定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$; 规定 $\vec{0} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{0} = 0$; 与任意向量的数量积为 0. 性质: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$.

[注意] 求空间角与距离的核心运算; 注意数量积不满足结合律, 零向量与任意向量的数量积为 0.

2. 运算律: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (交换律); $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$ (数乘结合律); $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$ (分配律).

[注意] 与平面向量数量积的运算律形式一致, 类比迁移即可; 警惕 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 与 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$ 一般不相等.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 两个非零空间向量的数量积大于 0, 则这两个向量的夹角为锐角. ()
- (2) 对任意空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 都有 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$. ()


◆ 知识点三 投影向量

1. 投影向量: (1) 在空间, 向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影:

[注意] 数量积几何意义的载体, 后续三余弦定理与点面距的推导都基于投影; 易错点: 投影向量是向量, 投影长度是数量.

如图①, 先将它们平移到同一平面 α 内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$, $\vec{c} = |\vec{a}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量.

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②.



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影:

如图③, 分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线, 垂足分别为 A', B' , 得到向量 $\vec{A'B'}$, 向量 $\vec{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量是与 $\vec{a}$ 共线的向量. ()
- (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量为 $\vec{0}$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 数量积的概念与运算律


例 1 (多选题) [简单 (知识点二)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
 B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
 C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
 D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

变式 1 [简单 (知识点二)] 已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.

◆ 探究点二 数量积求夹角与投影

例 1 [中档 (知识点一)] 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小.



变式 1 [中档 (知识点一)] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $AD = 2$, $AA_1 = 1$, 则向量 $\overrightarrow{AB_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 夹角的余弦值为 _____.


◆ 探究点三 数量积条件求参

例 1 [中档 (知识点二)] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是 _____.

变式 1 [简单 (知识点二)] 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ$, $\vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

◆ 探究点四 数量积求距离 (展开法)

例 1 [中档 (知识点二)] 如图, 在大小为 45° 的二面角 $AEFD$ 中, 四边形 $ABFE$, $CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是 ()



- A. $\sqrt{3}$;
 B. $\sqrt{2}$;
 C. 1;
 D. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

变式 1 [简单 (知识点二)] 在大小为 60° 的二面角 $A-EF-D$ 中, 四边形 $ABFE$, $CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离为 _____.

◆ 探究点五 数量积求距离 (折叠矩形)

例 1 [中档 (知识点二)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使平面 ABC 与平面 ACD 垂直, 则 $|\overrightarrow{BD}| =$ ().

- A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$;
 B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$;
 C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$;
 D. 2

变式 1 [中档 (知识点二)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 60° , 则 $|\overrightarrow{BD}| =$ _____.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单 (知识点二)] 已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, 且 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ ()

- A. -1;
 B. 1;
 C. -2;
 D. 2

2. [简单 (知识点二)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量, 则 “ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ” 是 “ $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件;
 B. 必要不充分条件;
 C. 充要条件;
 D. 既不充分也不必要条件

3. [简单 (知识点一)] 已知非零空间向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ ()

- A. 30° ;
 B. 45° ;
 C. 60° ;
 D. 90°

4. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 4$, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60° , 则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量的模为_____. (提示: 投影向量与 $\vec{b}$ 共线, 其模为 $|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$)

5. [中档(知识点二)] 已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$, 则 $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + 3\vec{b}) =$ _____. (提示: 按运算律展开, 其中 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记