

高中同步讲练

人教 B 版选必 1

数 学

版次：2026 年 08 月

内部资料·仅供教学使用

人教 B 版选必 1·使用说明

一、视觉锚图例

（式样＝本册现行版式真实呈现；正文双栏排版——每栏约 8.6cm、栏间有分隔线，卷首标题与导航表通栏单栏。）

1.1.1.1-1. （简单·保 60%·卡壳看答案） 题号块：「题型号-节内序号.（档位·提分线·卡壳看答案）」——整块加粗、括注不挂底纹；序号＝节内连续（同节跨题型累进）；题间不留空行。本行题号＝讲练件现行形态（黑字白底·底纹已废止，题块分隔锚＝题干底纹首段）；题型级题号块底纹仅衔接件·清单件仍现行（下行即衔接件式样）；讲练件讲部填空块题号（2.8-1 型）随块挂 C9C9C9、不加粗。

1.2.1.1-1. （衔接必会·卡壳看答案） 衔接件不区分难度——两段式括注、全部必会；题号块底纹维持现行（底纹减法不适用衔接件·清单件）。

1.1 空间向量及其运算

章标题与节标题：整行铺底#ADC2DA+加粗+顶格（章三号/节四号），章标题另加底边框通栏细线。

1.1.1 空间向量的概念：向量的表示

1.1.1.1 空间向量的概念：向量加减法的三角形法则 2 题：1.1.1.1-1～1.1.1.1-2

讲部标题与题型标题：整行铺底#C6D4E3+加粗+顶格（均小四）；题型标题行末带统计段「N 题：题号 a～题号 b」。

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E 是 AB 的中点。（题干整体铺底示例）

题干底纹：每题题号块起至【答案】行之前的全部段落铺#E0E0E0（含选项与设问）；配图独立段不铺；解析区白底。

【答案】C 【知识点】1.1.1 空间向量的概念

块标签芯片：**【答案】【知识点】【分析】【详解】【点睛】【编注】**等行内标签——上行＝讲练件现行形态（黑字白底·底纹已废止）；芯片底纹与答案值灰底仅衔接件·清单件仍现行。

定义：在空间，我们把具有**大小和方向**的量叫做空间向量。——讲部需背内容灰底＝讲练件讲部保留形态（甲案：填空化遮答自测职能保留，C9C9C9 随知识清单权威源照抄带入）。

【编注】＝编者补写的思路提示/通法，非素材原文

2.4-13. （基）平面向量基本定理

（1）定理内容：不共线两向量可线性表出任一向量。

条目号「节号·序号。」与条目第一子层「（N）」挂灰块；（基）＝基础必会、（进）＝进阶汇总（不挂底纹）。

（基）＝基础必会：必须学完本条目，才能做本章题目

（进）＝进阶汇总：本章各题型常识/结论的汇总，方便复习，必须先做题再回看

定理：三条射线两两垂直且相等时， $PA \perp$ 平面 ABC（三垂线定理示例——定理级条目「灰底+细框」双标记）

二、难度三档与提分线

简单＝单一知识点直接套用、一两步完成——保 60%；中档＝常规解法多步转化或跨一两个知识点——保 80%；难＝特别难的题（综合、参数、压轴）——冲 100%。

建议学习路径：先做衔接件（必会）→过知识清单（基）→讲练件由易到难逐题型推进→错题隔天重做。

答案用法：每题先独立读题动手。卡壳超过 10 分钟立即看答案学方法，不死磕。看懂后遮住答案重做一遍，隔天重做仍错的题记入自己的错题本。

三、本册件型用法

衔接件：初升高铺垫，不区分难度、全部必会，题号块为两段式「（衔接必会·卡壳看答案）」。

知识清单：（基）条目学完才能做题；（进）条目是本章各题型常识/结论汇总，必须先做题再回看。

讲练件：按教材节序由易到难装配；题型通式句在该组首题前（【编注】起段）；讲部「方法讲解|主题」在其题型组前。

部分封面：每部分（同一章同一种产出的全部文件）开头一页，标注该章全部部分与本部分统计——翻书定位用。

装订组合方案：方案 A 整册装订（配页三件+各部分各带部分封面）；方案 B 按件型抽订（全部衔接/全部清单/全部讲练）；方案 C 分层抽订（分层卷派生后：简单卷/中档卷/冲刺卷各按档抽订成套——分层卷以样册通过后另行派生发放）。

本册页眉页脚同串：羿郭工作室·册名 章名·件型（共 N 页）·本 n/共 M 本 节名 第 X 页。 本册页码口径：各部分页码独立从 1 起，件间页码不连续属正常编排；合册打印时各件原有页码原样拼接。

人教 B 版选必 1·册目录页

页码＝所在本部分内页码（各本独立起算）

第 1 章 空间向量与立体几何

衔接件（29 题·全部必会）	·本 15 页	P1
知识清单（47 条：基 33·进 14）	·本 15 页	P1
讲练件（140 题：简单 21·中档 104·难 15）	·本 127 页	P1
1.1 空间向量及其运算（24 题）		P1
1.2 空间向量在立体几何中的应用（116 题）		P18

第 2 章 平面解析几何

衔接件（13 题·全部必会）	·本 5 页	P1
知识清单（67 条：基 38·进 29）	·本 32 页	P1
讲练件（339 题：简单 47·中档 246·难 46）	·本 236 页	P1
2.1 坐标法（1 题）		P1
2.2 直线及其方程（38 题）		P2
2.3 圆及其方程（61 题）		P27
2.4 曲线与方程（19 题）		P64
2.5 椭圆及其方程（63 题）		P78
2.6 双曲线及其方程（36 题）		P117
2.7 抛物线及其方程（32 题）		P140
2.8 直线与圆锥曲线的位置关系（89 题）		P164


羿郭工作室
人教 B 版选必 1

第 1 章

第 1 章 空间向量与立体几何

衔接

本章部分：衔接→知识清单→讲练



统计：衔接 29 题·全部必会

【编注】本部分为第 1 章衔接，共 29 题、全部必会——逐题过关后，再进入本章知识清单与讲练。


人教B版选必1 第1章 空间向量与立体几何·衔接件 (29题)

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

本节15题



1.2.1-1. 平行线分线段成比例定理

(1) 平行线分线段成比例定理: 三条平行线截两条直线, 截得的对应线段成比例



若 $l_1 // l_2 // l_3$, 则 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$.

(2) 变形



其中 $DE // BC$.

1.2.1-2. 相似


(1) 相似三角形的判定方法

① 两角对应相等, 两三角形相似; ② 两边对应成比例且夹角相等, 两三角形相似; ③ 三边对应成比例, 两三角形相似;

(2) 相似比

① 相似三角形的对应边上的中线, 高线 and 对应

角的平分线成比例, 都等于相似比; ② 相似三角形的对应边成比例; ③ 相似三角形周长的比等于相似比; ④ 相似三角形面积的比等于相似比的平方.



1.2.1-3. 射影定理


(1) 内容

若 $AB \perp AC$, $AD \perp BC$, 则① $\angle B = \angle CAD$, $\angle C = \angle BAD$; ② $BA^2 = BD \cdot BC$, $CA^2 = CD \cdot CB$, $DA^2 = DB \cdot DC$.

(2) 证明方法

可以用相似三角形证明, 比如 $\triangle ABC \sim \triangle DBA \Rightarrow BA^2 = BD \cdot BC$;

也可以用圆的切割线定理证明, AB 是圆 O 的切线, 则 $BA^2 = BD \cdot BC$.




(3) 记忆

射影定理简便记忆: 从斜边 BC 上三点 B 、 C 、 D 出发均有三条线段, 中间的平方=最长×最短; 比如以 B 为端点线段有 BA 、 BD 、 BC , 最长的是 BC , 最短的是 BD , 则 $BA^2 = BD \cdot BC$.

1.2.1-4. 三角形内角和外角平分线定理


(1) 三角形内角平分定理: 三角形任意两边之比等于它们夹角的平分线分对边所成两条线段的比.

已知,如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle BAC$ 的平分线,则 $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



(2) 三角形外角平分线定理: 如果三角形的外角平分线外分对边成两条线段, 那么这两条线段和相邻的两边应成比例.


已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的外角 $\angle CAF$ 的平分线, 则 $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



1.2.1.1 平行线分线段成比例定理

5 题: -1~5

1.2.1.1-1. (衔接必会) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$, $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$, BE 和 CD 相交于点 F , 则 $\frac{DF}{DC} =$.



【答案】


3/7

【知识点】

1.2.1 平行线分线段成比例定理、相似三角形的判定与性质

【编注】【分析】过点 D 作 $DG \parallel AC$ 交 BE 于 G , 由平行线分线段成比例把 DF 与 FC 的比转化为 DG 与 EC 的比, 再由 $AE = EC$ 求出 DF 与 DC 的比.


【详解】过点 D 作 $DG \parallel AC$ 交 BE 于 G ,



$$\because \frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}, \therefore \frac{BD}{AB} = \frac{3}{4}, \therefore \frac{DG}{AE} = \frac{3}{4}, \because \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}, \therefore AE = EC, \therefore \frac{DG}{EC} = \frac{3}{4}, \therefore \frac{DF}{FC} = \frac{3}{4}, \therefore \frac{DF}{DC} = \frac{3}{7}.$$

点拨 ①熟悉A字型和8字型; ②涉及到很多线段的比例时, 可设元或令其为具体值, 比如 $\frac{DF}{FC} = \frac{3}{4}$, 则设 $DF = 3k$, $FC = 4k$, $CD = 7k \Rightarrow \frac{DF}{DC} = \frac{3k}{7k} = \frac{3}{7}$; 或设 $DF = 3$, $FC = 4$, $CD = 7 \Rightarrow \frac{DF}{DC} = \frac{3}{7}$.

1.2.1.1-2. (衔接必会) 如图, 已知 M 为 $\square ABCD$ 的边 AB 的中点, CM 交 BD 于点 E , 则图中阴影部分的面积与 $\square ABCD$ 面积的比是.



【答案】

1:3

【知识点】

1.2.1 相似三角形的性质、平行四边形的性质

【编注】【分析】由 $BM \parallel CD$ 得 $\triangle BEM \sim \triangle DEC$ (相似比1:2), 设 $\triangle BEM$ 的面积为 a , 用同高三角形面积之比等于底之比逐一表示各部分面积, 再求阴影部分与平行四边形面积的比.

【详解】 $\because$ 点 M 为 $\square ABCD$ 的边 AB 的中点, $\therefore BM = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}CD$,

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\therefore AB \parallel CD$, $AB = CD$, $\therefore \triangle BEM \sim \triangle DEC$, 相似比为1:2, $\therefore$

$$S_{\triangle BEM} : S_{\triangle CDE} = \left(\frac{BM}{CD}\right)^2 = \frac{1}{4}, S_{\triangle BEM} : S_{\triangle BCE} =$$

$$S_{\triangle BEM} : S_{\triangle DME} = 1:2, \text{ 设 } S_{\triangle BEM} = a, \therefore S_{\triangle CDE} = 4a, S_{\triangle BCE} = S_{\triangle DME} = 2a, \therefore S_{\text{梯形BCDM}} = 9a,$$


$$\therefore S_{\triangle ADM} = 3a, \therefore S_{\square ABCD} = 12a, \therefore$$

$$S_{\text{阴影}} : S_{\square ABCD} = 4a : 12a = 1:3.$$

点拨 ①若题中有很多比例关系的变量, 可用设

元的方法, 梳理清楚他们之间的关系; ②同高的两三角形的面积之比等于对应底之比.

1.2.1.1-3. (衔接必会) 如图, D, E 分别为边 AB, AC 的中点, 则 $\frac{BP}{BE}$ 的值_____.




【答案】 $\frac{2}{3}$

【知识点】

1.2.1 图形的性质


【分析】 过点 E 作 $EF \parallel AB$, 利用三角形中位线的性质及三角形相似计算可得;

【详解】 解: 如图过点 E 作 $EF \parallel AB$, $\because E, D$ 是 AC, AB 的中点, $\therefore EF = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2}BD$, 又 $\triangle EFP \sim \triangle BDP$, 所以 $\frac{EF}{BD} = \frac{EP}{BP} = \frac{1}{2} \therefore \frac{BP}{BE} = \frac{2}{3}$.



故答案为: $\frac{2}{3}$

1.2.1.1-4. (衔接必会) 如图, BD, CE 是 $\triangle ABC$ 的中线, P, Q 分别是 BD, CE 的中点, 则 $PQ:BC$ 等于_____.




【答案】 1:4

【知识点】

1.2.1 图形的性质


【分析】 连接 ED , 取 BE 中点 F , 连接 PF, QF , 利用三角形中位线定理推理、计算作答.

【详解】 如图, 连接 ED , 取 BE 中点 F , 连接 PF, QF , 因 BD, CE 是 $\triangle ABC$ 的中线, 则 E, D 分别为 AB, AC 的中点,



于是得 $ED \parallel BC$, 且 $ED = \frac{1}{2}BC$, 又 P 是 BD 中点, 在 $\triangle BED$ 中, $PF \parallel ED \parallel BC$, $PF = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{4}BC$, 而 Q 是 CE 中点, 在 $\triangle BCE$ 中, $QF \parallel BC$, $QF = \frac{1}{2}BC$, 显然 PF, QF 都过点 F , 与 BC 都平行, 因此点 F, P, Q 共线, 所以 $PQ = QF - PF = \frac{1}{2}BC - \frac{1}{4}BC = \frac{1}{4}BC$, 即 $PQ:BC = 1:4$. 故答案为: 1:4

1.2.1.1-5. (衔接必会) 如图, 四边形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , $\angle BAC = \angle CDB$, 求证: $\angle DAC = \angle CBD$.



【答案】

证明见解析

【知识点】

1.2.1 图形的性质


【分析】由 $\triangle OAB \sim \triangle ODC$ 可得 $\frac{OA}{OB} = \frac{OD}{OC}$, 进而得到 $\triangle OAD \sim \triangle OBC$, 由此可得结论.

【详解】在 $\triangle OAB$ 与 $\triangle ODC$ 中, $\angle AOB = \angle DOC$, $\angle OAB = \angle ODC$, $\therefore \triangle OAB \sim \triangle ODC$, $\therefore \frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OC}$, 即 $\frac{OA}{OB} = \frac{OD}{OC}$, 又在 $\triangle OAD$ 与 $\triangle OBC$ 中, $\angle AOD = \angle BOC$, $\therefore \triangle OAD \sim \triangle OBC$, $\therefore \angle DAC = \angle CBD$.

1.2.1.2 射影定理

6 题: -6~11

1.2.1.2-6. (衔接必会)在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AD \perp BC$ 于点 D , 若 $\frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$, 则 $\frac{AD}{AC} =$, $\frac{BD}{CD} =$.



【答案】

4/5; 16/9

【知识点】

1.2.1 射影定理

【编注】【分析】设 $AC = 3$ 、 $AB = 4$, 则 $BC = 5$; 先用等积法求斜边上的高 AD , 再用射影定理求 BD 、 CD .

【详解】依题意可设 $AC = 3$, $AB = 4$, 则 $BC = 5$, $\therefore \frac{AD \cdot BC}{2} = \frac{AB \cdot AC}{2} = 6$, $\therefore AD = \frac{12}{5}$, (等积法) $\therefore \frac{AD}{AC} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$,

由射影定理得, $BA^2 = BC \cdot BD \Rightarrow BD = \frac{16}{5}$,


$CA^2 = CB \cdot CD \Rightarrow CD = \frac{9}{5}$, $\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{16}{9}$.

点拨 本题求比值设 $AC = 3$ 求解简便些, 也可采取相似三角形.

1.2.1.2-7. (衔接必会)如图, 在 $\triangle ABC$ 中,

$\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$, $AD = 6$, $CD = 2\sqrt{3}$,

求:



(1) $\angle A$ 的度数; (2) $\triangle ABC$ 的面积.

【答案】

(1) 30° ; (2) $8\sqrt{3}$

【知识点】

1.2.1 射影定理

【编注】【分析】(1) 在 $Rt \triangle ACD$ 中用正切定义求 $\angle A$; (2) 用射影定理 $CD^2 = AD \cdot BD$ 求 BD , 再求 AB 与面积.

【详解】(1) 在 $Rt \triangle ACD$ 中, $\because CD = 2\sqrt{3}$, $AD = 6$, $\therefore \tan A = \frac{CD}{AD} = \frac{2\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\therefore \angle A = 30^\circ$.

(2) $\because CD^2 = AD \cdot BD$, $\therefore BD = \frac{CD^2}{AD} = \frac{(2\sqrt{3})^2}{6} = 2$, $\therefore AB = 6 + 2 = 8$, $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times CD = \frac{1}{2} \times 8 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$.

1.2.1.2-8. (衔接必会)一个直角三角形的一条直角边为3, 斜边上的高为2.4, 则这个直角三角形的面积为 ()

A. 7.2; B. 6; C. 12; D. 24

【答案】


B

【知识点】


1.2.1 图形的性质

【分析】利用勾股定理求得长为3的直角边在斜边上的射影，即可求解斜边的长度，可得三角形面积.

【详解】解：长为3的直角边在斜边上的射影为 $\sqrt{3^2 - 2.4^2} = 1.8$ ，故由射影定理知斜边长为 $\frac{3^2}{1.8} = 5$. $\therefore$ 三角形的面积为 $\frac{1}{2} \times 5 \times 2.4 = 6$. 故选：B.



1.2.1.2-9. (衔接必会) 已知在梯形ABCD中， $DC \parallel AB$, $\angle D = 90^\circ$, $AC \perp BC$, $AB = 10$, $AC = 6$, 则此梯形的面积为_____.



【答案】

32.64; $\frac{816}{25}$


【知识点】

1.2.1 图形的性质

【分析】推导出 $\text{Rt} \triangle ABC \sim \text{Rt} \triangle CAD$ ，可求得AD、CD的长，再利用梯形的面积公式可求得结果.

【详解】在 $\text{Rt} \triangle ACB$ 中， $\because AB = 10$, $AC = 6$, $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = 8$, $\because CD \parallel AB$, 则 $\angle ACD = \angle BAC$, 又因为 $\angle ADC = \angle ACB = 90^\circ$, 所以, $\text{Rt} \triangle ABC \sim \text{Rt} \triangle CAD$, $\therefore \frac{AC}{AB} = \frac{CD}{AC} = \frac{AD}{BC} = \frac{3}{5}$, $AD = \frac{24}{5}$, $CD = \frac{18}{5}$, 所以, $S_{\text{梯形}ABCD} = \frac{(CD+AB) \cdot AD}{2} = \frac{816}{25}$. 故答案为: $\frac{816}{25}$.

1.2.1.2-10. (衔接必会) 已知直角三角形周长为48cm, 一锐角平分线分对边为3:5两部分.



(1)求直角三角形的三边长; (2)求两直角边在斜边上的射影的长.

【答案】

(1)20cm, 12cm, 16cm; (2) $\frac{36}{5}$ cm, $\frac{64}{5}$ cm.


【知识点】

1.2.1 几何证明选讲

【编注】【分析】设 $CD = 3x$, $BD = 5x$, 由角平分线上的点到角两边距离相等得 $DE = CD$, $AE = AC$, 用 x 表示三边后由周长列方程求解; 射影长用射影定理 $AC^2 = AF \cdot AB$ 求.

【详解】(1)借助题设条件运用直角三角形的性质建立方程求解; (2)依据题设运用相似三角形的性质进行探求.

(1)设 $CD = 3x$, $BD = 5x$, 则 $BC = 8x$, 过D作 $DE \perp AB$, 由题意可知, $DE = 3x$, $BE = 4x$, $\therefore AE + AC + 12x = 48$, 又 $AE = AC$, $\therefore AC = 24 - 6x$, $AB = 24 - 2x$, $\therefore (24 - 6x)^2 + (8x)^2 = (24 - 2x)^2$, 解得: $x_1 = 0$ (舍去), $x_2 = 2$, $\therefore AB = 20$, $AC = 12$, $BC = 16$, $\therefore$ 三边长分别为: 20cm, 12cm, 16cm.




(2) 作 $CF \perp AB$ 于 F 点, $\therefore AC^2 = AF \cdot AB$, $\therefore AF = \frac{AC^2}{AB} = \frac{12^2}{20} = \frac{36}{5}(\text{cm})$; 同理: $BF = \frac{BC^2}{AB} = \frac{16^2}{20} = \frac{64}{5}(\text{cm})$. $\therefore$ 两直角边在斜边上的射影长分别为 $\frac{36}{5}\text{cm}$, $\frac{64}{5}\text{cm}$.

直角三角形的性质及相似三角形的性质等有关知识的综合运用.

【点睛】 解直角三角形相似三角形及直角三角形中的勾股定理等知识不仅是高中数学的重要知识和内容,也是高考必考的重要考点. 本题以直角三角形中的边角所满足的条件为背景,考查的是相似三角形的性质及勾股定理等知识与方法的综合运用. 第一问直接运用直角三角形中的勾股定理求得答案; 第二问解答时先依据题设条件,探寻直角三角形中的线段之间的关系,从而使得问题巧妙获证.

1.2.1.2-11. (衔接必会) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的高, 过 D 作 $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, E , F 为垂足. 求证:



(1) $AE \cdot AB = AF \cdot AC$; (2) $\triangle AEF \sim \triangle ACB$.

【答案】

(1) 证明见解析 (2) 证明见解析

【知识点】

1.2.1 图形的性质

【分析】 (1) 由射影定理得 $AD^2 = AE \cdot AB$, $AD^2 = AF \cdot AC$, 从而得到答案; (2) 利用 SAS 证明可得答案.

【详解】 (1) $\because AD \perp BC$, $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, 在 $\text{Rt} \triangle ABD$ 中, 由射影定理得 $AD^2 = AE \cdot AB$, 在 $\text{Rt} \triangle ADC$ 中, 由射影定理得 $AD^2 = AF \cdot AC$, $\therefore AE \cdot AB = AF \cdot AC$.


(2) $\because AE \cdot AB = AF \cdot AC$, $\therefore \frac{AE}{AC} = \frac{AF}{AB}$, 又 $\because$

$\angle EAF = \angle CAB$, $\therefore \triangle AEF \sim \triangle ACB$.

1.2.1.3 三角形的内角与外角平分线定理

4 题: -12~15

1.2.1.3-12. (衔接必会) 已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle BAC$ 的平分线, 求证: $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



【答案】


证明见解析

【知识点】

1.2.1 角平分线的性质定理证明


【编注】【分析】 过 C 作 $CE \parallel DA$ 交 BA 的延长线于 E , 由平行线分线段成比例得 $BA:AE = BD:DC$, 再证 $AE = AC$ 即得结论.

【详解】方法 1 过 C 作 $CE \parallel DA$ 与 BA 的延长线交于 E , 则 $\frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$;



$\because \angle BAD = \angle AEC$, $\angle CAD = \angle ACE$, $\angle BAD = \angle CAD$; $\therefore \angle AEC = \angle ACE$, $\therefore AE = AC$; $\therefore \frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.

方法 2 过 D 作 $DE \perp AB$ 于 E , $DF \perp AC$ 于 F ;




$$\because \angle BAD = \angle CAD, \therefore DE = DF; \therefore \frac{BA}{AC} = \frac{S_{\triangle BAD}}{S_{\triangle DAC}},$$

$$\frac{BD}{DC} = \frac{S_{\triangle BAD}}{S_{\triangle ABC}}; \therefore \frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$$

点拨 遇到角平分线,首先要想到往角的两边作平行线,构造等腰三角形或菱形,其次要想到往角的两边作垂线,构造翻转的直角三角形全等,第三,要想到长截短补法.

1.2.1.3-13. (衔接必会) 如图,在 $\triangle ABC$ 中, AD 是角 BAC 的平分线, $AB = 5\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$, $BC = 7\text{cm}$, 求 BD 的长.



【答案】

35/9


【知识点】

1.2.1 角平分线的性质定理

【编注】 **【分析】** 由三角形内角平分线定理得 $BD:CD = AB:AC = 5:4$, 再结合 $BD + CD = 7$ 求出 BD .

【详解】 $\because AD$ 是角 BAC 的平分线, $\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC} = \frac{5}{4}$,
又 $\because CD + BD = 7$, $\therefore BD = \frac{35}{9}$.

1.2.1.3-14. (衔接必会) 已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的外角 $\angle CAF$ 的平分线, 求证:
 $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



【答案】


证明见解析

【知识点】

1.2.1 图形的性质


【分析】 过 C 作 $CE \parallel DA$ 与 BA 交于 E , 则 $\frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$, 利用 $\angle CEA = \angle ECA$ 得 $AE = AC$ 可得答案.

【详解】 过 C 作 $CE \parallel DA$ 与 BA 交于 E , 则 $\frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$,



$\angle DAF = \angle CEA$, $\angle DAC = \angle ECA$, $\angle DAF = \angle DAC$; $\therefore \angle CEA = \angle ECA$, $\therefore AE = AC$; $\therefore \frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$.

1.2.1.3-15. (衔接必会) 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 $\angle BAC$ 的平分线, $AB - AC = 5$, $BD - CD = 3$, $DC = 8$, 则 $AB =$ _____.



【答案】

$\frac{55}{3}$; $18\frac{1}{3}$

【知识点】

1.2.1 图形的性质

【分析】 利用角平分线定理得到边长的比例关系, 代入题中的等量关系即可.


【详解】 $\because BD - CD = 3$, $DC = 8$, $\therefore BD = 11$,
 $\because AD$ 是 $\angle BAC$ 的平分线, $\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD} = \frac{11}{8}$, 又 $\because$
 $AB - AC = 5$, $\therefore AB = \frac{55}{3}$. 故答案为: $\frac{55}{3}$.

1.2.5 空间中的距离

本节 14 题

1.2.5-1. 三角形的重心

(1) 三角形的三条中线相交于一点, 这个交点称为三角形的重心.




点D、E、F是中点, 则点O是 $\triangle ABC$ 的重心.

(2) 三角形的重心在三角形的内部, 恰好是每条中线的三等分点. 如上图, $AO = 2OD, CO = 2OE, BO = 2OF$.


1.2.5-2. 三角形的内心

(1) 三角形的三条角平分线相交于一点, 是三角形的内心.



AD 、 CE 、 BF 是角平分线, 则点O是 $\triangle ABC$ 的内心.


(2) 三角形的内心在三角形的内部, 它到三角形的三边的距离相等.




1.2.5-3. 三角形的垂心

(1) 三角形的三条高所在直线相交于一点, 该

点称为三角形的垂心.




(2) 锐角三角形的垂心一定在三角形的内部, 直角三角形的垂心为他的直角顶点, 钝角三角形的垂心在三角形的外部.




1.2.5-4. 三角形的外心

(1) 三角形三边的垂直平分线所在直线相交于一点, 该点称为三角形的外心.



OE 、 OD 、 OF 分别是 AB 、 BC 、 AC 的垂直平分线, 点O是三角形的外心.

(2) 三角形的外心到三个顶点的距离相等.



1.2.5-5. 拓展


(1)等腰三角形底边上三线(角平分线、中线、高线)合一. 因而在等腰三角形 ABC 中, 三角形的内心 I 、重心 G 、垂心 H 必然在一条直线上.

(2)正三角形三条边长相等, 三个角相等, 且四心(内心、重心、垂心、外心)合一, 该点称为正三角形的中心.

1.2.5.1 三角形的“四心”的性质证明

5 题: -1~5

1.2.5.1-1. (衔接必会) 求证 D 、 E 、 F 分别为 $\triangle ABC$ 三边 BC 、 CA 、 AB 的中点, AD 、 BE 、 CF 交于一点, 且 A 都被该点分成2:1.



【答案】

证明见解析


【知识点】

1.2.5 三角形的重心

【编注】【分析】连结两边中点 D 、 E 得 $DE \parallel AB$ 且 $DE:AB = 1:2$, 由 $\triangle GDE \sim \triangle GAB$ 得 $AG = 2GD$; 同理处理另一条中线, 说明两个交点重合即三条中线共点.

【详解】证明: 连结 DE , 设 AD 、 BE 交于点 G , $\because D$ 、 E 分别为 BC 、 AC 的中点, 则 $DE \parallel AB$, 且 $DE = \frac{1}{2}AB$, $\therefore \triangle GDE \sim \triangle GAB$, 且相似比为1:2, $\therefore AG = 2GD, BG = 2GE$. 设 AD 、 CF 交于点 G' , 同理可得, $AG' = 2G'D, CG' = 2G'F$, 则 G 与 G' 重合, $\therefore AD$ 、 BE 、 CF 交于一点, 且都被该点分成2:1.

1.2.5.1-2. (衔接必会) 已知 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$ 于 D , $BE \perp AC$ 于 E , AD 与 BE 交于 H 点, 求证 $CH \perp AB$.



【答案】

证明见解析

【知识点】

1.2.5 三角形的垂心

【编注】【分析】延长 CH 交 AB 于 F , 由 D 、 E 同在以 CH 为直径的圆上得 $\angle FCB = \angle DEH$, 再由 E 、 D 同在以 AB 为直径的圆上得 $\angle BED = \angle BAD$, 于是 $\angle FCB = \angle BAD$, 由公共角 $\angle ABC$ 得 $\angle CFB = \angle ADB = 90^\circ$ 即 $CH \perp AB$.

【详解】证明: 延长 CH 交 AB 于 F , $\because AD \perp BC, BE \perp AC$, $\therefore \angle HDC = \angle HEC = 90^\circ$, $\therefore D, E$ 在以 CH 为直径的圆上, $\therefore \angle FCB = \angle DEH$. 同理, E, D 在以 AB 为直径的圆上, 可得 $\angle BED = \angle BAD$. $\therefore \angle BCH = \angle BAD$, 又 $\triangle ABD$ 与 $\triangle CBF$ 有公共角 $\angle ABC$, $\therefore \angle CFB = \angle ADB = 90^\circ$, 即 $CH \perp AB$.


点拨 本题即证明三角形的三条高交于一点. 思考下, 那三角形的三条内角平分线、三边的垂直平分线、三条中线为什么也交于一点呢?

1.2.5.1-3. (衔接必会) 已知: $\triangle ABC$ 是三边都不相等的三角形, 点 O 和点 P 是这个三角形内部两点.

(1)如图①, 如果点 P 是这个三角形三个内角平分线的交点, 那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系? 请说明理由;

(2)如图②,如果点 O 是这个三角形三边垂直平分线的交点,那么 $\angle BOC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系?请说明理由;

(3)如图③,如果点 P (三角形三个内角平分线的交点),点 O (三角形三边垂直平分线的交点)同时在不等边 $\triangle ABC$ 的内部,那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BOC$ 有怎样的数量关系?请直接回答.



【答案】

(1) $\angle BPC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$, 理由见解析

(2) $\angle BOC = 2\angle BAC$, 理由见解析(3) $4\angle BPC - \angle BOC = 360^\circ$


【知识点】

1.2.5 几何证明选讲

【分析】(1)利用角平分线的性质以及三角形内角和为 180° ; (2)利用外心的性质以及周角为 360° ; (3)利用第(1)问和第(2)问的结论.


【详解】(1) $\because BP$ 平分 $\angle ABC$, CP 平分 $\angle ACB \therefore \angle PBC = \frac{1}{2}\angle ABC$, $\angle PCB = \frac{1}{2}\angle ACB$, $\therefore \angle BPC = 180^\circ - (\angle PBC + \angle PCB) = 180^\circ - (\frac{1}{2}\angle ABC + \frac{1}{2}\angle ACB) = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB) = 180^\circ - \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BAC) = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$.

(2)如图, 连接



AO . $\because$ 点 O 是这个三角形三边垂直平分线的交点 $\therefore OA = OB = OC \therefore \angle OAB = \angle OBA$, $\angle OAC = \angle OCA$, $\angle OBC = \angle OCB$, $\therefore \angle AOB = 180^\circ - 2\angle OAB$, $\angle AOC = 180^\circ - 2\angle OAC$, $\therefore \angle BOC = 360^\circ - (\angle AOB + \angle AOC) = 360^\circ - (180^\circ - 2\angle OAB + 180^\circ - 2\angle OAC) = 2\angle OAB + 2\angle OAC = 2\angle BAC$
(3) $\because$ 点 P 为三角形三个内角平分线的交点 $\therefore \angle BPC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$ 由 $\angle BAC = 2\angle BPC - 180^\circ \therefore$ 点 O 为三角形三边垂直平分线的交点 $\therefore \angle BOC = 2\angle BAC$, $\therefore \angle BOC = 2(2\angle BPC - 180^\circ) = 4\angle BPC - 360^\circ$, 即 $4\angle BPC - \angle BOC = 360^\circ$.

1.2.5.1-4. (衔接必会) 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $BC = a, AC = b, AB = c$, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 且 I 在 $\triangle ABC$ 的边 BC, AC, AB 上的射影分别为 D, E, F , 求证: $AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$.



【答案】

证明见解析

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】根据三角形内心的性质可得 $AE = AF$, $BD = BF$, $CD = CE$, 即可证明.

【详解】证明: 作 $\triangle ABC$ 的内切圆, 则 D 、 E 、 F 分别为内切圆在三边上的切点, $\therefore AE, AF$ 为圆的从同一点作的两条切线, $\therefore AE = AF$, 同理, $BD = BF, CD = CE \therefore b + c - a = AF + BF + AE + CE - BD - CD = AF + AE = 2AF = 2AE$ 即 $AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$.


1.2.5.1-5. (衔接必会) 若三角形 ABC 的面积为 S , 且三边长分别为 a 、 b 、 c , 求三角形的内切圆的半径.

【答案】 $r = \frac{2S}{a+b+c}$


【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】如图, 设内切圆 I 的半径为 r , $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABI} + S_{\triangle ACI} + S_{\triangle BCI}$, 代入即可求出三角形的内切圆的半径.



【详解】如图, 设内切圆 I 的半径为 r , $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABI} + S_{\triangle ACI} + S_{\triangle BCI} = \frac{1}{2}r \cdot AB + \frac{1}{2}r \cdot AC + \frac{1}{2}r \cdot BC = \frac{1}{2}r \cdot (AB + AC + BC) = \frac{1}{2}r \cdot (a + b + c) = S$ 所以 $r = \frac{2S}{a+b+c}$.



1.2.5.2 三角形的“四心”的运用

9 题: -6~14

1.2.5.2-6. (衔接必会) 若已知 O 为三角形 ABC 的重心和内心, 求证三角形 ABC 为等边三角形.

【答案】


证明见解析

【知识点】

1.2.5 三角形的重心、三角形的内心

【编注】【分析】连 AO 并延长交 BC 于 D , 由内心得 AD 平分 $\angle BAC$ 、由重心得 D 为 BC 中点, 用角平分线性定理得 $AB = AC$, 同理得 $AB = BC$.

【详解】证明: 如图, 连 AO 并延长交 BC 于 D . $\because O$ 为三角形的内心, 故 AD 平分 $\angle BAC$, $\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ (角平分线性定理)



$\because O$ 为三角形的重心, D 为 BC 的中点, 即 $BD = DC \therefore \frac{AB}{AC} = 1$, 即 $AB = AC$. 同理可得, $AB = BC \therefore \triangle ABC$ 为等边三角形.

1.2.5.2-7. (衔接必会) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 3$, $BC = 2$, 求

(1) $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}$ 及 AC 边上的高 BE ; (2) $\triangle ABC$ 的内切圆的半径 r ; (3) $\triangle ABC$ 的外接圆的半径 R .

【答案】

, 高(1) $S = 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}/3$; (2) $r = \sqrt{2}$;

(3) $R = 9\sqrt{2}$


【知识点】

1.2.5 三角形的内心与外心

【编注】【分析】(1) 作 BC 边上的高 AD , 由勾股定理求 AD 及面积, 再用等积法求 AC 边上的高 BE ; (2) 把三角形面积拆成以 I 为顶点、以三边为底的三个小三角形面积之和求内切圆半径 r ; (3) 外心 O 在 AD 上, 在 $Rt \triangle OBD$ 中用 $OB^2 =$


$BD^2 + OD^2$ 列方程求 R .

【详解】(1)如图,作 $AD \perp BC$ 于 D .




$\because AB = AC, \therefore D$ 为 BC 的中点, $\therefore AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} = 2\sqrt{2}$, $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$, 又 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BE$, 解得 $BE = \frac{4\sqrt{2}}{3}$.

(2)如图, I 为内心, 则 I 到三边的距离均为 r ,




连 IA, IB, IC , $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle IAB} + S_{\triangle IBC} + S_{\triangle IAC}$, 即 $2\sqrt{2} = \frac{1}{2} AB \cdot r + \frac{1}{2} BC \cdot r + \frac{1}{2} CA \cdot r$, 解得 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(3) $\because \triangle ABC$ 是等腰三角形, $\therefore$ 外心 O 在 AD 上, 连 BO , 则 $Rt\triangle OBD$ 中, $OD = AD - R$, $OB^2 = BD^2 + OD^2 \therefore R^2 = (2\sqrt{2} - R)^2 + 1^2$ 解得 $R = \frac{9\sqrt{2}}{8}$.



1.2.5.2-8. (衔接必会) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 10$, AD 是 BC 边上的高, 已知 $AD = BD$, 点 H 、 O 分别是 $\triangle ABC$ 的垂心和外心, 则 HO 的最小长度为

_____.



【答案】


$\sqrt{5}$

【知识点】

1.2.5 三角形的垂心与外心

【编注】【分析】以 D 为原点、 DB 所在直线为 x 轴建立坐标系, 由 $\triangle ADC \cong \triangle BDH$ 得 $CD = DH$, 设 $C(m, 0)$ 表示出 H 与外心 O 的坐标, 把 OH^2 化为 m 的二次函数求最小值.

【详解】 $\because AD \perp BC, \therefore \angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$, 如图, 以 D 为坐标原点, DA 所在直线为 y 轴, DB 所在直线为 x 轴建立坐标系. 连接 BH 并延长交 AC 于点 E ,



$\because H$ 为 $\triangle ABC$ 的垂心, $\therefore BE \perp AC$, $\therefore \angle CAD + \angle AHE = \angle HBD + \angle BHD = 90^\circ$, $\therefore \angle CAD = \angle HBD$, $\because AD = BD$, $\therefore \triangle ADC \cong \triangle BDH(ASA)$, $\therefore CD = DH$, 设 $C(m, 0)$, 则 $H(0, m)$, 连接 OB 、 OC , 作 $OG \perp BC$ 于 G , $\because OB = OC$, $\therefore G$ 为 BC 中点, $\because AB = 10$, $\therefore AD = BD = \frac{\sqrt{2}}{2}AB = 5\sqrt{2}$, $\therefore B(-5\sqrt{2}, 0)$, $A(0, 5\sqrt{2})$, $G(\frac{m-5\sqrt{2}}{2}, 0)$, 连接 AO 、 DO , 则 $OA = OB$, $\therefore \triangle BDO \cong \triangle ADO(SSS)$, $\therefore \angle BDO = \angle ADO = \frac{1}{2}\angle ADB = 45^\circ$, $\therefore OG = DG$, $\therefore O(\frac{m-5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}-m}{2})$, $\therefore OH^2 = (\frac{m-5\sqrt{2}}{2} - 0)^2 + (\frac{5\sqrt{2}-m}{2} - m)^2 = \frac{5}{2}(m - 2\sqrt{2})^2 + 5$, 所以当 $m = 2\sqrt{2}$ 时, OH^2 取得最小值5, 所以 OH 的最小值为 $\sqrt{5}$.

点拨 建立直角坐标系, 把几何问题转化为代数问题(把 OH 线段的最小值化为代数式 $\frac{5}{2}(m - 2\sqrt{2})^2 + 5$ 的最小值), 这是解析几何的方法, 在高中经常用到.

1.2.5.2-9. (衔接必会) O 是 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心, $\angle C = 90^\circ$, $\angle BOC = 105^\circ$, $BC=20\text{cm}$, 则 AC 长为____cm.


【答案】 $20\sqrt{3}$

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】由内切圆性质求得 $\angle ACB + \angle ABC$, 从而得 A 角大小, 再得出 B 角, 在直角三角形中得 AC 长.

【详解】 $\because O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心, $\therefore \angle 1 = \frac{1}{2}\angle ACB$, $\angle 2 = \frac{1}{2}\angle ABC$, $\therefore \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ - \angle BOC = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$, $\therefore \angle ACB + \angle ABC = 2(\angle 1 + \angle 2) = 150^\circ$, $\therefore \angle A = 180^\circ - \angle ACB - \angle ABC = 30^\circ$, $\because \angle C = 90^\circ$, $BC=20\text{cm}$, $AB=40\text{cm}$, $AC = 20\sqrt{3}\text{cm}$. 故答案为: $20\sqrt{3}$.



1.2.5.2-10. (衔接必会) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 是钝角, H 是垂心, $AH = BC$, 则 $\angle BHC =$ _____.

【答案】


45° ; $\frac{\pi}{4}$

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】利用三角形的垂心可得 $\angle AHE = \angle ABD$, 进而得到 $\triangle HAE \cong \triangle BCE$, 即可证明 $\triangle HEB$ 为等腰直角三角形得出结论.

【详解】 AD 、 CE 、 BF 为 $\triangle ABC$ 的高, H 点为三条高线的交点, 即 H 是垂心, $\therefore AD$ 、 CE 为 $\triangle ABC$ 的高, $\therefore \angle AEH = 90^\circ$, $\angle ADB = 90^\circ$, $\therefore \angle AHE = \angle ABD$, $\therefore$ 在 $\triangle HAE$ 和 $\triangle BCE$ 中 $\begin{cases} \angle AHE = \angle ABD \\ \angle AEH = \angle CEB \\ AH = BC \end{cases}$, $\therefore \triangle HAE \cong \triangle BCE$, $\therefore HE = BE$, $\therefore \triangle HEB$ 为等腰直角三角形, $\therefore \angle BHC = 45^\circ$. 故答案为: 45° .



1.2.5.2-11. (衔接必会) 在 $\triangle ABC$ 中, 两中线 AD 与 CF 相交于点 G , 若 $\angle AFC = 45^\circ$, $\angle AGC = 60^\circ$, 则 $\angle ACF$ 的度数为_____.


【答案】 75°

【知识点】


1.2.5 图形的性质

【分析】由点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 可得 $\frac{CG}{GF} = 2$, 作 $CE \perp AG$ 于点 E , 连接 EF , 则 $\triangle CEG$ 是直角三角形, 再结合已知的角度可推得 $\triangle AEC$ 是等腰直角三角形, 从而可求出 $\angle ACF$ 的度数

【详解】 $\because$ 点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, $\therefore \frac{CG}{GF} = 2$, 作 $CE \perp AG$ 于点 E , 连接 EF , $\therefore \triangle CEG$ 是直角三角形, $\because \angle EGC = 60^\circ$, $\therefore \angle ECG = 30^\circ$, 那么 $EG = \frac{1}{2}CG = GF$, $\therefore GE = GF$, $\angle FGE = 120^\circ$, $\therefore \angle GFE = \angle FEG = 30^\circ$, 而 $\angle ECG = 30^\circ$, $\therefore EF = EC$, $\therefore \angle EFA = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$, $\angle FAD = \angle AGC - \angle AFC = 15^\circ$, $\therefore \angle FAD = \angle EFA$, $\therefore EF = AE$, $\therefore AE = EC$, $\therefore \triangle AEC$ 是等腰直角三角形, $\therefore \angle ACE = 45^\circ$, $\therefore \angle ACF = \angle ACE + \angle ECF = 30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$, 故答案为: 75°



1.2.5.2-12. (衔接必会) 如图, 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle BCA = 90^\circ$, 中线 CM 垂直于中线 BN , 且 $BC = 2$, 求 BN 的长.




【答案】 $\sqrt{6}$

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】由题可知 MN 是中位线, 可得 $\triangle MNC \sim \triangle NCB$, 即可得到 $NC = \sqrt{2}$, 利用勾股定理即可求解.

【详解】解: 连接 MN , 由题可知, MN 是中位线, $\therefore MN = 1$, 四边形 $MNCB$ 为直角梯形. $\therefore \triangle MNC \sim \triangle NCB$, $\frac{MN}{NC} = \frac{NC}{BC}$, $NC = \sqrt{2}$, $BN^2 = NC^2 + BC^2 = 2 + 4 = 6 \therefore BN = \sqrt{6}$. 故答案为: $\sqrt{6}$.



1.2.5.2-13. (衔接必会) 求证: 若三角形的垂心和重心重合, 求证: 该三角形为正三角形.

【答案】


证明见解析

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】根据重心、垂心的定义及三角形全等证明即可;


【详解】证明: 如图



若点 H 是垂心又是重心, 则 $AD \perp BC$, $BD = CD$, 所以 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$, 所以 $AB = AC$, 同理 $AB = BC$ 故 $\triangle ABC$ 是正三角形.

1.2.5.2-14. (衔接必会) 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > BC > CA$, O 、 I 、 H 分别是它的外心、内心、垂心, 已知 $\angle A = 60^\circ$, 求证:

(1) $\angle OIH - \angle ABC$ 是一个定值;(2) $\angle OIH + \angle ACB$ 也是一个定值.



【答案】

(1)证明见解析(2)证明见解析

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】(1)连接 BH 并延长交 AC 于 E , 连接 CH 并延长交 AB 于 F , 作 $OD \perp AB$ 于 D , 连接 OB 、 OC 、 OI 、 IH , 设 $\angle CBE = \alpha$, 则 $\angle ACB = 90^\circ - \alpha$, 由圆周角定理结合题意可证明.(2) $\angle OIH + \angle ACB = (150^\circ + \alpha) + (90^\circ - \alpha) = 240^\circ$, 即可证明.

【详解】(1)证明: 连接 BH 并延长交 AC 于 E , 连接 CH 并延长交 AB 于 F , 作 $OD \perp AB$ 于 D , 连接 OB 、 OC 、 OI 、 IH , 设 $\angle CBE = \alpha$, 则 $\angle ACB = 90^\circ - \alpha$, 由圆周角定理得: $\angle BOD = \angle ACB = \angle BCE$, $\therefore \angle ABO = \angle OBD = \angle CBE = \alpha$, $\angle ABC = \angle ABE + \alpha = (90^\circ - \angle A) + \alpha = 30^\circ + \alpha$, $\therefore \angle BOC = 2\angle BAC = 120^\circ$, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC = 120^\circ$, $\angle BHC = \angle EHF = 180^\circ - \angle A = 120^\circ$, $\therefore \angle BOC = \angle BIC = \angle BHC$, $\therefore B$ 、 O 、 I 、 H 、 C 五点共圆, $\therefore \angle OBC = \angle OCB = 30^\circ$, $\angle CIH = \angle CBH = \alpha$, $\angle OIC = 180^\circ - \angle OBC = 150^\circ$, $\therefore \angle OIH = 150^\circ + \alpha$, $\therefore \angle OIH - \angle ABC = (150^\circ + \alpha) - (30^\circ + \alpha) = 120^\circ$, $\therefore \angle OIH - \angle ABC$ 是一个定值; (2) $\angle OIH + \angle ACB = (150^\circ + \alpha) + (90^\circ - \alpha) = 240^\circ$, $\therefore \angle OIH + \angle ACB$ 也是一个定值.

