

人教 B 版选必 1 第 2 章 平面解析几何·衔接件（13 题）

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系 本节 13

题

2.8-1. 一元二次方程的判别式

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 可用配方法变形为 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$, 该方程根的情况由判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 来判定.

(1) $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个不相等的实数根:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a};$$

(2) $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个相等的实数根: $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$;

(3) $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 方程没有实数根.

2.8-2. 一元二次方程的根与系数的关系

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根为 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, 那么 $x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{a}$; $x_1 x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{c}{a}$.

由此得出, 一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根与系数的关系: 如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根是 x_1, x_2 , 那么 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. 这个结论称为韦达定理.

2.8.1 直线与圆锥曲线的位置关系: 韦达定理求对称式的值 2 题: 2.8.1-1~2.8.1-2

2.8.1-1. (衔接必会·卡壳看答案) 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的值.

(1) $x_1^2 + x_2^2 =$; (2) $|x_1 - x_2| =$; (3) $\frac{x_1}{x_2} = (x_1 > x_2)$; (4) $\frac{1}{x_1} - x_2^2 = (x_1 > x_2)$.

【编注】【分析】题干给出二次方程的两根且要求“不解方程”求各式的值, 判归韦达定理求对称式: 先写 $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = \frac{1}{2}$, 再把目标式恒等变形为和与积的组合; 求商与差时先由求根公式定 $x_1 > x_2$, 防止代入颠倒.

【答案】(1)3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3 + 2\sqrt{2}$; (4) $\frac{1}{2}$ 【知

识点】2.8 韦达定理与判别式

$$(1) x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1$$

$$= 3. (2) |x_1 - x_2|$$

$$= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}.$$

$$(3) \text{由求根公式得 } x_1 = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}, x_2 =$$

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{2}, \text{ 故 } \frac{x_1}{x_2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$$

$$= 3 + 2\sqrt{2}. (4) \text{由 } x_1 x_2 = \frac{1}{2} \text{ 得 } \frac{1}{x_1} = 2x_2; \text{ 又 } x_2$$

$$= 2 - x_1, \text{ 故 } x_2^2 = 2x_2 - x_1 x_2$$

$$= 2x_2 - \frac{1}{2}, \text{ 于是 } \frac{1}{x_1} - x_2^2 = 2x_2 - \left(2x_2 - \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}. \text{ 故答案为: (1)3; (2)}\sqrt{2}; (3)3$$

$$+ 2\sqrt{2}; (4)\frac{1}{2}.$$

2.8.1-2. (衔接必会·卡壳看答案) 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 +$

$$5x_2^3 =$$

【答案】21 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

【分析】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$ 得 $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$ 再展开合并同类项可得答案.

【详解】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$, $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$

$$= 2x_1[x_1^2 + 2x_1 + 1] + 5x_2^2 + 5x_2$$

$$= 2x_1(x_1 + 1 + 2x_1 + 1)$$

$$+ 5(x_2 + 1) + 5x_2$$

$$= 6x_1^2 + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 6(x_1 + 1) + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 10(x_1 + x_2) + 11 = 21. \text{ 故答案为: } 21.$$

2.8.2 直线与圆锥曲线的位置关系: 由已知根求另一根与参数 2 题: 2.8.2-3~2.8.2-4

2.8.2-3. (衔接必会·卡壳看答案) 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根, 求方程的另一根及 c 的值.

【编注】 **【分析】** 已知一根求另一根与参数：先用两根之和为4得另一根 $2-\sqrt{3}$ ，再用两根之积得 $c=1$ ；也可把 $2+\sqrt{3}$ 代入方程解出 c ，两路互相验算。

【答案】 另一根为 $2-\sqrt{3}$ ， $c=1$ **【知识点】**

2.8 韦达定理与判别式

设方程的另一根为 x_2 。由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 4$ ，故 $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$ ； $x_1 x_2 = c$ ，故 $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ 。所以方程的另一根为 $2 - \sqrt{3}$ ， $c = 1$ 。

2.8.2-4. (衔接必会·卡壳看答案) 关于 x 的二次方程 $kx^2 + 2x - ck = 0$ ($c > 0$, $c \neq 1$) 有两个不等的实数根，其中一个是 $x = -c$ 。

(1) 求另一个根；(2) 写出 k 关于 c 的表达式，并求 k 的取值范围。

【答案】 (1) 1；(2) $k = \frac{2}{c-1}$ ， $k > 0$ 或 $k < -2$

【知识点】 2.8 韦达定理与判别式

【分析】 (1) 利用韦达定理计算可得；(2) 利用韦达定理得到 $1 + (-c) = -\frac{2}{k}$ ，即可得到 k 关于 c 的表达式，再根据 c 的取值范围，求出 k 的取值范围；

【详解】 (1) 解：设另一根为 a ，由韦达定理得 $-ac = \frac{-ck}{k}$ ，解得 $a = 1$ ，即另一个根是1；
(2) 解： $\because 1 + (-c) = -\frac{2}{k} \therefore k = \frac{2}{c-1}$ ， $\because c > 0$ 且 $c \neq 1$ ， $\therefore c - 1 > -1$ 且 $c - 1 \neq 0$ ， $\therefore$ 当 $c - 1 > 0$ 时， $\frac{2}{c-1} > 0$ ； $\therefore$ 当 $-1 < c - 1 < 0$ 时， $\frac{2}{c-1} < -2$ ； $\therefore k > 0$ 或 $k < -2$ 。

2.8.3 直线与圆锥曲线的位置关系：判别式与韦达定理综合定参 2 题：2.8.3-5~2.8.3-6

2.8.3-5. (衔接必会·卡壳看答案) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m+1)x + m-2 = 0$ 。

(1) 求证：无论 m 取何值，此方程总有两个不相等的实数根；(2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 ，且 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ ，求 m 的值。

【答案】 (1) 证明见解析；(2) $m = 8$ 。 **【知识点】**

2.8 韦达定理与判别式

【分析】 (1) 求出判别式即可证明；(2) 利用根与系数的关系，代入并求值即可。

【详解】 (1) 证明：依题意可得 $\Delta = (2m+1)^2 - 4(m-2) = 4m^2 + 9 > 0$ 故无论 m 取何值，此方程总有两个不相等的实数根；
(2) 解：由根与系数的关系可得：
 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -(2m+1) \\ x_1 x_2 = m-2 \end{cases}$ ，由 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ ，得 $-(2m+1) + 3(m-2) = 1$ ，解得 $m = 8$ 。

2.8.3-6. (衔接必会·卡壳看答案) 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个实数根，

(1) 是否存在实数 k ，使得 $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -\frac{3}{2}$ 成立？若存在，求出 k 的值；若不存在，请说明理由；(2) 求使 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数值

【编注】 **【分析】** 先由二次项系数 $4k \neq 0$ 与判别式 $\Delta = -16k \geq 0$ 得 $k < 0$ ，再用韦达定理把目标式化为含 k 的式子：(1) 解得 $k = \frac{9}{5}$ 与 $k < 0$ 矛盾，不存在；(2) 化简值为 $-\frac{4}{k+1}$ ，枚举得整数 $k = -2, -3, -5$ 。

【答案】 (1) 不存在；(2) $k = -2, -3, -5$ **【知识点】**

2.8 韦达定理与判别式

方程有两个实数根，故 $4k \neq 0$ ，且 $\Delta = (-4k)^2 - 4 \times 4k \times (k+1) = -16k \geq 0$ ，得 $k < 0$ 。由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 1$ ， $x_1 x_2 = \frac{k+1}{4k}$ 。

$$\begin{aligned}
 & (1)(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) \\
 & = 2(x_1^2 + x_2^2) - 5x_1x_2 \\
 & = 2((x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2) - 5x_1x_2 \\
 & = 2 - \frac{9(k+1)}{4k}. \text{ 令其等于 } -\frac{3}{2}, \text{ 解得 } k = \frac{9}{5} \\
 & > 0, \text{ 与 } k \\
 & < 0 \text{ 矛盾, 故不存在满足条件的实数 } k. \\
 & (2) \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2 = \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1x_2} - 4 = \frac{4k}{k+1} - 4 \\
 & = -\frac{4}{k+1}. k \text{ 为负整数且 } k \\
 & \neq -1 \text{ 时, 要使 } \\
 & -\frac{4}{k+1} \text{ 为整数, 需 } k \\
 & + 1 \text{ 整除 } 4, \text{ 故 } k + 1 \\
 & = -1, -2, -4, \text{ 即 } k \\
 & = -2, -3, -5.
 \end{aligned}$$

2.8.4 直线与圆锥曲线的位置关系：韦达定理与勾股定理求几何量 1题：2.8.4-7

2.8.4-7.（衔接必会·卡壳看答案）已知Rt $\triangle ABC$ 中，两直角边长为方程 $x^2 - (2m + 7)x + 4m(m - 2) = 0$ 的两根，且斜边长为13，求 $S_{\triangle ABC}$ 的值。

【答案】 30 **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

【分析】不妨设斜边边长为 $c = 13$ ，两条直角边边长分别为 a 、 b ，利用判别式，结合韦达定理与勾股定理可求得 m 的值，再利用三角形的面积公式以及韦达定理可求得结果。

【详解】解：不妨设斜边边长为 $c = 13$ ，两条直角边边长分别为 a 、 b ，则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab$ 。又因为 a 、 b 为方程 $x^2 - (2m + 7)x + 4m(m - 2) = 0$ 的两根，所以， $\Delta = (2m + 7)^2 - 16m(m - 2) \geq 0$ ，可得 $12m^2 - 60m - 49 \leq 0$ ，由韦达定理可得 $a + b = 2m + 7$ ， $ab = 4m(m - 2)$ ，因为 $169 = c^2 = a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = (2m + 7)^2 - 8m(m - 2)$ ，即 $m^2 - 11m + 30 =$

0，解得 $m = 5$ 或 $m = 6$ 。当 $m = 6$ 时， $\Delta < 0$ ，不合乎题意；

当 $m = 5$ 时， $\Delta > 0$ ，此时 $a + b = 2m + 7 = 17 > 0$ ， $ab = 4m(m - 2) = 60 > 0$ ，则 a 、 b 均为正数，合乎题意。综上所述， $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab = 30$ 。

2.8.5 直线与圆锥曲线的位置关系：二元二次方程组的代入消元解法 2题：2.8.5-8~2.8.5-9

2.8.5-8.（衔接必会·卡壳看答案）解下列方程组

$$\begin{aligned}
 (1) & \begin{cases} y^2 = 3x + 1 \\ 3x - y = 1 \end{cases} \\
 (2) & \begin{cases} (x + y)^2 - 2(x + y) - 3 = 0 \\ x - y = -1 \end{cases} \\
 (3) & \begin{cases} 9x^2 - 4y^2 - 32 = 0 \\ 3x - 2y - 4 = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

【编注】【分析】三个方程组同走“消元”通法：(1)(2)代入或整体设元化成一元方程；(3)由平方差 $9x^2 - 4y^2 = (3x - 2y)(3x + 2y)$ 结合 $3x - 2y = 4$ 先得 $3x + 2y = 8$ 再求解；易错点：消元后得到的根要代回原方程组求出另一未知数，不要丢解。

【答案】 (1) $x = 0, y = -1$ 或 $x = 1, y = 2$ ；
(2) $x = 1, y = 2$ 或 $x = -1, y = 0$ ；(3) $x = 2, y = 1$

1 【知识点】 2.8 二元二次方程组及其解法

$$\begin{aligned}
 (1) & \text{由 } 3x - y = 1 \text{ 得 } y = 3x - 1, \text{ 代入 } y^2 \\
 & = 3x + 1 \text{ 得 } 9x^2 - 9x \\
 & = 0, \text{ 解得 } x = 0 \text{ 或 } x \\
 & = 1, \text{ 相应地 } y = -1 \text{ 或 } y \\
 & = 2. \text{ 故方程组的解为 } x = 0, y \\
 & = -1 \text{ 或 } x = 1, y = 2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) & \text{设 } t = x + y, \text{ 则 } t^2 - 2t - 3 = 0, \text{ 解得 } t \\
 & = 3 \text{ 或 } t = -1. \text{ 结合 } x - y \\
 & = -1: t = 3 \text{ 时 } x = 1, y = 2; t \\
 & = -1 \text{ 时 } x = -1, y \\
 & = 0. \text{ 故方程组的解为 } x = 1, y \\
 & = 2 \text{ 或 } x = -1, y = 0.
 \end{aligned}$$

(3) 由 $9x^2 - 4y^2 - 32$

$$= 0 \text{ 得 } (3x - 2y)(3x + 2y)$$

$$= 32, \text{ 又 } 3x - 2y$$

$$= 4, \text{ 故 } 3x + 2y$$

$$= 8, \text{ 与 } 3x - 2y = 4 \text{ 联立解得}$$

$$x = 2, y = 1. \text{ 故方程组的解为}$$

$$x = 2, y = 1.$$

2.8.5-9. (衔接必会·卡壳看答案) 解方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0 \\ xy = -4 \end{cases}$$

【答案】 $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$ 【知识点】 2.8

二元二次方程组及其解法

【分析】 利用代入消元法求解即可

【详解】 由 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0$ 得 $x = -y$, 代入 $xy = -4$ 得 $-y^2 = -4$, 解得 $y = 2$ 或 $y = -2$, 当 $y = 2$ 时, $x = -2$, 当 $y = -2$ 时, $x = 2$, 故方程组的解是 $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$

2.8.6 直线与圆锥曲线的位置关系: 换元法解二元二次方程组 1 题: 2.8.6-10

2.8.6-10. (衔接必会·卡壳看答案) 解方程组 $\begin{cases} x - y - 3\sqrt{x - y} = 10 \\ xy = -6 \end{cases}$

【答案】 见解析 【知识点】 2.8 二元二次方程组及其解法

【分析】 设 $\sqrt{x - y} = A \geq 0$, 且 $A^2 - 3A - 10 = 0$, 解得 A , 利用 $x - y = 5$, $xy = -6$, 解方程组可得答案.

【详解】 设 $\sqrt{x - y} = A \geq 0$, 且 $A^2 - 3A - 10 = 0. \therefore (A + 2)(A - 5) = 0, \therefore A = 5. \therefore x - y = 25$, 又 $xy = -6$, 解方程组

$$\begin{cases} x + (-y) = 25 \\ x(-y) = 6 \end{cases}, \text{ 可解得 } \begin{cases} x_1 = \frac{25 + \sqrt{601}}{2} \\ y_1 = \frac{-25 + \sqrt{601}}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_2 = \frac{25 - \sqrt{601}}{2} \\ y_2 = \frac{-25 - \sqrt{601}}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = \frac{25 - \sqrt{601}}{2} \\ y_2 = \frac{-25 - \sqrt{601}}{2} \end{cases}$$

2.8.7 直线与圆锥曲线的位置关系: 对称型方程

组的构造解法 1 题: 2.8.7-11

2.8.7-11. (衔接必会·卡壳看答案) 解方程组 $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$

【编注】 【分析】 两元的和与积对称出现的方程组: 代入消元得 $x^2 - 5x + 6 = 0$, 也可把 x, y 看作二次方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两根, 两法同源.

【答案】 $x = 2, y = 3$ 或 $x = 3, y = 2$ 【知识

点】 2.8 二元二次方程组及其解法

由 $x + y = 5$ 得 $y = 5 - x$, 代入 xy

$$= 6 \text{ 得 } x^2 - 5x + 6 = 0, \text{ 解得 } x = 2 \text{ 或 } x$$

$$= 3, \text{ 相应地 } y = 3 \text{ 或 } y$$

$$= 2 \text{ (即 } x, y \text{ 是方程 } t^2 - 5t + 6$$

$$= 0 \text{ 的两个根)}. \text{ 故方程组的解为 } x = 2, y$$

$$= 3 \text{ 或 } x = 3, y = 2.$$

2.8.8 直线与圆锥曲线的位置关系: 联立消元与判别式求参数范围 2 题: 2.8.8-12~2.8.8-13

2.8.8-12. (衔接必会·卡壳看答案) 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ 有两个解.

【编注】 【分析】 方程组解的个数问题: 代入消去 y 得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$, “两个解”等价于 $\Delta = 80 - 16m^2 > 0$, 注意这里是严格大于, 得 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$.

【答案】 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ 【知识点】 2.8 直线与椭圆的位置关系 (联立消元与判别式)

$$\text{把 } y = x + m \text{ 代入 } \frac{x^2}{4} + y^2$$

$$= 1, \text{ 消去 } y \text{ 得 } 5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4$$

$$= 0. \text{ 方程组有两个解等价于该一元二次方程有两个不}$$

$$= (8m)^2 - 4 \times 5 \times (4m^2 - 4)$$

$$> 0, \text{ 即 } 80 - 16m^2 > 0, \text{ 解得 } -\sqrt{5} < m$$

$$< \sqrt{5}. \text{ 所以当 } -\sqrt{5} < m$$

$$< \sqrt{5} \text{ 时, 原方程组有两个解.}$$

2.8.8-13.（衔接必会·卡壳看答案）实数 x, y 满足 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，求 $y - x$ 的最大值.

【答案】 $\sqrt{5}$ **【知识点】**2.8 直线与椭圆的位置关系（联立消元与判别式）

【分析】设 $m = y - x \Rightarrow y = x + m$ ，通过联立方程组的方法，结合判别式求得 m 的取值范围，也即求得 $y - x$ 的最大值.

【详解】设 $m = y - x$ ，则 $y = x + m$ ，联立方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ ，消去 y 得 $5x^2 + 8mx +$

$$4(m^2 - 1) = 0, \because \Delta = 64m^2 - 80(m^2 - 1) \geq$$

0，解得 $-\sqrt{5} \leq m \leq \sqrt{5}$ ，当 $m = \sqrt{5}$ 时，方程

$$5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0 \text{ 即 } 5x^2 + 8\sqrt{5}x +$$

$$16 = 0, \text{ 解得 } x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}, \text{ 从而 } y = x + m =$$

$$\frac{\sqrt{5}}{5}, \therefore \text{当 } x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}, y = \frac{\sqrt{5}}{5} \text{ 时, } m \text{ 有最大值 } \sqrt{5}.$$