



苏州大学 · 数学科学学院

## 抽象代数学习笔记

Based on lectures of Abstract Algebra

---

作者：郭利文

时间：2026 年 1 月 28 日

# 前言

数学是科学的皇后，而数论是数学的皇后，  
但在抽象代数的结构之美面前，  
我们都是谦卑的探索者。

本笔记整理自抽象代数课程，  
旨在理清群、环、域的代数结构，  
仅供学习与交流使用。

# 目录

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>1 域</b>                         | <b>2</b>  |
| <b>2 环</b>                         | <b>5</b>  |
| 2.1 分式域与中国剩余 . . . . .             | 5         |
| 2.2 整环上的讨论 . . . . .               | 9         |
| 2.3 唯一分解多项式环 . . . . .             | 12        |
| <b>3 群</b>                         | <b>14</b> |
| 3.1 交错单群 $A_n(n \geq 5)$ . . . . . | 14        |
| 3.2 有限群的合成序列 . . . . .             | 19        |
| 3.3 群作用与 Sylow 定理 . . . . .        | 21        |
| 3.4 有限生成 Abel 群分类 . . . . .        | 25        |
| 3.5 可解群和幂零群 . . . . .              | 27        |
| <b>索引</b>                          | <b>28</b> |

# 1 域

**命题 1.1.** 设  $F$  是域, 若  $\alpha, \beta$  是  $F$  代数元, 则  $\alpha + \beta, \alpha\beta$  也是  $F$  代数元.

证明. 这里介绍一种不太常见的方法. 设  $f, g \in F[x]$ , 使得  $f(\alpha) = 0, g(\beta) = 0$ . 记  $R(A, B)$  表示  $A, B$  的结式. 令  $h(y) = R(f(x), g(y-x)) \in F[y]$ , 且  $h(\alpha + \beta) = 0$ . 再令

$$k(y) = R\left(f(x), x^{\deg g} \cdot g\left(\frac{y}{x}\right)\right) \in F[y]$$

且  $k(\alpha\beta) = 0$  ■

**命题 1.2 (维数公式).** 设  $F \subset K \subset E$ , 且  $E/F$  是有限扩张, 则  $K/F, E/K$  也是有限扩张, 且

$$[E : F] = [E : K] \cdot [K : F].$$

证明. 将  $K, E$  分别视为  $F$  上线性空间, 则  $K$  是  $E$  的子空间, 自然  $[K : F] \leq [E : F] < \infty$ . 若我们记  $[E : F] = s$ , 我们断言  $[E : K] \leq s$ , 否则存在  $\alpha_1, \dots, \alpha_{s+1} \in E$ , 使得它们在  $K$  上线性无关, 注意  $F \subset K$ , 则  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  在  $F$  上也线性无关, 这导出矛盾.

下面不妨假定  $[E : K] = m, [K : F] = n$ , 且

$$E = \text{span}_K \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}, \quad K = \text{span}_F \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$$

则

$$E = \text{span}_F \{\alpha_i \beta_j \mid i \in [1, m]; j \in [1, n]\}$$

下面只需说明  $\{\alpha_i \beta_j\}$  在  $F$  线性无关即可. 设  $c_{ij} \in F$  满足

$$0 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \alpha_i \beta_j = \sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^n c_{ij} \beta_j \right) \alpha_i$$

对每个固定  $i \in [1, m]$ , 由于  $\sum_{j=1}^n c_{ij} \beta_j \in K$ , 于是  $\sum_{j=1}^n c_{ij} \beta_j = 0$ , 最终得到  $c_{ij} = 0$ . ■

对每个域  $F$ ,  $\text{char} F$  是 0 或者某个素数, 即  $F$  有子域  $\mathbb{Q}$  或者子域  $\mathbb{Z}_p$  (是在同构意义下, 往后不做强调)

**例 1.1.** 设  $F$  是域,  $\text{char} F = p > 0$ , 则  $f : F \rightarrow F, \alpha \mapsto \alpha^p$  是域同态, 特别地, 当  $F$  是有限域时,  $f$  是域同构.

**命题 1.3.** 设有扩张  $E/F$ , 其中  $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \alpha_i$  是  $F$  代数元, 则  $E/F$  是有限扩张, 自然也是代数扩张.

证明.  $E/F$  可以看成若干单代数扩张, 由有限扩张的传递性 [命题, 1.2], 我们只要证明  $F(\alpha)/F$  是代数扩张即可, 其中  $\alpha$  是  $F$  代数元. 设  $f$  是  $\alpha$  的极小多项式, 记  $\deg f = n$ , 则

$$F(\alpha) = \{a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} \mid a_i \in F\} = \text{span}_F \{1_F, \alpha, \cdots, \alpha^{n-1}\}$$

即  $[F(\alpha), F] = n < \infty$ . ■

**命题 1.4.** 代数扩张具有传递性, 即若  $F \subset K \subset E$ , 满足  $E/K, K/F$  是代数扩张, 则  $E/F$  也是代数扩张.

证明. 任意取定  $\alpha \in E$ , 则存在  $f \in K[x]$ , 使得  $f(\alpha) = 0$ . 不妨设  $f = x^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$ , 记  $K' = F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})$ , 则由 [命题, 1.3],  $K'/F$  是有限扩张, 且  $K'(\alpha)/K'$  也是有限扩张, 于是  $K'(\alpha)/F$  也是有限扩张, 自然也是代数扩张. 特别地,  $\alpha$  是  $F$  代数元. ■

**定义 1.1.** 设有域扩张  $E/F$ , 记  $\text{Aut}(E)$  是  $E$  的自同构群, 即  $E$  到自身的域同构全体, 定义

$$\text{Gal}(E/F) = \{\sigma \in \text{Aut}(E) \mid \sigma|_F = \text{id}_F\}$$

则  $\text{Gal}(E/F)$  是群, 称为是  $E/F$  的 Galois 群.

**命题 1.5.** 若  $E/F$  是有限扩张, 则  $\text{Gal}(E/F)$  是有限群.

证明. 不妨设  $[E : F] = n$ , 且

$$E = \text{span}_F \{\alpha_1, \cdots, \alpha_n\}$$

则对任意  $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$ ,  $\sigma$  完全是由  $(\sigma(\alpha_1), \cdots, \sigma(\alpha_n))$  决定的. 记  $f_i \in F[x]$  是  $\alpha_i$  的极小多项式, 则有

$$0 = \sigma(f_i(\alpha_i)) = \sigma((\alpha_i)^m + a_1(\alpha_i)^{m-1} + \cdots + a_m) = f_i(\sigma(\alpha_i))$$

即  $\sigma$  是  $X_i = \{\alpha \in E \mid f_i(\alpha) = 0\}$  上的一个置换. 注意  $\bigcup_{i=1}^n X_i$  是有限集, 其上的置换有限, 故而  $|\text{Gal}(E/F)| < \infty$ . ■

**定义 1.2.** 反之, 给定域  $E$ ,  $G$  是  $\text{Aut}(E)$  的有限子群, 定义

$$\text{Inv}(G) = \{\alpha \in E \mid \sigma(\alpha) = \alpha, \forall \sigma \in G\}$$

则  $\text{Inv}(G)$  是  $E$  的子域, 称为是  $G$  在  $E$  上不动域.

**定理 1.6.** 按 [定义, 1.2] 得到的域扩张  $E/\text{Inv}(G)$  是有限扩张, 且  $[E : \text{Inv}(G)] \leq |G|$

证明. 设  $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ , 我们只需证明对任意取定  $m > n$  个  $E$  中元  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ , 其在  $\text{Inv}(G)$  中线性相关即可. 考虑线性方程组

$$\sum_{i=1}^m \sigma_j(\alpha_i) x_i = 0, \quad 1 \leq j \leq n. \quad (1.1)$$

(1.1) 中方程个数小于未知元个数, 且方程系数是  $E$  中元素, 于是方程在  $E$  中有非零解  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_m) \in E^m$ . 注意  $\sigma_j$  是同构, 则对方程(1.1)的每个属于  $\text{Inv}(G)^m$  的非零解  $\mathbf{x}$ , 都有  $\sum_{i=1}^m x_i \alpha_i = 0$ .

下面我们只需在解空间中找到一个  $\text{Inv}(G)$  上的非零解. 取解  $\mathbf{x}$  满足是方程(1.1)的非零解中含有非零元  $x_i$  最少的一个解, 由于  $\mathbf{x}$  非零, 故不妨设  $x_1 \neq 0$ , 因此进一步可不妨设  $x_1 = 1$ . 我们断言  $\mathbf{x}$  是  $\text{Inv}(G)$  上的解, 否则的话, 存在  $\sigma \in G$ , 使得存在某个  $x_i$ , 满足  $\sigma(x_i) \neq x_i$ , 不妨设  $\sigma(x_2) \neq x_2$ . 注意  $\sigma(\mathbf{x}) = (\sigma(x_1), \dots, \sigma(x_m))$  是方程组

$$\begin{aligned} 0 = \sigma \sigma_j \left( \sum_{i=1}^m x_i \alpha_i \right) &= \sum_{i=1}^m \sigma \sigma_j(\alpha_i) \sigma(x_i), \quad 1 \leq j \leq n \\ &= \sum_{i=1}^m \sigma_k(\alpha_i) \sigma(x_i), \quad 1 \leq k \leq n. \end{aligned} \quad (1.2)$$

的解, 且方程 (1.1) 和方程 (1.2) 是同一个方程, 于是  $\sigma(\mathbf{x})$  也是方程(1.1)的解, 且由  $\mathbf{x}$  取法可知  $\sigma(\mathbf{x})$  与  $\mathbf{x}$  的零元位置相同. 但是注意  $\sigma(\mathbf{x}) - \mathbf{x}$  也是方程(1.1)的非零解, 且其第一个元素也是零, 这与  $\mathbf{x}$  取法矛盾. ■

引出两个问题:

### 问题 1

给定域扩张  $E/F$ , 则有  $F \subset \text{Inv}(\text{Gal}(E/F))$ , 进一步是否有  $F = \text{Inv}(\text{Gal}(E/F))$ .

### 问题 2

设  $E$  是域, 给定  $\text{Aut}(E)$  的有限群  $G$ , 则  $G \subset \text{Gal}(E/\text{Inv}(G))$ , 进一步是否有  $G = \text{Gal}(E/\text{Inv}(G))$ .

第一个一般不正确, 比如考虑域扩张  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ , 第二个我们先做存疑.

**例 1.2.** 设

$$E = \mathbb{Q} \left( \frac{1}{2^{\frac{1}{2^k}}} \mid k = 1, 2, \dots \right)$$

则  $E/\mathbb{Q}$  不是有限生成扩张, 但是是代数扩张.

**例 1.3.**  $\mathbb{Q}(\pi)$  是有限生成扩张, 但不是代数扩张.

## 2 环

### 2.1 分式域与中国剩余

设  $R$  是环,  $I$  是  $R$  的子环, 则  $R/I = \{r + I \mid r \in R\}$  关于加法是一个 Abel 群, 如果我们想在  $R/I$  上定义乘法, 一种自然考虑是

$$(x + I) \cdot (y + I) := xy + I \quad (2.1)$$

如果(2.1)的定义是良定的, 则容易验证  $R/I$  构成一个环. 要使得(2.1)的定义良定, 即要保证: 若  $x_1 - x_2 \in I, y_1 - y_2 \in I$ , 要能推出  $x_1y_1 - x_2y_2 \in I$ , 即

$$x_1y_1 - x_2y_2 = \underbrace{(x_1 - x_2)y_1}_{\in I} + x_2\underbrace{(y_1 - y_2)}_{\in I} \in I$$

自然引出一个概念: 设  $I$  是  $R$  的子环, 如果对任意  $a \in I, r \in R$ , 有  $ar, ra \in I$ , 则称  $I$  为  $R$  的 (双边) 理想.

**定理 2.1 (同态基本定理).** 设  $f: R \rightarrow S$  是满的环同态, 则  $R/\ker f \cong S$ , 且  $S$  中的理想与  $R$  中包含  $\ker f$  的理想有一一对应关系.

证明. 自然定义

$$\begin{aligned} \tilde{f}: R/\ker f &\longrightarrow S \\ r + \ker f &\longmapsto f(r) \end{aligned} \quad (2.2)$$

如果(2.2)的定义是良定的, 则  $\tilde{f}$  是环同态且是双射的验证是平凡的. 若  $x_1 - x_2 \in \ker f$ , 则

$$\tilde{f}(x_1 + \ker f) - \tilde{f}(x_2 + \ker f) = f(x_1) - f(x_2) = f(x_1 - x_2) = 0$$

所以  $\tilde{f}$  的定义是良定的, 即不依赖于代表元的选取.

下设  $R', S'$  分别是  $R$  和  $S$  的理想, 则  $f(R'), f^{-1}(S') := \{r \in R \mid f(r) \in S'\}$  分别是  $S$  和  $R$  中理想, 其中  $f(R')$  是  $S$  中理想的验证需用到  $f$  是满的这一条件. 下面我们主要说明对应的唯一性, 即若  $R'$  是  $R$  中包含  $\ker f$  的理想, 则有事实

$$R' = f^{-1}(f(R'))$$

换句话说即证明: 若  $R_1, R_2$  是  $R$  中包含  $\ker f$  的理想, 且  $f(R_1) = f(R_2)$ , 则  $R_1 = R_2$ :

对任意  $r_1 \in R_1$ , 存在  $r_2 \in R_2$ , 使得  $f(r_1) = f(r_2)$ , 即  $r_1 - r_2 \in \ker f \subset R_2$ , 于是有  $r_1 = (r_1 - r_2) + r_2 \in R_2$ , 也就是说  $R_1 \subset R_2$ , 同理也有  $R_2 \subset R_1$ , 这就得到  $R_1 = R_2$ . ■

设  $I_1, \dots, I_r$  是  $R$  的理想, 则  $I_1 + \dots + I_r := \{x_1 + \dots + x_r \mid x_i \in I_i\}$  和  $\bigcap_{i=1}^r I_i$  都是  $R$  的理想.

若  $S \subset R$ , 记  $\langle S \rangle =$  是包含  $S$  的  $R$  中最小理想, 若  $R$  是交换幺环, 则

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^m x_i y_i \mid x_i \in S, y_i \in R, m \in \mathbb{N}^+ \right\}$$

设  $R_1, R_2$  是环, 在  $R_1 \times R_2 = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in R_1, r_2 \in R_2\}$  中定义如下加法和乘法:

$$\begin{aligned} (x_1, y_1) + (x_2, y_2) &:= (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) &:= (x_1 x_2, y_1 y_2). \end{aligned} \quad (2.3)$$

则  $R_1 \times R_2$  在运算(2.3)下构成环, 称为  $R_1$  与  $R_2$  的直积. 一个简单的事实是:  $R_1 \cong R_1 \times \{O_{R_2}\}$ ,  $R_2 \cong \{O_{R_1}\} \times R_2$ , 即  $R_1, R_2$  均可视为  $R_1 \times R_2$  的理想.

**命题 2.2.** 设  $I \subset J$  是  $R$  中的两个理想, 则  $I/(I \cap J) \cong (I + J)/J$ .

**证明.** 自然考虑  $f: I \longrightarrow (I + J)/J, x \longmapsto x + J$ , 则  $f$  是满的环同态, 且  $\ker f = I \cap J$ , 由同态基本定理即得. ■

设  $R$  为交换环,  $I_1, I_2$  是  $R$  中两个理想, 定义

$$I_1 I_2 := \left\{ \sum_{i=1}^m x_i y_i \mid x_i \in I_1, y_i \in I_2 \right\} \quad (2.4)$$

则  $I_1 I_2 \subset I_1 \cap I_2$  也是  $R$  的理想. 利用定义(2.4), 我们可以归纳定义: 若  $I_1, \dots, I_k$  是  $R$  中理想, 则

$$\prod_{i=1}^k I_i := I_1(I_2 \cdots I_k) = \left\{ \sum_{i=1}^m x_{i1} x_{i2} \cdots x_{ik} \mid x_{ij} \in I_j \right\}$$

设  $I, J$  是  $R$  中理想, 若  $R = I + J$ , 则称  $I, J$  是互素的.

**引理 2.3.** 设  $R$  为环,  $I, J$  是  $R$  中互素理想, 则  $R/(I \cap J) \cong (R/I) \times (R/J)$

**证明.** 自然考虑

$$\begin{aligned} f: R &\longrightarrow (R/I) \times (R/J) \\ r &\longmapsto (r + I, r + J) \end{aligned}$$

$f$  是同态, 以及  $\ker f = I \cap J$  都是平凡的, 下面我们主要说明  $f$  是满的. 任取  $r_1, r_2 \in R$ , 且

$$\begin{aligned} r_1 &= x_1 + y_1 \\ r_2 &= x_2 + y_2 \end{aligned}$$

其中  $x_i \in I, y_i \in J$ , 则有

$$\begin{aligned} (r_1 + I, r_2 + J) &= (x_1 + y_1 + I, x_2 + y_2 + J) = (y_1 + I, x_2 + J) \\ &= (x_2 + y_1 + I, x_2 + y_1 + J) = f(x_2 + y_1) \end{aligned}$$

这就证明了  $f$  是满射. ■



**引理 2.4.** 设  $R$  为交换幺环,  $I_1, \dots, I_n$  是  $R$  中两两互素的理想, 则  $I_1 \cdots I_{n-1}$  与  $I_n$  互素.

证明. 只需注意

$$R \xrightarrow{R \text{ 中有幺元}} \underbrace{R \cdots R}_n = \prod_{k=1}^{n-1} (I_n + I_k) = I_n + I_1 \cdots I_{n-1}$$

■

**定理 2.5 (中国剩余).** 设  $R$  是交换幺环, 且  $I_1, \dots, I_n$  是  $R$  中两两互素的理想, 则

$$R / \left( \prod_{i=1}^n I_i \right) \cong (R/I_1) \times \cdots \times (R/I_n) \quad (2.5)$$

证明. 我们先证明  $I_1 I_2 = I_1 \cap I_2$ , 从而由 [引理, 2.4] 可以归纳得到

$$I_1 \cdots I_n = (I_1 \cdots I_{n-1}) I_n = (I_1 \cdots I_{n-1}) \cap I_n = \left( \bigcap_{k=1}^{n-1} I_k \right) \cap I_n = \bigcap_{k=1}^n I_k.$$

注意  $I_1 \cap I_2$  中元素  $x$  可以写为

$$x = x \cdot 1_R = x(y + z) = yx + xz \in I_1 I_2, \quad y \in I_1, z \in I_2$$

从而即得  $I_1 I_2 = I_1 \cap I_2$ . 下面我们归纳证明(2.5). 当  $n = 2$  时, 由 [引理, 2.3] 已经做好. 对一般情形, 由归纳假设则有

$$\begin{aligned} R / \left( \prod_{i=1}^n I_i \right) &= R / \left( \bigcap_{i=1}^n I_i \right) \cong \left( R / \left( \bigcap_{i=1}^{n-1} I_i \right) \right) \times (R/I_n) \\ &\cong (R/I_1) \times \cdots \times (R/I_n). \end{aligned}$$

■

称环  $R$  为整环, 如果  $R$  是没有零因子的交换幺环. 令  $R^* = R \setminus \{0\}$ , 在  $R \times R^*$  中定义关系为:  $(r_1, s_1) \sim (r_2, s_2)$ , 如果  $r_1 s_2 = r_2 s_1$ . 我们说明此关系是一种等价关系, 其中自反性和对称性是显然的, 下面主要说明传递性. 设  $(r_1, s_1) \sim (r_2, s_2)$ ,  $(r_2, s_2) \sim (r_3, s_3)$ , 则我们要证明  $r_1 s_3 = r_3 s_1$ , 由  $s_2 \neq 0$ , 我们只要说明  $r_1 s_2 s_3 = r_3 s_1 s_2$ :

$$r_1 s_2 s_3 = (r_1 s_2) s_3 = (r_2 s_1) s_3 = (r_2 s_3) s_1 = (r_3 s_2) s_1 = r_3 s_1 s_2.$$

这就证明了上面关系是等价关系, 则我们可以记  $F = (R \times R^*) / \sim$  表示上面等价关系得到的等价类的集合, 其中元素记为  $\frac{r}{s}$ , 表示以  $(r, s)$  为代表元的等价类. 在  $F$  中定义如下加法和乘法

$$\begin{aligned} \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} &:= \frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2} \\ \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} &:= \frac{r_1 r_2}{s_1 s_2} \end{aligned} \quad (2.6)$$

我们说明(2.6)的定义是良定的, 即若  $(r_1, s_1) \sim (r'_1, s'_1), (r_2, s_2) \sim (r'_2, s'_2)$ , 能有

$$\begin{aligned}(r_1 s_2 + r_2 s_1, s_1 s_2) &\sim (r'_1 s'_2 + r'_2 s'_1, s'_1 s'_2) \\ (r_1 r_2, s_1 s_2) &\sim (r'_1 r'_2, s'_1 s'_2)\end{aligned}$$

验证有

$$\begin{aligned}(r_1 s_2 + r_2 s_1) s'_1 s'_2 &= (r_1 s'_1) s_2 s'_2 + (r_2 s'_2) s_1 s'_1 = (r'_1 s_1) s_2 s'_2 + (r'_2 s_2) s_1 s'_1 = (r'_1 s'_2 + r'_2 s'_1) s_1 s_2 \\ r_1 r_2 s'_1 s'_2 &= (r_1 s'_1) (r_2 s'_2) = (r'_1 s_1) (r'_2 s_2) = r'_1 r_2 s_1 s_2.\end{aligned}$$

这样我们就完成了定义良定性的验证, 则  $F$  在(2.6)的加法和乘法下构成一个整环, 且

$$\begin{aligned}O_F &= \frac{O_R}{s}, \quad \forall s \in R^* \\ 1_F &= \frac{1_R}{1_R} = \frac{s}{s}, \quad \forall s \in R^*\end{aligned}$$

那么对任意  $F$  中非零元  $\frac{r}{s} (r \neq 0)$ ,  $\frac{s}{r}$  是有意义的, 且  $\frac{r}{s} \cdot \frac{s}{r} = 1_F$ , 于是  $F$  是域, 称为  $R$  的分式域.

**命题 2.6.** 设  $R$  是整环,  $F$  是  $R$  的分式域. 若  $\varphi$  是  $R \rightarrow F'$  的单同态, 其中  $F'$  是域, 则存在唯一的同态  $\psi: F \rightarrow F'$  使得如下交换图成立, 即分式域唯一.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & F' \\ \downarrow f & \nearrow \psi & \\ F & & \end{array}$$

其中  $f: r \mapsto \frac{r}{1}$  为自然嵌入.

**证明.** 存在性: 定义  $\psi: \frac{r}{s} \mapsto \varphi(r)\varphi(s)^{-1}$ , 容易验证  $\psi$  是环同态, 且  $\varphi = \psi \circ f$ . 下面主要证明唯一性.

若  $F \rightarrow F'$  的域同态  $\psi_1, \psi_2$  满足  $\varphi = \psi_1 \circ f = \psi_2 \circ f$ , 即  $\psi_1\left(\frac{r}{1}\right) = \psi_2\left(\frac{r}{1}\right), \forall r \in R$ , 我们证明  $\psi_1 = \psi_2$ . 设  $r \neq 0$ , 则由域之间同态的性质有

$$\psi_1\left(\frac{1}{r}\right) = \psi\left(\left(\frac{r}{1}\right)^{-1}\right) = \psi_1\left(\frac{r}{1}\right)^{-1} = \psi_2\left(\frac{r}{1}\right)^{-1} = \psi_2\left(\frac{1}{r}\right)$$

于是对于  $F$  中非零元  $\frac{r}{s} (r \neq 0)$ , 我们有

$$\psi_1\left(\frac{r}{s}\right) = \psi_1\left(\frac{r}{1} \cdot \frac{1}{s}\right) = \psi_1\left(\frac{r}{1}\right) \cdot \psi_1\left(\frac{1}{s}\right) = \psi_2\left(\frac{r}{1}\right) \cdot \psi_2\left(\frac{1}{s}\right) = \psi_2\left(\frac{r}{s}\right)$$

且环同态, 都自然的将零元映为零元, 于是  $\psi_1 = \psi_2$ . ■

设  $R$  是交换幺环,  $I$  是  $R$  的理想, 则  $R/I$  是交换幺环, 若要求  $R/I$  是整环, 则要求, 若

$$(a + I) \cdot (b + I) = a \cdot b + I = I$$

能够推出  $a + I = I$  或者  $b + I = I$ , 换句话说  $ab \in I$ , 能够推出  $a \in I$  或者  $b \in I$ . 于是引出

**定义 2.1.** 设  $R$  是环,  $I \neq R$  是  $R$  中理想, 称  $I$  是素理想, 如果对于  $ab \in I$ , 能推出  $a \in I$  或者  $b \in I$ .

设  $R$  是交换幺环,  $I$  是  $R$  中理想, 如果要求  $R/I$  是域, 首先要保证  $R/I$  只有平凡的理想, 这意味着包含  $I$  的  $R$  中理想只能是  $I$  或者是  $R$ . 自然引出

**定义 2.2.** 设  $R$  是环,  $I \neq R$  是  $R$  中理想, 称  $I$  是  $R$  中极大理想, 如果包含  $I$  的理想只有  $I$  和  $R$ .

**命题 2.7.** 在交换幺环  $R$  中,  $I$  是  $R$  中理想, 则  $R/I$  是域当且仅当  $I$  是极大理想.

证明. 当  $R/I$  是域时, 则对任意  $a \notin I$ , 存在  $b \in R$ , 使得  $ab - 1_R \in I$ . 于是若  $R$  中理想  $J$  满足  $J \supsetneq I$ , 则存在  $a \in J \setminus I$ , 以及相应的  $b \in R$ , 使得  $ab - 1_R \in I \subset J$ , 注意  $ab \in J$ , 这意味着  $1_R = ab - (ab - 1_R) \in J$ , 于是  $J = R$ .

反之, 当  $I$  是极大理想时, 由  $R/I$  中理想与  $R$  中包含  $I$  的理想有一一对应关系, 这意味着  $R/I$  只有平凡理想, 则对任意  $a \notin I$ , 有

$$R/I = \langle a + I \rangle = \{(a + I)(b + I) \mid b \in R\} = \{ab + I \mid b \in R\}$$

特别地, 存在某个  $b \in R$ , 使得  $1_R + I = (a + I)(b + I)$ , 这意味着  $a + I$  有乘法逆元, 于是  $R/I$  是域. ■

## 2.2 整环上的讨论

设  $R$  是整环,  $a, b \in R$ , 若存在  $c \in R$ , 使得  $a = bc$ , 则称  $b|a$ ,  $b$  视为  $a$  的因子. 记  $U$  是  $R$  中乘法可逆元全体, 其中元素称为单位. 若存在  $c \in U$ , 使得  $a = bc$ , 则称  $a$  与  $b$  相伴, 记为  $a \sim b$ . 注意相伴关系是一种等价关系.

设  $R$  是整环, 且  $a \in R$ , 称与  $a$  相伴的元素以及单位是  $a$  的平凡因子. 如果  $a \in R^* \setminus U$  (即不考虑单位) 没有非平凡因子, 则称  $a$  是  $R$  中的不可约元素.

设  $R$  是整环, 如果  $p \in R^* \setminus U$ , 满足  $p \mid ab$ , 能够推出  $p \mid a$  或者  $p \mid b$ , 则称  $p$  是  $R$  中素元素.

设  $R$  是整环, 从理想的角度来看,  $a \in R$  是不可约元当且仅当  $\langle a \rangle$  是极大主理想.  $p \in R$  是素元, 当且仅当  $\langle p \rangle$  是素理想.

简单事实有: 素元都是不可约元.

称整环  $R$  满足素性条件, 如果  $R$  中不可约元都是素元, 即不可约元与素元等价.

设  $R$  是整环,  $a, b \in R$ , 如果存在  $a, b$  的公因子  $d$ , 满足对任意  $a, b$  的公因子  $d_1$ , 都有  $d_1 \mid d$ , 则称  $d$  是  $a, b$  的最大公因子, 简单事实是: 最大公因子在相伴意义下唯一, 所以如果  $d$  是  $a, b$  的一个最大公因子, 我们就简记为  $d \sim (a, b)$ .

**定义 2.3.** 设  $R$  是整环, 如果  $R$  中任何两个元素都有最大公因子, 则称  $R$  是满足最大公因子条件的整环, 简称为  $GCD$  整环.

在  $GCD$  整环中, 有如下简单性质:  $c(a, b) \sim (ca, cb)$ ;  $((a, b), c) \sim (a, (b, c))$ ; 于是当  $(a, b) \sim 1, (a, c) \sim 1$  时,

$$(a, bc) \sim ((a, ac), bc) \sim (a, (ac, bc)) \sim (a, c) \sim 1.$$

**引理 2.8.** 设  $R$  是  $GCD$  整环, 则  $R$  满足素性条件.

证明. 设  $p$  是  $R$  中不可约元, 若  $p \mid ab$ , 且  $p \nmid a, p \nmid b$ , 这意味着  $(p, a) \sim 1, (p, b) \sim 1$ , 于是  $(p, ab) \sim 1$ , 这与  $p \mid ab$  矛盾, 于是  $p$  是素元. ■

**定义 2.4.** 设  $R$  是整环, 若对任意  $a, b \in R$ , 存在  $d \in R$ , 使得  $\langle a \rangle + \langle b \rangle = \langle d \rangle$ , 即主理想加主理想仍是主理想, 则称  $R$  是 Bezout 整环.

**引理 2.9.** Bezout 整环都是  $GCD$  整环.

证明. 对任意  $a, b \in R$ , 设  $\langle a \rangle + \langle b \rangle = \langle d \rangle$ . 由  $\langle a \rangle \subset \langle d \rangle, \langle b \rangle \subset \langle d \rangle$ , 得  $d$  是  $a, b$  的公因子. 且存在  $u, v \in R$ , 使得  $au + bcv = d$ , 这意味着  $a, b$  的任何公因子都要整除  $d$ , 于是  $d$  就是  $a, b$  的一个最大公因子. ■

**定义 2.5.** 设  $R$  是整环, 如果  $R$  中理想都是主理想, 则称  $R$  是主理想整环, 简称为  $PID$  整环.

由定义, 主理想整环是比 Bezout 整环性质更好的环.

**定义 2.6.** 设  $R$  是整环, 称  $R$  是唯一分解整环 (简称为  $UFD$  整环), 如果对任意  $a \in R^* \setminus U$ ,  $a$  可分解为有限不可约元素的积, 且在相伴意义下, 分解唯一, 即若

$$a = p_1 \cdots p_s = q_1 \cdots q_m$$

其中  $p_i, q_j$  都是不可约元, 则  $s = m$ , 且存在  $\sigma \in S_m$ , 使得  $q_i \sim p_{\sigma(i)}$ .

**定义 2.7.** 设  $R$  是整环, 如果  $R$  中不存在真因子序列  $\{a_i\}_{i=1}^{\infty}$ , 其中  $a_{i+1}$  是  $a_i$  的真因子, 则称  $R$  满足因子链条件.

设整环  $R$  满足因子链条件, 意味着若  $a \in R^* \setminus U$ , 则  $a$  从任意方式都可分解为有限不可约元素的乘积. 从理想的角度看, 若有主理想升链

$$\langle a_1 \rangle \subset \langle a_2 \rangle \subset \cdots \subset \langle a_n \rangle \subset \cdots$$

则存在  $j$ , 使得当  $k \geq j$  时,  $\langle a_k \rangle = \langle a_j \rangle$ .

**定理 2.10.** 设  $R$  是整环, 则  $R$  是唯一分解整环当且仅当  $R$  满足素性条件和因子链条件.

证明. 设  $R$  是唯一分解整环, 则对任意  $a, b \in R$ , 由唯一有限分解性,  $R$  满足因子链条件, 且可以将  $a, b$  表示为如下形式

$$\begin{aligned} a &= p_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s}, \quad r_i \geq 0 \\ b &= p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s}, \quad k_i \geq 0 \end{aligned}$$

其中  $p_i$  是不可约元, 且  $p_i^0$  应视为  $R$  中么元或者某个单位. 那么  $d = \prod_{i=1}^s p_i^{\min\{r_i, k_i\}}$  就是  $a, b$  的一个最大公因子, 由 [引理, 2.8],  $R$  满足素性条件.

反之, 因子链条件保证对任意  $a \in R^* \setminus U$ ,  $a$  至少存在一种有限分解. 若

$$a = p_1 \cdots p_s = q_1 \cdots q_m$$

是  $a$  的两种不可约分解, 则由素性条件, 对每个  $p_i$ , 存在  $q_j$ , 使得  $p_i \sim q_j$ , 这也意味着  $s \leq m$ , 否则  $p_s$  只能是单位, 矛盾. 同理, 应该也要有  $m \leq s$ , 于是唯一性即证. ■

**命题 2.11.** 主理想整环是唯一分解整环.

证明. 设  $R$  是主理想整环, 由 [引理, 2.8, 2.9],  $R$  满足素性条件. 若

$$\langle a_1 \rangle \subset \langle a_2 \rangle \subset \cdots \subset \langle a_n \rangle \subset \cdots$$

是  $R$  中主理想升链, 则  $I = \bigcup_{i=1}^{\infty} \langle a_i \rangle$  是  $R$ , 其中验证最关键的是  $I$  是否构成子环, 即若  $x, y \in I$ , 设  $x \in \langle a_k \rangle, y \in \langle a_j \rangle$ , 不妨设  $j \geq k$ , 则  $x - y \in \langle a_j \rangle \subset I$ .

由  $I$  是主理想, 则存在  $d \in I$ , 使得  $I = \langle d \rangle$ , 特别地, 由  $d \in I$ , 得到存在  $j$ , 使得  $d \in \langle a_j \rangle$ , 于是  $\langle d \rangle \subset \langle a_j \rangle$ , 那么就有  $\langle d \rangle = \langle a_j \rangle$ . 于是当  $k \geq j$  时,  $\langle a_k \rangle = \langle a_j \rangle$ . ■

**定义 2.8.** 设  $R$  是整环, 若存在映射  $\delta: R^* \rightarrow N$ , 满足对任意  $a \in R, b \in R^*$ , 存在  $q, r \in R$ , 使得  $a = bq + r$ , 其中  $r = 0$ , 或者有  $\delta(b) < \delta(r)$ , 则称  $R$  是欧几里得整环,  $\delta$  为  $R$  的一个欧几里得赋值.

**命题 2.12.** 欧几里得整环是主理想整环, 从而是唯一分解整环.

证明. 设  $R$  是欧几里得整环,  $\delta$  为  $R$  的一个欧氏赋值,  $I$  是  $R$  中一个理想, 则  $\delta(I)$  是  $N$  的一个子集, 从而存在最小元素, 取  $a \in I$ , 满足  $\delta(a) = \min \{\delta(I)\}$ . 则由  $a$  的取法, 对任意  $b \in I$ , 一定有  $a \mid b$ , 于是  $I = \langle a \rangle$ , 即  $R$  是主理想整环. ■

**例 2.1.** 整环  $R = \mathbb{Z} \left[ \frac{1+\sqrt{-19}}{2} \right]$  是主理想整环但不是欧几里得环.

证明. 见: [An Elementary Proof by Robert A. Wilson \(QMUL\)](#) ■

### 2.3 唯一分解多项式环

设  $R$  是环, 一个  $R$  上的多项式是指如下形式

$$p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad a_i \in R, \quad n \geq 0.$$

$a_i$  称为多项式系数. 我们记  $R[x]$  为系数在  $R$  上的所有多项式全体, 即

$$R[x] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in R, 0 \leq n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

两个多项式相等如果它们的系数完全相同. 如果  $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$  且  $a_n \neq 0$ , 则我们称  $n$  是多项式  $p(x)$  的次数, 记为  $\deg p$ . 系数  $a_n$  称为多项式  $p(x)$  的首项系数. 我们定义零多项式的次数为  $-\infty$ .

对于一个多项式  $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ , 当  $k > \deg p$  时, 我们假定  $a_k = 0$ . 那么给定两个多项式  $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$  和  $q(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ , 我们就可以定义它们的和  $p(x) + q(x)$  为

$$(p+q)(x) = \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i + b_i) x^i.$$

定义乘积  $p(x)q(x)$  为

$$(pq)(x) = \sum_{i=0}^{m+n} c_i x^i,$$

其中

$$c_i = \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j}.$$

则在这两种运算下,  $R[x]$  构成一个环. 且若  $1_R$  是  $R$  中幺元, 则  $1_R$  也是  $R[x]$  中幺元.

当  $R$  为整环时, 对任意  $f, g \in R[x]$ , 有  $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ , 这意味着  $R[x]$  也是整环, 同时  $R[x]$  中的单位一定也是  $R$  中单位, 因为若  $\deg f > 0$ , 不会存在  $g \in R[x]$ , 使得

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g = \deg(1_R) = 0.$$

**引理 2.13.** 设  $R$  是域, 则  $R[x]$  是欧几里得环.

**证明.** 我们只要说明对任意  $f \in R[x], 0 \neq g \in R[x]$ , 使得存在  $q, r \in R[x]$ , 满足  $f = qg + r$ , 其中  $r = 0$  或者  $\deg r < \deg g$ , 这样  $\deg$  就是  $R[x]$  中的一个欧氏赋值, 从而  $R[x]$  是欧几里得环.

除去平凡的情况, 设  $\deg f = n, \deg g = m$ , 假定结论对次数小于  $n$  多项式成立, 不妨设

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i, \quad n > m$$

则

$$\tilde{f} = f - \frac{a_n}{b_m} \cdot x^{n-m} \cdot g$$

的次数小于  $n$ , 由归纳假设即得. ■

设  $R$  是唯一分解整环, 对于  $f \in R[x]$ , 下面我们记  $\gcd(f)$  表示  $f$  的各项系数的最大公因子, 如果  $\deg(f) \sim 1$ , 则称  $f$  是本原多项式. 对任意  $f \in R[x]$ ,  $f$  都可以写成  $f = cf_1$ , 其中  $f_1$  是本原多项式, 且容易看出在相伴意义下, 这种分解唯一, 即若  $f = c_1 f_1 = c_2 f_2$ , 其中  $f_1, f_2$  是本原的, 则  $c_1, c_2$  相差一个  $R$  中单位.

设  $R$  是唯一分解整环, 若  $f \in R[x]$  是本原的, 如果  $f$  有非平凡因子  $g$ , 则  $\deg g > 0$ . 那么对任意次数大于零的  $f \in R[x]$ , 由次数的有限性,  $f$  可有限分解为

$$f = u \cdot f_1 \cdots f_s, \quad \deg f_i > 0, \quad u \in R$$

其中  $f_i$  是  $R[x]$  中不可约元 (自然也是本原的), 再由  $u \in R$  可以唯一有限分解, 故  $f$  在  $R[x]$  中存在有限不可约分解.

**引理 2.14 (Gauss 引理).** 设  $R$  是唯一分解整环,  $f_1, f_2 \in R[x]$  是本原的, 则  $f_1 f_2$  也是本原的.

**证明.** 假如  $\gcd(f_1 f_2)$  不是单位, 则由  $R$  是唯一分解整环, 可以取  $\gcd(f_1 f_2)$  的一个不可约因子  $p$ , 其也是  $R$  中的素元, 于是  $\tilde{R} = R/\langle p \rangle$  是整环, 则  $\tilde{R}[x]$  也是整环. 考虑

$$\varphi: R[x] \longrightarrow \tilde{R}[x]$$

$$\sum_{i=0}^m a_i x^i \longmapsto \sum_{i=0}^m (a_i + \langle p \rangle) x^i$$

则  $\varphi$  是环同态, 且  $O_{\tilde{R}} = \langle p \rangle = \varphi(f_1 f_2) = \varphi(f_1) \varphi(f_2)$ , 这意味着  $\varphi(f_1) = O_{\tilde{R}}$  或者  $\varphi(f_2) = O_{\tilde{R}}$ , 即  $p \mid \gcd(f_1)$  或者  $p \mid \gcd(f_2)$ , 但是这与  $f_1, f_2$  本原相矛盾. ■

**引理 2.15.** 设  $R$  是唯一分解整环,  $F$  是  $R$  的分式域, 则对任意  $0 \neq f \in F[x]$ , 存在  $r \in F$ , 和  $f_1 \in R[x]$  是本原的, 使得  $f = r f_1$ , 且此分解在  $R$  中相伴关系下唯一

**证明.** 存在性就是通分, 即存在  $b \in R^*$ , 使得  $f = \frac{f'}{b}$ , 其中  $f' \in R[x]$ , 于是存在  $c \in R$ , 使得  $f = \frac{c}{b} f_1$ , 其中  $f_1(x) \in R[x]$  是本原的, 令  $r = \frac{c}{b}$  即得. 若  $f$  存在两种分解, 记为

$$f = \frac{c_1}{b_1} f_1 = \frac{c_2}{b_2} f_2,$$

其中  $f_1, f_2 \in R[x]$  是本原的. 则有  $b_2 c_1 f_1 = c_2 b_1 f_2$ , 于是存在  $R$  中单位  $u$ , 使得  $b_2 c_1 = u b_1 c_2$ , 即  $\frac{c_1}{b_1} = u \frac{c_2}{b_2}$ . ■

设  $R$  是唯一分解整环,  $F$  是  $R$  的分式域,  $f_1, f_2 \in R[x]$  是本原的, 且存在  $u \in F$ , 使得  $f_1 = u f_2$ , 则由 [引理, 2.15] 分解的唯一性, 一定有  $u \in R$ .

**引理 2.16.** 设  $R$  是唯一分解整环,  $F$  是  $R$  分式域, 若  $f(\deg f > 0)$  是  $R[x]$  中的不可约元, 则  $f$  也是  $F[x]$  中的不可约元.

证明. 若  $f$  在  $F[x]$  中存在真因子, 即存在  $f_1, f_2 \in F[x]$ , 满足  $f = f_1 f_2$ , 其中  $\deg f_1 > 0, \deg f_2 > 0$ . 则由 [引理, 2.15], 存在  $r_1, r_2 \in F$ , 使得  $f = r_1 r_2 f'_1 f'_2$ , 其中  $f'_1, f'_2$  是  $R[x]$  中次数大于零的本原多项式. 由 [引理, 2.14],  $f'_1 f'_2$  也是本原的, 那么就有  $r_1 r_2 \in R$ , 这意味着  $f$  在  $R[x]$  中可分解, 矛盾. ■

**定理 2.17.** 设  $R$  是唯一分解整环, 则  $R[x]$  也是唯一分解整环.

证明. 对于非平凡的情形, 考虑  $f \in R[x]$ , 满足  $\deg f > 0$ , 我们已经说明了  $f$  存在有限分解, 若  $f$  存在两种有限分解

$$f = (u_1 \cdots u_k) p_1 \cdots p_s = (v_1 \cdots v_l) q_1 \cdots q_t, \quad u_m, v_n \in R, \quad \deg p_i > 0, \quad \deg q_j > 0$$

其中  $u_m, v_n$  是  $R$  中不可约元;  $p_i, q_j$  是  $R[x]$  中的不可约元, 由 [引理, 2.14],  $p_1 \cdots p_s$  与  $q_1 \cdots q_t$  也是  $R[x]$  中本元多项式, 则  $u_1 \cdots u_k$  与  $v_1 \cdots v_l$  相差一个  $R$  中单位, 从而由  $R$  是唯一分解整环, 得  $k = j$ , 且存在置换  $\sigma \in S_k$ , 使得  $u_i \sim v_{\sigma(i)}$ .

再由 [引理, 2.13],  $f$  在  $F[x]$  中是唯一分解的, 且由 [引理, 2.16],  $p_i, q_j$  也是  $F[x]$  中的不可约元, 故  $s = t$ , 且对每个  $p_i$ , 存在  $q_j$ , 和  $c_i \in F$ , 使得  $p_i = c_i q_j$ , 那么由 [引理, 2.15] 分解的唯一性, 一定有  $c_i \in R$ , 且  $c_1 \cdots c_s$  是  $R$  中单位, 于是每个  $c_i$  都是  $R$  中单位, 这就证明了唯一性. ■

## 3 群

### 3.1 交错单群 $A_n (n \geq 5)$

对任意  $\sigma \in S_n$ ,  $\sigma$  都可以写为不相交轮换的乘积:

$$\sigma = (i_1 \cdots i_k) \cdots (j_1 \cdots j_t) \quad (3.1)$$

且在不记顺序情形之下, (3.1) 表法唯一, 称为是  $\sigma$  的循环分解.

令  $m_k$  表示  $\sigma$  分解式 (3.1) 中长度为  $k$  的轮换个数, 则我们可以记

$$\alpha_\sigma = (m_1, m_2, \cdots, m_n), \quad \sum_{k=1}^n k m_k = n.$$

我们用向量  $\vec{m} = (m_1, m_2, \dots, m_n)$  表示一种轮换型.



**引理 3.1.** 设  $\sigma, \tau \in S_n$ , 且  $\tau = (i_1 \cdots i_k)$ , 则

$$\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(i_1) \cdots \sigma(i_k)) \quad (3.2)$$

证明. 对于任意  $j \in \{1, \dots, n\}$ , 当  $\sigma^{-1}(j) \notin \{i_1, \dots, i_k\}$ , 即  $j \notin \{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k)\}$  时,

$$\sigma\tau\sigma^{-1}(j) = j = (\sigma(i_1) \cdots \sigma(i_k))(j)$$

当  $\sigma^{-1}(j) \in \{i_1, \dots, i_k\}$ , 即  $j \in \{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k)\}$  时, 不妨设  $j = \sigma(i_s)$ , 则

$$\sigma\tau\sigma^{-1}(j) = \sigma(i_{s+1}) = (\sigma(i_1) \cdots \sigma(i_k))(j)$$

这样即得. ■

由 [引理, 3.1], 我们不难得到

**命题 3.2.** 设  $\sigma, \tau \in S_n$ , 则  $\sigma, \tau$  相互共轭当且仅当  $\alpha_\sigma = \alpha_\tau$ , 即  $\sigma, \tau$  要有相同的轮换型.

群  $S_n$  是其所有互不相交的共轭类的并集. 因此, 群的阶等于所有共轭类大小之和:

$$|S_n| = \sum_{C \in \text{Conj}(S_n)} |C| \quad (3.3)$$

其中  $\text{Conj}(S_n)$  表示  $S_n$  共轭类的集合.

对于给定的轮换型  $\vec{m}$ , 其对应的共轭类  $C_{\vec{m}}$  中包含的元素个数 (即具有该轮换型的置换数量) 由以下公式给出:

$$|C_{\vec{m}}| = \frac{n!}{\prod_{k=1}^n k^{m_k} \cdot m_k!} \quad (3.4)$$

式(3.4)的组合意义如下:

- 分子  $n!$  是  $n$  个元素的全排列;
- 分母  $k^{m_k}$  消除了每个长度为  $k$  的轮换内部循环移位带来的重复;
- 分母  $m_k!$  消除了  $m_k$  个相同长度轮换之间顺序交换带来的重复;

**例 3.1.** 对任意  $n \in N^+$ , 有如下组合恒等式成立

$$1 = \sum_{\substack{0 \leq m_k \leq n; \\ \sum_{k=1}^n km_k = n}} \prod_{k=1}^n \frac{1}{(m_k)! \cdot k^{m_k}}$$

证明. 将共轭类大小公式(3.4)代入式 (3.3), 就有

$$n! = \sum_{\substack{0 \leq m_k \leq n \\ \sum_{k=1}^n km_k = n}} \frac{n!}{\prod_{k=1}^n k^{m_k} \cdot m_k!}$$

两边同时除以  $n!$  即得. ■

**引理 3.3.** 对于  $n \geq 3$ , 交错群  $A_n$  由所有的 3-轮换生成.

证明.  $A_n$  中的元素是偶置换, 即偶数个对换的乘积. 因此只需证明任意两个对换的乘积可以写成 3-轮换的乘积即可. 设  $i, j, k, l$  互不相同, 则

$$\begin{aligned}(ij)(jk) &= (ijk) \\ (ij)(kl) &= (ij)(jk)(jk)(kl) = (ijk)(jkl)\end{aligned}\tag{3.5}$$

式(3.5)已经包含了所有可能轮换乘积的情形, 这样我们就完成了证明. ■

**引理 3.4.** 对于  $n \geq 5$ ,  $A_n$  中所有的 3-轮换在  $A_n$  中共轭.

证明. 由 [命题, 3.2], 在  $S_n$  中, 所有的 3-轮换属于同一个共轭类. 设  $\tau \in S_n$  使得  $\tau\sigma_1\tau^{-1} = \sigma_2$ , 其中  $\sigma_1, \sigma_2$  为任意两个 3-轮换.

- 若  $\tau \in A_n$ , 则结论显然成立.
- 若  $\tau \notin A_n$  (即  $\tau$  为奇置换), 由于  $n \geq 5$ , 我们总可以找到两个元素  $d, e$  不在  $\sigma_1$  的变动元中. 令  $\tau' = \tau(de)$ . 此时  $\tau'$  为偶置换, 即  $\tau' \in A_n$ . 且由于  $(de)$  与  $\sigma_1$  不相交,  $(de)$  与  $\sigma_1$  可交换, 故:

$$\tau'\sigma_1(\tau')^{-1} = \tau(de)\sigma_1(de)^{-1}\tau^{-1} = \tau\sigma_1\tau^{-1} = \sigma_2$$

综上, 在  $n \geq 5$  时, 任意两个 3-轮换在  $A_n$  中也是共轭的. ■

**定理 3.5.** 当  $n \geq 5$  时, 交错群  $A_n$  是单群.

证明. 设  $N \neq \{e\}$  是  $A_n$  的正规子群, 我们要证明  $N = A_n$ . 由 [引理, 3.3], 我们只要证明  $N$  包含  $A_n$  中所有 3-轮换. 再由 [引理, 3.4], 我们只要证明  $N$  中有一个 3-轮换.

任取  $\sigma \in N, \sigma \neq (1)$ . 我们对  $\sigma$  的循环分解进行分类讨论:

**情形 1:**  $\sigma$  的分解中包含一个长度  $r \geq 4$  的轮换

不妨设  $\sigma = (123\dots r)\tau$ , 其中  $\tau$  是与其他元素不相交的置换. 令  $\delta = (123) \in A_n$ . 考虑换位子  $\rho = \sigma\delta\sigma^{-1}\delta^{-1}$ . 由于  $N \trianglelefteq A_n$ , 故  $\rho \in N$ .

$$\begin{aligned}\rho &= \sigma(123)\sigma^{-1}(132) \\ &= (\sigma(1)\sigma(2)\sigma(3))(132) \\ &= (234)(132) \\ &= (124)\end{aligned}$$

计算结果  $(124)$  是一个 3-轮换. 故  $N$  包含 3-轮换.

**情形 2:  $\sigma$  的分解中包含至少两个不相交的 3-轮换**

不妨设  $\sigma = (123)(456)\tau$ . 令  $\delta = (124) \in A_n$ . 同样考虑换位子  $\rho = \sigma\delta\sigma^{-1}\delta^{-1} \in N$ .

$$\begin{aligned}\rho &= \sigma(124)\sigma^{-1}(142) \\ &= (\sigma(1)\sigma(2)\sigma(4))(142) \\ &= (235)(142) \\ &= (14235)\end{aligned}$$

此时  $\rho$  是一个 5-轮换. 这将我们带回了**情形 1** (循环长度  $\geq 4$ ). 对  $\rho$  再次应用**情形 1** 的方法, 即可得到  $N$  包含 3-轮换.

**情形 3:  $\sigma$  是若干不相交的对换 (2-轮换) 之积**

由于  $\sigma$  是偶置换, 它至少包含两个对换. 不妨设  $\sigma = (12)(34)\tau$ , 其中  $\tau$  固定  $1, 2, 3, 4$ . 由于  $n \geq 5$ , 必然存在元素 5. 令  $\delta = (125) \in A_n$ . 构造元素  $\sigma' = \delta\sigma\delta^{-1} \in N$ , 则

$$\sigma' = (125)[(12)(34)\tau](152) = (25)(34)\tau$$

注意  $\delta$  仅影响  $1, 2, 5$ , 而  $\tau$  与这些无关, 故  $\tau$  保持不变. 现在考虑  $\sigma'\sigma^{-1} \in N$ :

$$\begin{aligned}\sigma'\sigma^{-1} &= [(25)(34)\tau] \cdot [\tau^{-1}(34)(12)] \\ &= (25)(34)(34)(12) \\ &= (25)(12) \\ &= (125)\end{aligned}$$

结果  $(125)$  是一个 3-轮换. 故  $N$  包含 3-轮换.

综上所述, 无论  $\sigma$  属于何种循环类型,  $N$  中必然包含一个 3-轮换. 因此  $N = A_n$ , 即  $A_n$  是单群. ■

**例 3.2.** 当  $n \geq 5$  时,  $S_n$  的非平凡正规子群只有  $A_n$ .

**证明.** 设  $\{e\} \neq N$  是  $S_n$  的正规子群, 则  $A_n \cap N$  也是  $S_n$  的正规子群, 由  $A_n$  是单群, 只可能是  $A_n \cap N = A_n$  或者  $A_n \cap N = \{e\}$ . 但是另一方面, 由第二同构有

$$|NA_n/A_n| = |A_n/(A_n \cap N)| \leq 2$$

这意味着不可能有  $A \cap N = \{e\}$ , 于是  $A_n \subset N$ . 若  $N \neq A_n$ , 则  $N$  中有一个奇置换  $\sigma$ , 那么  $\sigma A_n \subset N$  就是  $S_n$  的所有奇置换, 此时  $N = S_n$ . ■

**例 3.3.** 当  $n \geq 3$  时,  $C(S_n) = \{(1)\}$  是平凡的.

证明. 对任意  $(1) \neq \sigma \in S_n$ , 则存在  $i \in \{1, \dots, n\}$ , 使得  $\sigma(i) \neq i$ , 记  $j = \sigma(i)$ , 于是  $n \geq 3$ , 可取  $k$ , 使得  $i, j, k$  互不相同. 考虑  $\tau = (jk)$ , 则  $j = \sigma\tau(i) \neq \tau\sigma(i) = k$ , 这意味着  $\sigma \notin C(S_n)$ , 于是  $C(S_n) = \{(1)\}$ . ■

**例 3.4.** 设  $G$  是置换群, 若  $G$  中有奇置换, 则  $G$  中存在指数为 2 的子群  $H$ .

证明. 令  $H$  是  $G$  中所有偶置换的集合, 则  $H \triangleleft G$ . 设  $\sigma$  是  $G$  的一个奇置换, 则  $\sigma H$  是  $G$  的所有奇置换 (对于任意  $G$  的奇置换  $\tau$ , 有  $\tau = \sigma(\sigma^{-1}\tau) \in \sigma H$ ). 于是  $G = H \cup \sigma H$ , 即  $[G : H] = 2$ . ■

**例 3.5.** 设  $G$  是阶数为  $2n$  的群, 其中  $n$  是奇数, 则  $G$  中存在  $n$  阶子群  $H$ , 即  $H$  是指数为 2 的正规子群.

证明. 考虑  $G$  在  $G$  上的左平移作用, 其诱导了  $G \rightarrow S_G$  的同态  $\varphi$ , 且  $\varphi$  是单射. 因此可以将  $G$  等同 (群同构) 于  $S_G$  的子群  $\text{im}\varphi$ . 设  $g$  是  $G$  的一个二阶元, 则  $\varphi(g)^2 = \varphi(g^2) = \text{id}$ , 且  $\varphi(g)$  没有不动点, 因此  $\varphi(g)$  可以表示为  $n$  个不相交的 2-轮换之积, 即  $\varphi(g)$  是一个奇置换, 由 [例, 3.4], 结论得证. ■

**例 3.6.** 设  $G$  是有限群,  $p$  是  $G$  的最小素因子. 若  $[G : H] = p$ , 则  $H \triangleleft G$ .

证明. 考虑  $G$  在左陪集集合  $X = G/H$  上的左平移作用.  $|X| = [G : H] = p$ . 设此作用诱导的同态为  $\varphi : G \rightarrow S_X \cong S_p$ . 设  $K = \ker \varphi$ . 根据同态基本定理,  $G/K \cong \text{Im}(\varphi) \leq S_p$ . 由此可知  $|G/K|$  能够整除  $|S_p| = p!$ . 同时

$$K = \ker \varphi = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} < H$$

这意味着  $|G/K|$  是  $p$  的倍数, 且  $|G/K|$  是  $|G|$  的因子. 设  $|G/K| = mp$ , 则  $m \mid (p-1)!$  且  $m \mid |G|$ , 但是注意  $(p-1)!$  的素因子都小于  $p$ , 以及  $p$  是  $|G|$  的最小素因子, 综合只能是  $m = 1$ , 即  $K = H$ . ■

**例 3.7.** 在  $A_4$  中, 不存在指数为 2 的子群.

证明. 设  $H < A_4$ , 且  $[A_4 : H] = 2$ , 这意味着对任意  $g \notin H$ , 有  $A_4 = H \cup gH$ , 也就是有  $g^2 \in H$ . 注意三轮换的阶为 3, 即有

$$(abc) = (abc)^4 = ((abc)^2)^2 \in H$$

但是  $A_4$  中有  $C_4^3 \times 2 = 8$  个三轮换, 如果将其写出来即是

$$(123), (132), (124), (142), (134), (143), (234), (243)$$

即  $|H| \geq 8$ , 这与  $|H| = 6$  矛盾. ■

**例 3.8.** 6 阶群只有  $\mathbb{Z}_6$  和  $S_3$ .

证明. 设  $G$  是 6 阶非循环群, 由 sylow 定理  $G$  有 2 阶和 3 阶群  $\langle a \rangle$  与  $\langle b \rangle$ , 则  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$ . 考虑  $G$  在  $G/\langle a \rangle$  上的左诱导作用, 其诱导了一个同态  $\rho: G \rightarrow S_{G/\langle a \rangle} \cong S_3$ , 我们如果能说明  $\rho$  是单的, 则比较阶数就有  $G \cong \text{im} \rho = S_{G/H} \cong S_3$ . 若  $g \in \ker \rho$ , 则  $g\langle a \rangle = \langle a \rangle$ , 即  $g \in \langle a \rangle$ , 因此若  $\ker \rho$  非平凡, 则一定有  $g = a$ , 那么就有  $a(b\langle a \rangle) = b\langle a \rangle$ , 这意味着一定有  $ab = ba$ , 那么  $ab$  的阶即是 6, 但是我们已经假定了  $G$  不是循环群, 矛盾. ■

### 3.2 有限群的合成序列

设  $G$  是群,  $H, K$  是  $G$  的子群, 令

$$HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$$

若我们要求  $HK$  是  $G$  的子群, 则首先要有  $HK$  中元素逆的全体  $KH \subset HK$ , 即要有  $HK = KH$ . 且当  $HK = KH$  时,

$$(h_1 k_1)(k_2^{-1} h_2^{-1}) = h_1(k_1 h_2)' k_2' = h_1 h_3 k_3 k_2' \in HK$$

即  $HK$  是  $G$  子群, 且

$$h_1 K = h_2 K \iff h_2^{-1} h_1 \in K \iff h_2^{-1} h_1 \in H \cap K \iff h_1(H \cap K) = h_2(H \cap K)$$

这样就得到

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}.$$

特别地, 当  $H$  或  $K$  是  $G$  正规子群, 则  $HK$  是  $G$  的子群.

设  $G$  是群,  $H_1, H_2, H_3$  是  $G$  的子群, 则有

$$H_1 \cap (H_2 H_3) \supset (H_1 \cap H_2)(H_1 \cap H_3).$$

特别地, 当  $H_2 \subset H_1$  或者  $H_3 \subset H_1$  时, 有

$$H_1 \cap (H_2 H_3) = (H_1 \cap H_2)(H_1 \cap H_3). \quad (3.6)$$

**定义 3.1.** 设  $G$  为群, 设有  $G$  的子群列

$$G = G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_{t+1} = \{e\} \quad (3.7)$$

若  $G_{i+1} \triangleleft G_i$ , 则称(3.7)是  $G$  的次正规序列. 若还有  $G_i/G_{i+1}$  是单群, 则称(3.7)是  $G$  的合成序列,  $G_i/G_{i+1}$  称为  $G$  的合成因子.

设  $G$  是有限群, 若  $G$  不是单群, 则取  $H_1$  是  $G$  的非平凡正规子群, 考虑  $G/H_1$ , 记  $\pi_1$  是  $G \rightarrow G/H_1$  的自然同态. 若  $G/H_1$  不是单群, 取  $H'_2$  是  $G/H_1$  的非平凡正规子群, 则  $H_2 = \pi_1^{-1}(H'_2)$  是  $G$  中真包含  $H_1$  的正规子群, 再考虑  $G/H_2$ . 由于群阶的有限性, 总能找到  $G_1$ , 使得  $G/G_2$  是单群, 再对  $G_2$  做相同操作, 有限步之后, 会得到

$$G_1 = G \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_{k+1} = \{e\}$$

是  $G$  的一个合成序列.

**命题 3.6 (Jordan-Hölder).** 设  $G$  是群, 若

$$G = G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_{t+1} = \{e\}$$

$$G = H_1 \supsetneq H_2 \supsetneq \cdots \supsetneq H_{s+1} = \{e\}$$

是  $G$  的两个合成序列, 则  $t = s$ , 且对每个  $i$ , 存在对应  $i'$ , 使得  $H_i/H_{i+1} \cong G_{i'}/G_{i'+1}$ .

证明. 对每个  $H_i$ , 有

$$H_i = (H_i \cap H_1) \supset (H_i \cap G_2) \supset \cdots \supset (H_i \cap G_{t+1}) = \{e\} \quad (3.8)$$

除去其中相同的项, (3.8) 就是  $H_i$  的一个次正规列. 由于  $H_i/H_{i+1}$  是单群, 那么包含  $H_{i+1}$  的  $H_i$  中正规子群只有  $H_i$  和  $H_{i+1}$ , 则在

$$H_i = (H_i \cap H_1)H_{i+1} \supset (H_i \cap G_2)H_{i+1} \supset \cdots \supset (H_i \cap G_{t+1})H_{i+1} = H_{i+1}$$

中, 对每个  $G_k$ , 要么有  $(G_k \cap H_i)H_{i+1} = H_i$ , 要么就有  $(G_k \cap H_i)H_{i+1} = H_{i+1}$ , 于是存在唯一  $i'$ , 使得

$$(G_{i'} \cap H_i)H_{i+1} = H_i$$

$$(G_{i'+1} \cap H_i)H_{i+1} = H_{i+1}$$

这样由第二同构定理就有

$$\begin{aligned} H_i/H_{i+1} &= (G_{i'} \cap H_i)H_{i+1}/(G_{i'+1} \cap H_i)H_{i+1} \\ &\cong (G_{i'} \cap H_i)/((G_{i'} \cap H_i) \cap (G_{i'+1} \cap H_i)H_{i+1}) \\ &\stackrel{(3.6)}{=} (G_{i'} \cap H_{i+1})(G_{i'+1} \cap H_i) \end{aligned}$$

对  $G_{i'} \supset G_{i'+1}$ , 进行类似的操作, 得到, 存在唯一  $j$ , 使得使得

$$(G_{i'} \cap H_j)G_{i'+1} = G_{i'} \quad \text{且} \quad (G_{i'} \cap H_{j+1})G_{i'+1} = G_{i'+1}$$

则

$$G_{i'}/G_{i'+1} \cong (G_{i'} \cap H_j) / ((G_{i'} \cap H_{j+1})(G_{i'+1} \cap H_j))$$

我们断言  $j = i$ , 这样就有  $H_i/H_{i+1} \cong G_{i'}/G_{i'+1}$ .

若  $j \neq i$ , 不妨设  $i < j$ , 这意味着  $(G_{i'} \cap H_{i+1})G_{i'+1} = G_{i'}$ , 于是就有

$$\begin{aligned} H_i &= (H_i \cap G_{i'}) \cdot H_{i+1} \\ &= (H_i \cap (G_{i'} \cap H_{i+1})G_{i'+1}) H_{i+1} \\ &= (G_{i'} \cap H_{i+1})(G_{i'+1} \cap H_i) \cdot H_{i+1} \\ &= (G_{i'} \cap H_{i+1}) \cdot H_{i+1} \subset H_{i+1} \end{aligned}$$

导出矛盾. 综上所述说明了指标集  $\{i\}$  与  $\{i'\}$  之间有一一对应关系, 这就证明了我们的命题. ■

### 3.3 群作用与 Sylow 定理

设  $G$  是群,  $\Omega$  是一个集合, 如果  $f: G \times \Omega \rightarrow \Omega, (g, x) \mapsto g \cdot x$  满足

$$\begin{aligned} e_G \cdot x &= x, \quad \forall x \in \Omega \\ (g_1 g_2) \cdot x &= g_1 \cdot (g_2 \cdot x), \quad \forall g_1, g_2 \in G \end{aligned}$$

则称  $f$  是  $G$  在  $\Omega$  上的一个作用, 以后简记  $g \cdot x = gx$ . 从同态角度来看,  $G$  在  $\Omega$  上作用全体与  $\text{Hom}(G, S_\Omega)$  有一一对应关系.

设  $G$  在  $\Omega$  上有个作用, 则对任意  $x \in \Omega$ , 称

$$Gx = \{gx \mid g \in G\}$$

是  $x$  的轨道. 称

$$G_x = \{g \in G \mid gx = x\} < G$$

是  $x$  的稳定子群. 在  $Gx$  中, 有

$$g_1 x = g_2 x \iff g_2^{-1} g_1 \in G_x \iff g_1 G_x = g_2 G_x$$

于是  $|G_x| = [G : G_x] = \frac{|G|}{|G_x|}$  (当  $G$  是有限群时). 如果  $|Gx| = 1$ , 即  $Gx = G$ , 则称  $x$  为  $G$  的不动点.

对任意  $x, y \in \Omega$ , 有简单的事实:  $Gx = Gy$  或者  $Gx \cap Gy = \emptyset$ , 于是有

$$\Omega = \bigcup_{x \in \Omega} Gx = \bigcup_{x \in R} Gx$$

其中  $R$  表示一个代表系, 即对任意  $x, y \in R$ , 有  $Gx \cap Gy = \emptyset$ , 最终我们得到

$$|\Omega| = \sum_{x \in R} |Gx| = \sum_{x \in R} \frac{|G|}{|G_x|} = |X_0| + \sum_{x \in R \setminus X_0} \frac{|G|}{|G_x|} \quad (3.9)$$

其中  $X_0$  是  $G$  的不动点集.

设  $y \in Gx$ , 不妨设  $y = gx$ , 则若  $h \in G_y$ , 即有  $hy = h(gx) = (hg)x = y = gx$ , 这意味着  $g^{-1}hg \in G_x$ , 即  $h \in gG_xg^{-1}$ , 即  $G_y \subset gG_xg^{-1}$ , 比较两边元素个数, 即得  $G_y = gG_xg^{-1}$ , 即稳定子群相互共轭.

我们称  $G$  在  $\Omega$  上的作用是可迁的, 如果  $\Omega$  只有一个轨道, 即存在  $x \in \Omega$ , 满足对任意  $y \in \Omega$ , 存在  $g \in G$ , 使得  $y = gx$ , 或等价刻画为, 对任意  $x \in \Omega$ , 都有  $\Omega = Gx$ , 此时  $|\Omega|$  是  $|G|$  的因子.

我们称  $G$  在  $\Omega$  上的作用是忠实的, 如果

$$\{g \in G \mid gx = x, \forall x \in \Omega\} = \{e_G\}$$

换句话说, 即该作用诱导的同态  $\rho: G \rightarrow S_\Omega$ ,  $\rho(g)(x) := g \cdot x$  是单同态, 也就是  $G$  可以视为  $S_\Omega$  的一个子群.

**例 3.9 (Burnside 引理).** 设有限群  $G$  作用在集合  $X$  上, 且该作用下轨道个数为  $t$ , 对任意  $g \in G$ , 令

$$F(g) = \# \{x \in X \mid gx = x\}$$

则有

$$\sum_{g \in G} F(g) = t|G|$$

证明. 令  $\Omega = \{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$ , 下面我们用两种方法计算  $|\Omega|$ . 先固定  $g$ , 则  $|\Omega| = \sum_{g \in G} F(g)$ . 另外若先固定  $x$ , 记  $X$  的  $t$  个不同轨道为  $Gx_1, \dots, Gx_t$ , 则

$$\Omega = \bigcup_{x \in X} Gx \times \{x\} = \bigcup_{i=1}^t \bigcup_{y \in Gx_i} Gx_i \times \{y\}$$

且当  $y \in Gx_i$  时,  $|Gy| = |Gx_i|$ , 于是得到

$$|\Omega| = \sum_{x \in X} |Gx| = \sum_{i=1}^t \sum_{y \in Gx_i} |Gy| = \sum_{i=1}^t |Gx_i| \cdot |Gx_i| = t|G|.$$

■

**引理 3.7 (Cauchy 定理).** 设  $G$  是有限群,  $p$  是  $|G|$  的一个素因子, 则  $G$  中有  $p$  阶元.

证明. 考虑集合

$$X = \{(a_1, \dots, a_p) \mid a_i \in G, a_1 \cdots a_p = e\}$$

则  $|X| = |G|^{p-1}$ . 设  $\sigma = (12 \cdots p)$ , 则  $|\langle \sigma \rangle| = p$ , 考虑  $\langle \sigma \rangle$  在  $X$  中的作用为

$$\psi(a_1, \dots, a_p) := (a_{\psi(1)}, \dots, a_{\psi(p)}) \in X, \quad \forall \psi \in \langle \sigma \rangle$$



则该作用下每个轨道元素个数只能是  $p$  或  $1$ , 若记  $X_0$  是  $\langle \sigma \rangle$  的不动点集, 则由(3.9)有,  $p$  整除  $|G|^{p-1} - |X_0|$ , 于是  $p \mid |X_0|$ , 且  $|X_0| \neq 0$  (因为  $(e, \dots, e) \in X_0$ ), 所以存在  $a \neq e$ , 使得  $a^p = e$ , 这意味着  $a$  的阶为  $p$ . ■

**定理 3.8 (syLOW1).** 设  $G$  是有限群,  $p^k \mid |G|$ , 则  $G$  中有  $p^k$  阶群.

证明. 对群  $G$  的阶进行归纳, 假设结论对阶数小于  $|G|$  的群成立. 考虑  $G$  到自身的共轭作用, 则该作用下  $G$  的不动点集为  $C(G)$ , 由 (3.9)就有

$$|G| = |C(G)| + \sum_{g \in R, g \notin C(G)} [G : C(g)]$$

若  $p \mid |C(G)|$ , 由 [引理, 3.7],  $|C(G)|$  中有  $p$  阶元  $a$ , 且  $\langle a \rangle \triangleleft G$ , 于是可以考虑商群  $G/\langle a \rangle$ , 那么由归纳假设  $G/\langle a \rangle$  中有  $p^{k-1}$  阶群  $H/\langle a \rangle$ , 则  $|H| = |H : \langle a \rangle| \cdot |\langle a \rangle| = p^k$ , 即  $H$  是  $G$  的  $p^k$  阶群.

若  $p \nmid |C(G)|$ , 则存在  $g \notin C(G)$ , 使得  $p \nmid [G : C(g)]$ , 于是  $p^k \mid C(g)$ . 由于  $|C(g)| < |G|$ , 则由归纳假设  $C(g)$  中有  $p^k$  阶子群  $H$ , 其自然也是  $G$  的  $p^k$  阶子群. ■

设  $|G| = p^k m$ , 其中  $(p, m) = 1$ , 则 [定理, 3.8] 说明了  $G$  中  $p^k$  阶群的存在性, 我们称  $G$  中的  $p^k$  阶群为  $G$  的 syLOW-p 群.

**定理 3.9 (syLOW2).** 设  $G$  是有限群, 且  $|G| = p^k m, (p, m) = 1$ , 则  $G$  的 syLOW-p 群相互共轭.

证明. 设  $H$  是  $G$  的一个 syLOW-p 群. 对任意  $G$  的 syLOW-p 群  $K$ , 考虑  $K$  在  $G/H$  上的左诱导作用:

$$k(gH) := (kg)H.$$

记  $X_0$  为  $K$  的不动点集, 则  $(|K|, |G/H|) = 1$ , 且由(3.9)有

$$|G/H| \equiv |X_0| \pmod{p},$$

于是  $|X_0| \neq 0$ , 即  $K$  有不动点  $gH$ : 满足对任意  $k \in K$ , 有  $kgH = gH$ , 即  $g^{-1}kg \in H$ , 即  $k \in gHg^{-1}$ , 从而  $K \subset gHg^{-1}$ , 比较两边元素个数就有  $K = gHg^{-1}$ . ■

由 [定理, 3.9],  $S = \{gHg^{-1} \mid g \in G\}$  即是  $G$  所有 syLOW-p 群, 且

$$g_1 H g_1^{-1} = g_2 H g_2^{-1} \iff g_2^{-1} g_1 \in N_G(H) \iff g_1 N_G(H) = g_2 N_G(H)$$

即  $|S| = [G : N_G(H)] \mid m$ , 是  $G$  所有不同的 syLOW-p 群个数.

**定理 3.10 (syLOW3).** 设  $G$  是有限群,  $|G| = p^k m, (p, m) = 1$ , 记  $n_p$  是  $G$  的 syLOW-p 群个数, 则  $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ .

证明. 设  $H$  是  $G$  的一个 sylow-p 群, 考虑  $H$  在  $S = \{gHg^{-1} \mid g \in G\}$  上的共轭作用:

$$h(gHg^{-1}) := hgH(hg)^{-1}.$$

设  $gHg^{-1}$  是  $H$  一个不动点, 则对任意  $h \in H$ , 有  $(hg)H(hg)^{-1} = gHg^{-1}$ , 即  $g^{-1}Hg \subset N_G(H)$ , 也就是说  $g^{-1}Hg$  也是  $N_G(H)$  的 Sylow-p 群, 但注意  $N_G(H)$  的 sylow-p 群的个数为  $[N_G(H) : N_G(H)] = 1$ , 且  $H$  就是  $N_G(H)$  的一个 sylow-p 群, 于是就有  $g^{-1}Hg = H$ , 那么

$$gHg^{-1} = g(g^{-1}Hg)g^{-1} = H.$$

则  $H$  的不动点只有一个, 由(3.9)就有  $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ . ■

有了 sylow 相关定理, 就引出常见的一类问题, 即判断一个群是否是单群, 说明一个群不是单群要相对简单的多, 下面列举一些常见的说明非单群手段.

**例 3.10.** 设  $G$  是交换群, 则  $G$  是单群当且仅当  $G$  是素数阶的循环群.

**例 3.11.** 设  $G$  是一个有限群, 其阶为  $|G| = p^n$ , 其中  $p$  为素数, 且  $n > 1$ , 则  $G$  不是单群. 特别地, 当  $n = 2$  时,  $G$  还是交换群.

证明. 考虑  $G$  到自身的共轭作用, 得到类方程

$$|G| = |C(G)| + \sum_{g \in R \setminus C(G)} [G : C(g)]$$

于是  $p \mid |C(G)|$ . 若  $G = C(G)$ , 此时由 [例, 3.10],  $G$  不是单群. 若  $C(G) \neq G$ , 则  $C(G)$  就是  $G$  的非平凡的正规群.

当  $n = 2$  时, 若  $C(G) \neq G$ , 则只能是  $|C(G)| = p$ . 取  $g \in G \setminus C(G)$ , 则  $|C(g)| > |C(G)| = p$ , 于是一定有  $|C(g)| = p^2$ , 这意味着  $g \in C(G)$ , 矛盾. ■

**例 3.12.** 设  $|G| = pq$ , 其中  $p$  和  $q$  是素数, 且  $p < q$ , 则  $G$  不是单群.

证明. 由 sylow 第三定理有  $n_q \mid p$ , 且  $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ , 那么只能是  $n_q = 1$ , 即  $G$  的 sylow-q 群是  $G$  的非平凡正规子, 所以  $G$  不是单群. ■

**例 3.13.** 设  $|G| = p^2q$  ( $p \neq q$ ), 其中  $p, q$  为素数, 则  $G$  不是单群.

证明. 当  $p > q$  时, 由  $n_p \mid q$ , 且  $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ , 这意味着只能是  $n_p = 1$ , 故  $G$  是单群.

当  $p < q$  时, 由  $n_q \mid p^2$ , 且  $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ , 则可能的情形为  $n_q = 1$  或者  $n_q = p^2$ . 若  $n_q = p^2$ , 由于  $q$  是素数, 则任何两个不同  $G$  的 sylow-q 群的交只能是单位元, 于是  $G$  中有  $p^2(q-1)$  个  $q$  阶元, 这些元素都不能是  $G$  的 sylow-p 群中的元素, 所以唯一可能的情形是  $G$  剩下的  $p^2$  个元素刚好构成  $G$  的一个 sylow-p 群, 即  $n_p = 1$ , 于是  $G$  不是单群. ■

**例 3.14.** 设  $H$  是  $G$  的子群, 且  $[G : H] = n$ , 则存在  $G$  的正规子群  $K \subset H$ , 使得  $[G : K] \mid n!$ . 特别地, 当  $H$  是  $G$  的真子群, 且  $|G| \nmid n!$  时,  $K$  是  $G$  的非平凡正规子群, 即  $G$  不是单群.

证明. 考虑  $G$  在集合  $G/H$  上的左诱导作用, 其诱导了一个同态:  $\rho : G \rightarrow S(G/H)$ , 记  $K = \ker \rho$ , 则由同态基本定理,  $G/K \cong \text{im} \rho$ , 取阶数就有  $[G : K] \mid n!$ . 另外注意

$$K = \ker \rho = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} \subset H$$

这样就完成了证明. ■

**例 3.15.** 设  $|G| = p^k m$ ,  $(m, p) = 1$ , 若  $n_p$  表示  $G$  的 sylow-p 群的个数, 则当  $|G| > n_p!$  时,  $G$  不是单群.

证明. 下面考虑  $n_p > 1$  情形. 令  $X = \{P_1, \dots, P_{n_p}\}$  是  $G$  的 sylow-p 群的集合, 考虑  $G$  在  $X$  上的共轭作用, 其诱导了一个同态:  $\rho : G \rightarrow S(X)$ , 则有

$$1 \leq [G : \ker \rho] = |\text{im} \rho| \leq n_p! < |G|$$

我们下面说明  $[G : \ker \rho] > 1$ , 从而  $\ker \rho$  即是  $G$  的非平凡正规子群, 于是  $G$  不是单群.

若  $[G : \ker \rho] = 1$ , 这意味着对任意  $g \in G$ , 有  $gP_1g^{-1} = P_1$ , 即  $g \in N_G(P_1)$ , 也就是  $G = N_G(P_1)$ , 则  $n_p = 1$ , 矛盾. ■

### 3.4 有限生成 Abel 群分类

**例 3.16.** 设  $G$  是有限 Abel 群, 且  $|G| = mn$ ,  $(m, n) = 1$ , 则有直积  $G = G_1 G_2$ , 其中  $|G_1| = m, |G_2| = n$ .

证明. 由  $G$  是 Abel 群, 则

$$G_1 = \{g \in G \mid g^m = e\} \quad G_2 = \{g \in G \mid g^n = e\}$$

是  $G$  的子群. 且由  $(m, n) = 1$ , 存在  $u, v$ , 使得  $mu + nv = 1$ , 即对任意  $g \in G$ , 有

$$g = g^{mu+nv} = (g^{nv}) \cdot (g^{mu}) \in G_1 G_2$$

则  $G = G_1 G_2$ , 且若  $g \in G_1 \cap G_2$ , 则  $o(g) \mid n$ , 且  $o(g) \mid m$ , 那只能是  $o(g) = 1$ , 即  $g = e$ . 这样我们就证明了直积. 下面我们只要说明  $(|G_1|, n) = 1, (|G_2|, m) = 1$ , 即可说明  $|G_1| = m, |G_2| = n$ . 若  $(|G_1|, n) > 1$ , 则取其一个公共素因子  $p$ , 由 Cauchy 命题,  $G_1$  中有  $p$  阶元  $g$ , 但是由定义要有  $g^m = 1$ , 这意味着  $o(g) = p$  要整除  $m$ , 矛盾. ■

**推论 3.11.** 设  $G$  是有限 Abel 群, 且  $|G| = p_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s}$ , 则存在直积分解  $G = G_1 \cdots G_s$ , 使得  $|G_i| = p_i^{r_i}$ .

**定理 3.12 (分类定理).** 设  $G$  是有限生成 Abel 群. 则  $G$  同构于以下形式的直和:

$$G \cong \mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}_{d_1} \oplus \mathbb{Z}_{d_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{d_k} \quad (3.10)$$

其中:

1.  $r \geq 0$  是整数 ( $G$  的自由秩).
2.  $d_1, \dots, d_k$  是满足  $d_i \geq 2$  且  $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k$  的整数.

且若

$$G \cong \mathbb{Z}^r \oplus \bigoplus_{i=1}^k \mathbb{Z}_{d_i} \cong \mathbb{Z}^s \oplus \bigoplus_{j=1}^m \mathbb{Z}_{c_j}$$

其中  $d_i$  和  $c_j$  均满足整除链条件. 则  $r = s$ ,  $k = m$ , 且对于所有  $i$ , 有  $d_i = c_i$ .

证明. 见 David McKinnon 的讲义: [Classification of Finitely Generated Abelian Groups](#). ■

**例 3.17 (第一类  $pq$  阶群).** 设有限群  $G$  的阶为  $|G| = pq$  ( $p < q$ ), 且  $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ , 则  $G$  是循环群.

证明. 记  $H, K$  分别是  $G$  的 sylow- $p$  和 sylow- $q$  群, 则  $n_q = 1$ ,  $n_p = 1$  (因为  $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ ), 即  $H, K$  都是  $G$  的正规子群, 且  $H \cap K = \{e\}$ , 那么  $|HK| = pq = |G|$ , 即有直积  $G = HK$ . 又因为  $H, K$  都是素数阶群, 则可设  $H = \langle a \rangle$ ,  $K = \langle b \rangle$ , 那么有

$$[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab \in H \cap K = \{e\}$$

这意味着  $ab = ba$ , 于是  $o(ab) = o(a)o(b) = pq$ , 即  $G$  是循环群. ■

**例 3.18 (第二类  $pq$  阶群).** 当  $q \equiv 1 \pmod{p}$  时, 可以作仿射群  $\text{Aff}(\mathbb{Z}/(q))$  的子群:

$$A_{p,q} = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Aff}(\mathbb{Z}_q) : x^p = 1 \text{ in } \mathbb{Z}_q \right\}. \quad (3.11)$$

这里  $1$  是  $\mathbb{Z}_q$  中的幺元. 则  $|A_{p,q}| = pq$ , 且群  $A_{p,q}$  是非阿贝尔群, 因为矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  和  $\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  不交换, 其中  $x$  是  $\mathbb{Z}_q$  中阶为  $p$  的元素.

证明. 注意  $y$  有  $q$  种选择, 由于  $x \in \mathbb{Z}_q^*$  且假设  $p \mid (q-1)$ , 由 Cauchy 定理, 在  $\mathbb{Z}_q^*$  中存在一个阶为  $p$  的元素, 因此它的幂在  $\mathbb{Z}_q^*$  中给出至少  $p$  个  $x^p = 1$  的解. 另一方面, 作为  $\mathbb{Z}_q$  上的多项式  $x^p - 1$ , 其在  $\mathbb{Z}_q$  中的根不能超过  $p$  个, 所以恰好有  $p$  个解. 因此,  $\mathbb{Z}_q^*$  中  $x^p = 1$  的解是一个大小为  $p$  的循环群, 于是  $|A_{p,q}| = pq$ . ■

**命题 3.13.** 设  $p$  和  $q$  为素数, 且  $p < q$  和  $q \equiv 1 \pmod{p}$ . 在同构意义下, (3.11) 中的群  $A_{p,q}$  是唯一的大小为  $pq$  的非阿贝尔群.

证明. 见 Keith Conrad 的讲义: [Applications of Cauchy's Theorem](#). ■

**推论 3.14.** 对于奇素数  $q$ ,  $2q$  阶群只有  $\mathbb{Z}_{2q}$  和二面体群  $D_q$ .

### 3.5 可解群和幂零群

## 索引

$\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right]$ , 11

Jordan-Hölder, 20

$pq$  阶群, 26

Cauchy 定理, 22

UFD, 11

中国剩余, 7

分式域, 8

单群  $A_n(n \geq 5)$ , 16