

1 Neural Network

1.1 One Step further of Logistic Regression

Model Description

$z^{[1](i)}$ means first layer, ith sample

$$z^{[1](i)} = W^{[1]} X^{(i)} + b^{[1](i)}$$

in matrix form

$$\begin{pmatrix} z_1^{1} & z_1^{[1](2)} & \dots & z_1^{[1](m)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_4^{1} & z_4^{[1](2)} & \dots & z_4^{[1](m)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_{11}^{[1]} & w_{12}^{[1]} \\ w_{21}^{[1]} & w_{22}^{[1]} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & \dots & x_1^{(m)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & \dots & x_2^{(m)} \end{pmatrix}$$

$$a^{[1](i)} = \tanh(z^{[1](i)})$$

In matrix notation

$$\begin{pmatrix} a_1^{1} & a_1^{[1](2)} & \dots & a_1^{[1](m)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_4^{1} & a_4^{[1](2)} & \dots & a_4^{[1](m)} \end{pmatrix} = \tanh \begin{pmatrix} z_1^{1} & z_1^{[1](2)} & \dots & z_1^{[1](m)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_4^{1} & z_4^{[1](2)} & \dots & z_4^{[1](m)} \end{pmatrix}$$

$$z^{[2](i)} = W^{[2]} X^{(i)} + b^{[2](i)}$$

in matrix form

$$\begin{pmatrix} z_1^{[2](1)} & z_1^{2} & \dots & z_1^{[2](m)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1^{[2]} & \dots & w_4^{[2]} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1^{1} & a_1^{[1](2)} & \dots & a_1^{[1](m)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_4^{1} & a_4^{[1](2)} & \dots & a_4^{[1](m)} \end{pmatrix}$$

$$a^{[2](i)} = \text{sigmoid}(z^{[2](i)})$$

In matrix notation

$$\begin{pmatrix} a_1^{[2](1)} & a_1^{2} & \dots & a_1^{[2](m)} \end{pmatrix} = \text{sigmoid} \begin{pmatrix} z_1^{[2](1)} & z_1^{2} & \dots & z_1^{[2](m)} \end{pmatrix}$$

Gradient Calculation We now derive the gradient of the model above.

1) Cost function

$$J = -\frac{1}{m} \sum_i^m [y^{(i)} \log(a^{[2](i)}) (1 - y^{(i)}) \log(1 - a^{[2](i)})]$$

(i) denotes sample index [j] denotes layer index The sequence of calculating the gradient is

J - $a_{(i)}^{[2]}$ - $z_{(i)}^{[2]}$ - $W_k^{[2]}b^{[2]}$ - chain rule ...
2)

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial a_{(j)}^{[2]}} &= \frac{\partial}{\partial a_{(j)}^{[2]}} \left(-\frac{1}{m} \sum_i [y_{(i)} \log(a_{(i)}^{[2]}) + (1 - y_{(i)}) \log(1 - a_{(i)}^{[2]})] \right) \text{ only } i = j \text{ survives} \\ &= \frac{\partial}{\partial a_{(j)}^{[2]}} \left(-\frac{1}{m} [y_{(j)} \log(a_{(j)}^{[2]}) + (1 - y_{(j)}) \log(1 - a_{(j)}^{[2]})] \right) \\ &= -\frac{1}{m} \left[\frac{y^{(j)}}{a_{(j)}^{[2]}} - \frac{(1 - y^{(j)})}{(1 - a_{(j)}^{[2]})} \right]\end{aligned}$$

3)

$$\begin{aligned}& \frac{\partial a}{\partial z} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{e^z}{e^z + 1} \right) \\ &= \frac{1}{(e^z + 1)^2} (e^z(e^z + 1) - e^z e^z) \\ &= \frac{1}{(e^z + 1)^2} e^z \\ &= \frac{e^z}{e^z + 1} \frac{1}{e^z + 1} \\ &= \frac{e^z}{e^z + 1} \frac{e^z + 1 - e^z}{e^z + 1} \\ &= g(z)(1 - g(z))\end{aligned}$$

4)

$$\begin{aligned}& \frac{\partial J}{\partial z_j^{[2]}} \\ &= \frac{\partial J}{\partial a_{(j)}^{[2]}} \frac{\partial a_{(j)}^{[2]}}{\partial z_j^{[2]}} \\ &= -\frac{1}{m} \left[\frac{y^{(j)}}{a_{(j)}^{[2]}} - \frac{(1 - y^{(j)})}{(1 - a_{(j)}^{[2]})} \right] a_{(j)}^{[2]} (1 - a_{(j)}^{[2]}) \\ &= -\frac{1}{m} (y_{(j)} - y_{(j)} a_{(j)}^{[2]} - a_{(j)}^{[2]} + y_j a_{(j)}^{[2]}) \\ &= -\frac{1}{m} (y_{(j)} a_{(j)}^{[2]})\end{aligned}$$

matrix form

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial J}{\partial Z^{[2]}} \\
&= \left(\frac{\partial J}{\partial z_1^{[2]}}, \frac{\partial J}{\partial z_2^{[2]}}, \dots, \frac{\partial J}{\partial z_m^{[2]}} \right) \\
&= -\frac{1}{m} (y_{(1)} a_{(1)}^{[2]}, y_{(2)} a_{(2)}^{[2]}, \dots, y_{(m)} a_{(m)}^{[2]}) \\
&= \frac{1}{m} (A^{[2]} - Y)
\end{aligned}$$

5)

$$\begin{pmatrix} z^{[2](1)} & z^{2} & \dots & z^{[2](m)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1^{[2]} & w_2^{[2]} & \dots & w_4^{[2]} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1^{1} & a_1^{[1](2)} & \dots & a_1^{[1](m)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_4^{[2](1)} & a_4^{[1](2)} & \dots & a_4^{[1](m)} \end{pmatrix} + (b[2], b[2], \dots, b[2])$$

$$z_{[2](i)} = \sum_l w_l^{[2]} a_l^{[1](i)} + b^{[2]}$$

$$\frac{\partial z_i^{[2]}}{\partial w_k^{[2]}} = a_l^{[1](i)}$$

$$\frac{\partial z_i^{[2]}}{\partial b^{[2]}} = 1$$

6)

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial J}{\partial w_k^{[2]}} \\
&= \sum_{(i)} \frac{\partial J}{\partial z_{(i)}^{[2]}} \frac{\partial z_{(i)}^{[2]}}{\partial w_k^{[2]}} \text{ chain rule in higher dimension} \\
&= \sum_i^m -\frac{1}{m} (y_{(i)} - a_{(i)}^{[2]}) a_k^{[1](i)} \\
&= \frac{1}{m} \begin{pmatrix} a_{(1)}^{[2]} - y_{(1)} & a_{(2)}^{[2]} - y_{(2)} & \dots & a_{(m)}^{[2]} - y_{(m)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_k^{(1)[1]} \\ a_k^{(2)[1]} \\ \dots \\ a_k^{(m)[1]} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

in matrix form

$$= \frac{1}{m} [A^{[2]} - Y] (a_k^{[1]})^T$$

$$\left(\begin{array}{cccc} \frac{\partial J}{\partial w_k^{[2]}}, & \frac{\partial J}{\partial w_k^{[2]}}, & \cdots & \frac{\partial J}{\partial w_k^{[2]}} \end{array} \right)$$

$$\frac{1}{m} \left(\begin{array}{cccc} a_{(1)}^{[2]} - y_{(1)} & a_{(2)}^{[2]} - y_{(2)} & \cdots & a_{(m)}^{[2]} - y_{(m)} \end{array} \right) \left(\begin{array}{cccc} a_1^{(1)[1]} & a_2^{(1)[1]} & \cdots & a_4^{(1)[1]} \\ a_1^{(2)[1]} & a_2^{(2)[1]} & \cdots & a_4^{(2)[1]} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{(m)[1]} & a_2^{(m)[1]} & \cdots & a_4^{(m)[1]} \end{array} \right)$$

in matrix form

$$= \frac{1}{m} [A^{[2]} - Y] (A^{[1]})^T$$

7)

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial z_l^{[1](j)}} &= \frac{\partial J}{\partial z^{[2](j)}} \frac{\partial \sum_{l=1}^4 w_l^{[2]} a_l^{[1](j)}}{\partial a_l^{[1](j)}} g'(z_l^{[1](j)}) \\ &= \frac{\partial J}{\partial z^{[2](j)}} w_l^{[2]} g'(z_l^{[1](j)}) \end{aligned}$$

in matrix form

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc} \frac{\partial J}{\partial z_1^{1}}, & \cdots & \cdots & \frac{\partial J}{\partial z_1^{[1](m)}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial J}{\partial z_4^{1}}, & \cdots & \cdots & \frac{\partial J}{\partial z_4^{[1](m)}} \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{ccc} w_l^{[2]} \frac{\partial J}{\partial z^{[2](1)}}, & \cdots & \cdots & w_l^{[2]} \frac{\partial J}{\partial z^{[2](m)}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ w_4^{[2]} \frac{\partial J}{\partial z^{[2](1)}}, & \cdots & \cdots & w_4^{[2]} \frac{\partial J}{\partial z^{[2](m)}} \end{array} \right) \\ &\circ \left(\begin{array}{ccc} g'(z_l^{1}), & \cdots & \cdots & g'(z_l^{[1](m)}) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ g'(z_4^{1}), & \cdots & \cdots & g'(z_4^{[1](m)}) \end{array} \right) \end{aligned}$$