Contar una ficha por vez



Tocamos cada ficha una sola vez y decimos un número. El último número nos dice cuántas hay.


Ejemplo: Una, dos, tres: hay 3 fichas.

1. Señalamos una ficha al decir cada número.

2. Al terminar, decimos cuántas hay en total.

Para recordar: Podés señalar cada ficha mientras contás.

Mover las fichas no cambia cuántas hay



Si solo movemos las fichas, sigue habiendo la misma cantidad. Cambia el lugar, pero no agregamos ni quitamos ninguna.

Ejemplo: Había 4 fichas. Las separamos y siguen siendo 4.

1. Contamos antes de mover.

2. Volvemos a contar después: no apareció ni se fue ninguna ficha.

Para recordar: Compará una ficha de antes con una de después.

Sumar es juntar cantidades



Las fichas nuevas se juntan con las que ya estaban. Para saber cuántas hay ahora, contamos todas.

Ejemplo: Había 3 y llegaron 2. Ahora hay 5.

1. Conservamos las tres fichas.

2. Agregamos dos y contamos todas: una, dos, tres, cuatro, cinco.

Para recordar: Las que estaban no se van: las nuevas se suman.

Restar es ver cuánto queda



Al guardar algunas fichas, quedan menos afuera. Contamos las que no guardamos.


Ejemplo: Había 5. Guardamos 2 y quedaron 3 afuera.

1. Separamos las dos fichas que guardamos.

2. Contamos las que quedaron afuera: una, dos, tres.

Para recordar: Mirá solamente las que quedaron afuera.

Diez fichas forman un paquete



Un paquete de diez guarda diez fichas. A ese paquete lo llamamos decena. Las fichas sueltas se llaman unidades.

Ejemplo: Un paquete de diez y 2 sueltas son 12 fichas.

1. Contamos diez dentro del paquete.

2. Seguimos con las sueltas: once, doce.

Para recordar: El paquete contiene diez, no una sola ficha.

Diez unidades forman una decena



Podemos contar objetos formando paquetes de diez. Cada paquete es una decena. Los objetos que no completan un paquete quedan como unidades.


Ejemplo: 23 fichas son 2 decenas y 3 unidades.

1. Formamos dos paquetes de diez: 20 fichas.

2. Quedan 3 fichas sueltas: 20 + 3 = 23.

Para recordar: Separá los paquetes completos de las unidades sueltas.

El lugar de cada cifra



De derecha a izquierda están unidades, decenas y centenas. Un cero conserva un lugar vacío. En 304 hay 3 centenas, ninguna decena y 4 unidades.


Ejemplo: En 352, el 5 vale 50 porque ocupa las decenas.

1. Leemos 3 centenas, 5 decenas y 2 unidades.

2. Descomponemos: 300 + 50 + 2 = 352.

Para recordar: Contá las posiciones desde la derecha.

Comparar desde el lugar más grande



Para comparar números naturales, miramos primero cuántas cifras tienen. Con igual cantidad de cifras, comparamos desde la izquierda. Si son iguales, seguimos a la siguiente posición.


Ejemplo: 418 es mayor que 391.

1. Ambos tienen tres cifras.

2. 418 tiene 4 centenas y 391 tiene 3: elegimos 418.

Para recordar: Compará centenas antes que decenas y unidades.

Cada marca conserva la misma distancia



En una regla, los números crecen al avanzar hacia la derecha. En una recta numérica, marcas igualmente separadas representan saltos iguales. Primero miramos de cuánto es cada salto.

Ejemplo: La recta muestra 0, 10, 20, 30 y 40. Entre 20 y 40 está 30.


1. De 0 a 10 aumentamos 10.

2. Cada intervalo vuelve a aumentar 10.

3. Después de 20 viene 30; después, 40.

Para recordar: Leé dos marcas seguidas para encontrar el tamaño del salto.

Cambiar diez sueltas por un paquete



Al juntar diez fichas sueltas podemos guardarlas en un paquete. La cantidad de fichas no cambia: solo cambia cómo las agrupamos.

Ejemplo: 8 fichas y 4 más son 12: un paquete de diez y 2 sueltas.

1. Juntamos ocho y cuatro.


2. Apartamos diez para el paquete y quedan dos sueltas.

Para recordar: Podés contar todo antes de armar el paquete.

Sumar y reagrupar

27 + 15: juntamos fichas y cerramos una barra

Cada barra tiene 10 unidades. Cada punto es una unidad.



Abrir o cerrar una barra no agrega ni quita fichas.

Sumar reúne cantidades. Alineamos unidades con unidades y decenas con decenas. Si juntamos diez unidades, las cambiamos por una decena.


Ejemplo: 27 + 15 = 42.

1. 7 + 5 = 12: una decena y 2 unidades.

2. 2 + 1 + 1 decenas = 4 decenas; quedan 42.

Para recordar: Si las unidades llegan a diez, llevá una decena.

Abrir un paquete para poder quitar



Podemos abrir un paquete de diez y usar sus fichas sueltas. No aparecen fichas nuevas: las diez ya estaban dentro.

Ejemplo: De 12 fichas quitamos 5. Quedan 7.

1. Abrimos el paquete: tenemos doce fichas sueltas.


2. Guardamos cinco y contamos las siete que quedan.

Para recordar: Abrir el paquete cambia la forma de agrupar, no la cantidad.

Restar y comprobar

42 − 17: abrimos una decena para poder quitar

Cada barra tiene 10 unidades. Cada punto es una unidad.



Abrir o cerrar una barra no agrega ni quita fichas.

Restar permite saber cuánto queda. Si faltan unidades para quitar, cambiamos una decena por diez unidades. Podemos comprobar sumando lo que quitamos a lo que quedó.

Ejemplo: 42 − 17 = 25.

1. 42 son también 3 decenas y 12 unidades.

2. 12 − 7 = 5 y 3 − 1 = 2 decenas. Comprobamos: 25 + 17 = 42.

Para recordar: Podés cambiar una decena por diez unidades.