
Repetir una multiplicación



En algunas secuencias cada término se obtiene multiplicando el anterior por el mismo número. La diferencia entre términos puede cambiar, pero el factor se conserva.

Ejemplo: 2, 4, 8, 16 continúa con 32.

1. Cada término es el anterior multiplicado por 2.

2. 16 × 2 = 32.

Para recordar: Probá el mismo factor en todos los pasos.

Sumar los dos anteriores



Otra regla consiste en sumar los dos términos anteriores para obtener el siguiente. Necesitamos conservar ambos, no solo el último. La secuencia de Fibonacci usa esta regla comenzando con 1 y 1.

Ejemplo: 1, 1, 2, 3, 5 continúa con 8.

1. 2 + 3 = 5.

2. Para seguir usamos 3 + 5 = 8.

Para recordar: Marcá los últimos dos términos y sumalos.

Una regla puede tener dos acciones



Una sucesión puede repetir una combinación de acciones. Para pasar al término siguiente, hacemos las dos en el mismo orden. Comprobamos la regla en más de un par de términos.

Ejemplo: La regla es multiplicar por 3 y después quitar 2: desde 2 obtenemos 4; desde 4, 10.

1. Desde 2: 2 × 3 = 6; 6 − 2 = 4.

2. Desde 4: 4 × 3 = 12; 12 − 2 = 10.

3. Desde 10: 10 × 3 − 2 = 28. Restar antes daría otra regla.

Para recordar: Usá el último término y respetá el orden de las dos acciones.