Contar el borde de un polígono



Un polígono es una figura cerrada formada por segmentos que no se cruzan. Tiene tantos lados como vértices. Con 3 lados es triángulo; con 4, cuadrilátero; con 5, pentágono; con 6, hexágono; con 7, heptágono; con 8, octógono.

Ejemplo: El dibujo tiene cinco lados y cinco vértices: es un pentágono.

1. Elegimos un vértice para empezar y recorremos el borde una sola vez.

2. Contamos cinco lados: buscamos el nombre pentágono.

Para recordar: Contá cada tramo recto del contorno una sola vez.

Unir vértices que no son vecinos



Una diagonal une dos vértices no consecutivos de un polígono. Desde un vértice no trazamos una diagonal hacia él mismo ni hacia sus dos vecinos. En estos polígonos convexos, las diagonales quedan dentro de la figura.

Ejemplo: Desde A en un pentágono podemos trazar dos diagonales.

1. Ubicamos A y dejamos fuera a sus dos vecinos.

2. Unimos A con los otros dos vértices: son dos diagonales.

Para recordar: Las uniones con los vecinos ya son lados, no diagonales.

Cuatro lados y líneas paralelas



Un cuadrilátero tiene cuatro lados. Un paralelogramo tiene dos pares de lados opuestos paralelos. El cuadrado tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos: también es rectángulo y rombo. En el cuadernillo, trapecio tiene un solo par de lados paralelos.

Ejemplo: Todo cuadrado es también un rectángulo.

1. Rectángulo significa cuatro ángulos rectos.

2. El cuadrado cumple esa condición y además tiene lados iguales.

Para recordar: Una figura puede pertenecer a más de una familia.

Mirar pares de lados antes de nombrar



Un cuadrilátero tiene cuatro lados. En el cuadernillo se agrupan por sus lados paralelos: dos pares, paralelogramo; un solo par, trapecio; ningún par, trapezoide. Un rectángulo tiene cuatro ángulos rectos; un rombo, cuatro lados iguales. El cuadrado cumple ambas condiciones. Empezamos por reconocer los pares paralelos.

Ejemplo: En un rectángulo, arriba y abajo son paralelos. También izquierda y derecha: hay dos pares.

1. Buscamos lados opuestos, que no comparten una esquina.

2. El primer par conserva la separación; el segundo también.

3. Tiene dos pares paralelos: pertenece a los paralelogramos.

Para recordar: Un par tiene dos lados. No cuentes cada lado como un par distinto.

Unir esquinas que no son vecinas



Romboide: convención del cuadernillo

Una diagonal une vértices que no están uno al lado del otro. Un cuadrilátero tiene dos diagonales. El cuadernillo llama romboide a un trapezoide con dos pares de lados consecutivos iguales: una forma de cometa. Usamos aquí esa convención del colegio.

Ejemplo: En el romboide ABCD, AB = AD y BC = CD. AC y BD son sus diagonales.

1. AB y AD se encuentran en A; BC y CD se encuentran en C: son pares de lados consecutivos.

2. A y C no son vecinos: AC es una diagonal.

3. B y D tampoco son vecinos: BD es la otra. Un lado como AB no es diagonal.

Para recordar: Una diagonal va entre esquinas no vecinas. Consecutivos significa que comparten una esquina.

Radio y diámetro



Diámetro = 6 cm

La circunferencia es la línea cuyos puntos están a la misma distancia del centro. El radio une el centro con esa línea. El diámetro une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro y mide dos radios.

Ejemplo: Si el radio es 3 cm, el diámetro mide 6 cm.

1. Un diámetro reúne dos radios.

2. 3 + 3 = 6 cm.

Para recordar: El diámetro mide el doble del radio.