Primero averiguamos cuánto vale uno



En una relación directamente proporcional, cada unidad conserva el mismo valor. Si tres cuadernos cuestan 600 pesos, uno cuesta 600 ÷ 3. No hay descuentos ni cargos extra en estos ejercicios.

Ejemplo: 3 cuadernos cuestan $600: uno cuesta $200.

1. Dividimos el precio total entre la cantidad.

2. 600 ÷ 3 = 200 pesos por cuaderno.

Para recordar: Buscá el valor de una unidad.

Del valor de uno a otra cantidad



pesos según cantidad de cuadernos

Después de hallar el valor de una unidad, lo multiplicamos por la nueva cantidad. Este método sirve cuando el valor por unidad es constante.

Ejemplo: 3 cuadernos cuestan $600. Cinco cuestan $1000.

1. Uno cuesta 600 ÷ 3 = 200.

2. Cinco cuestan 5 × 200 = 1000.

Para recordar: Primero dividí para llegar a uno; después multiplicá.

Una receta más pequeña conserva las proporciones



Si cada porción lleva lo mismo, podemos aumentar o reducir una receta. Primero calculamos lo necesario para una porción y después para la cantidad que queremos. Cambiar solo un ingrediente no conserva la receta.

Ejemplo: Para 4 porciones hacen falta 8 cucharadas de harina. Para 2 porciones hacen falta 4 cucharadas.

1. Una porción usa 8 ÷ 4 = 2 cucharadas.

2. Dos porciones usan 2 × 2 = 4 cucharadas.

3. Es la mitad de porciones y también la mitad de harina.

Para recordar: Encontrá cuánto corresponde a una porción y mantené esa relación.