Repetir siempre el mismo salto

Ubicamos cantidades

Una secuencia aritmética cambia sumando o restando siempre la misma cantidad. Calculamos la diferencia entre términos vecinos y la comprobamos en los demás.

Ejemplo: 4, 7, 10, 13 continúa con 16.

1. 7 − 4 = 3 y 10 − 7 = 3.

2. Sumamos el mismo salto: 13 + 3 = 16.

Para recordar: Comprobá que el salto se repite antes de continuar.

Secuencias que bajan



Una secuencia también puede repetir una resta. Si los términos bajan de cuatro en cuatro, restamos cuatro al último término. No cambiamos a una suma porque veamos números más pequeños.

Ejemplo: 25, 21, 17, 13 continúa con 9.

1. 25 − 21 = 4 y 21 − 17 = 4.

2. 13 − 4 = 9.

Para recordar: Observá si la secuencia sube o baja.

Mirar qué cambia entre vecinos



Para buscar una regla comparamos cada término con el siguiente. A veces sumamos siempre lo mismo; otras veces los saltos cambian siguiendo una regla. Una lista corta puede admitir muchas reglas: aquí comprobamos la regla indicada en todos los pasos.

Ejemplo: En 1, 2, 4, 7 los saltos son +1, +2 y +3. Si cada salto aumenta uno, sigue +4 y llegamos a 11.

1. 2 − 1 = 1; 4 − 2 = 2; 7 − 4 = 3.

2. Los saltos aumentan de uno en uno: el próximo es 4.

3. Sumamos ese salto al último término: 7 + 4 = 11.

Para recordar: Separá la fila de números de la fila de saltos entre ellos.