

## Gabarito Lista 2 MAE0219

Gustavo Soares Gomes

May 10, 2022

10)

Vamos listar os eventos e seus respectivos valores para as variáveis X e Y.

Evento	X	Y	P(E)
CCC	3	1	1/8
CCR	2	2	1/8
CRC	2	3	1/8
CRR	1	2	1/8
RCR	1	3	1/8
RCC	2	2	1/8
RRC	1	2	1/8
RRR	0	1	1/8

A distribuição do evento X é dada por:

X	P(X=x)
0	1/8
1	3/8
2	3/8
3	1/8

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = 1.5$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{8} + 1^2 \cdot \frac{3}{8} + 2^2 \cdot \frac{3}{8} + 3^2 \cdot \frac{1}{8} = 3$$

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 3^2 - 1.5^2 = 0.75$$

Y	P(Y = y)
1	2/8
2	4/8
3	2/8


$$E(Y) = 1 \cdot \frac{2}{8} + 2 \cdot \frac{4}{8} + 3 \cdot \frac{2}{8} = 2$$

$$E(Y^2) = 1^2 \cdot \frac{2}{8} + 2^2 \cdot \frac{4}{8} + 3^2 \cdot \frac{2}{8} = 4.5$$

$$Var(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = 4.5 - 2^2 = 0.5$$

13)

Vamos fazer um diagrama de árvore para a variável Z número de vendas.



Encontrando a distribuição de Z também encontraremos a distribuição da va Y, já que  $Z = 0 \Leftrightarrow Y = 0, Z = 1 \Leftrightarrow Y = 50.000, Z = 2 \Leftrightarrow Y = 100.000$

$$P(Y = 0) = P(Z = 0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{10} + \frac{2}{3} \cdot \frac{81}{100} = \frac{126}{150}$$

$$P(Y = 50.000) = P(Z = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10} + \frac{2}{3} \cdot \frac{18}{100} = \frac{26}{150}$$

$$P(Y = 100.000) = P(Z = 2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{150}$$

Logo,  $E(Y) = 0 \cdot \frac{126}{150} + 1 \cdot \frac{26}{150} + 2 \cdot \frac{1}{100} = 8.333,33$  reais.

### 17a)

$$E(T) = 2 \cdot 0.1 + 3 \cdot 0.1 + 4 \cdot 0.3 + 5 \cdot 0.2 + 6 \cdot 0.2 + 7 \cdot 0.1 = 4.6$$

### 17b)

Podemos expressar a variável G como função dos valores t assumidos pela variável T:

$$G(t) = \begin{cases} 2 + 0.5 \cdot (6 - t), & 2 \leq t \leq 6 \\ 2, & t = 7 \end{cases}$$

A tabela de dist de probabilidade de G a partir de T fica:

t	2	3	4	5	6	7
g	4	3.5	3	2.5	2	2
P(G = g)	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1

Agrupando valores comuns de G:

g	4	3.5	3	2.5	2
P(G = g)	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3

$$E(G) = 4 \cdot 0.1 + 3.5 \cdot 0.1 + 3 \cdot 0.3 + 2.5 \cdot 0.2 + 2 \cdot 0.3 = 2.75$$

$$E(G^2) = 4^2 \cdot 0.1 + 3.5^2 \cdot 0.1 + 3^2 \cdot 0.3 + 2.5^2 \cdot 0.2 + 2^2 \cdot 0.3 = 7.975$$

$$Var(G) = 7.975 - 2.75^2 = 0.4125$$

### 23a)

Podemos utilizar aqui uma distribuição de Poisson com parametro  $\lambda = 1$ , sendo N o número de cortes.

$$P(N = 0) = \frac{e^{-1} \cdot 1^0}{0!} \approx 0.368$$

### 23b)

$$P(N \leq 2) = P(N = 0) + P(N = 1) + P(N = 2) = \frac{e^{-1} \cdot 1^0}{0!} + \frac{e^{-1} \cdot 1^1}{1!} + \frac{e^{-1} \cdot 1^2}{2!} \approx 0.92$$

**23c)**

$$P(N \geq 2) = 1 - P(N \leq 1) = 1 - (P(N = 0) + P(N = 1)) = 1 - \left( \frac{e^{-1} \cdot 1^0}{0!} + \frac{e^{-1} \cdot 1^1}{1!} \right) \approx 0.264$$

**29)**

Seja  $n$  o número de flores no estoque. Para  $n \geq 3$  temos a seguinte distribuição do lucro  $L$  com base no valor da variável  $X$ .

x	0	1	2	3
L	$-0.5n$	$1.5 - 0.5n$	$3 - 0.5n$	$4.5 - 0.5n$
$P(L = l)$	0.1	0.4	0.3	0.2

$$E(L) = (-0.5n) \cdot 0.1 + (1.5 - 0.5n) \cdot 0.4 + \dots + (4.5 - 0.5n) \cdot 0.2 = -0.5n + 2.4$$

Neste caso, não é difícil ver que:

$$\max(E(L)) = -0.5 \cdot 3 + 2.4 = 0.9$$

Agora vamos para o caso em que  $n$  pode ser 1 ou 2. Aqui, vou supor que o cliente que chega na loja pedindo uma quantidade além do estoque leva o total do estoque (exemplo: no caso  $n = 2$ , se um cliente pedir 3 flores, levará apenas 2 flores).

$n = 1$  :

x	0	1
L	-0.5	1.0
$P(L = l)$	0.1	0.9

$$E(L) = -0.5 \cdot 0.1 + 1.0 \cdot 0.9 = 0.85$$

$n = 2$  :

x	0	1	2
L	-1.0	0.5	2.0
$P(L = l)$	0.1	0.4	0.5

$$E(L) = -1 \cdot 0.1 + 0.5 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.5 = 1.10$$

Portanto, é mais vantajoso o vendedor ter 2 flores apenas no estoque da loja.

### 32)

Podemos usar uma Binomial com  $n = 18$  e  $p = 0.05$  para modelar o problema, onde  $X$  representa o total de peças defeituosas.

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\ &= \binom{18}{0} \cdot 0.05^0 \cdot 0.95^{18} + \binom{18}{1} \cdot 0.05^1 \cdot 0.95^{17} + \binom{18}{2} \cdot 0.05^2 \cdot 0.95^{16} = 0.9418 \end{aligned}$$

### 34a)

Seja  $N$  o número de petroleiros que chegam no porto em um dia.

$$\begin{aligned} P(N > 3) &= 1 - P(N \leq 3) = 1 - P(N = 0) - P(N = 1) - P(N = 2) = \\ &= 1 - \frac{2^0 \cdot e^{-2}}{0!} - \frac{2^1 \cdot e^{-2}}{1!} - \frac{2^2 \cdot e^{-2}}{2!} - \frac{2^3 \cdot e^{-2}}{3!} \approx 0.143 \end{aligned}$$

### 34b)

A probabilidade de atender todos os  $N$  navios é  $P(N \leq x_0)$ , sendo  $x_0$  o número máximo de petroleiros que a instalação pode suportar. Logo, queremos um  $x_0$  tal que  $P(N \leq x_0) \leq 0.95$

Do item a), vem que  $P(N \leq 3) = 0.857$ , portando vamos testar  $x_0$ , maiores:

$$P(N \leq 4) = P(N \leq 3) + P(N = 4) = 0.857 + \frac{2^4 \cdot e^{-2}}{4!} = 0.947$$

$$P(N \leq 5) = P(N \leq 4) + P(N = 5) = 0.947 + \frac{2^5 \cdot e^{-2}}{5!} = 0.983$$

Logo, precisamos colocar 2 instalações a mais para atingir esse objetivo.

### 34c)

Na distribuição de Poisson,  $E(N) = \lambda = 2$ .

### 37)

Seja  $X$  o número de parafusos numa amostra de 20 parafusos. Modelando o problema por uma distribuição Binomial, temos que  $n = 20$  e  $p = \frac{10}{100} = 0.1$

$$P(X = 0) = \binom{20}{0} \cdot (0.1)^0 \cdot (0.9)^{20} = 0.1216$$

$$P(N = 1) + P(N = 2) = \binom{20}{1} \cdot (0.1)^1 \cdot (0.9)^{19} + \binom{20}{2} \cdot (0.1)^2 \cdot (0.9)^{18} = 0.5554$$

$$\begin{aligned} P(N \geq 3) &= 1 - (P(N = 0) + P(N = 1) + P(N = 2)) \\ &= 1 - (0.1216 + 0.5554) = 0.3230 \end{aligned}$$

Seja V a variável que descreve o valor de venda do produto com base na proposta do comprador. Considere a tabela da distribuição de probabilidade de V abaixo:

V	20	10	8
P(V = v)	0.1216	0.5554	0.3230

$$E(V) = 20 \cdot 0.1216 + 10 \cdot 0.5554 + 8 \cdot 0.3230 = 10.57$$

Ou seja, em média, o valor da mercadoria com a proposta é menor do que 13.50, então é mais vantajoso o vendedor não aceitar a proposta do comprador.

### 39)

Seja X o número de válvulas defeituosas na caixa. Novamente podemos utilizar uma Binomial para modelar o problema com  $n = 10$  e  $p = 0.2$ .

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} \cdot (0.2)^0 \cdot (0.8)^{10} = 0.1074$$

$$P(X = 1) = \binom{10}{1} \cdot (0.2)^1 \cdot (0.8)^9 = 0.2684$$

$$P(X = 2) + P(X = 3) = \binom{10}{2} \cdot (0.2)^2 \cdot (0.8)^8 + \binom{10}{3} \cdot (0.2)^3 \cdot (0.8)^7 = 0.5033$$

$$P(X > 3) = 1 - (P(N = 0) + P(N = 1) + P(N = 2) + P(N = 3)) = 0.1209$$

A tabela de distribuição de probabilidade para a variável P (preço de uma caixa) é:

P	10	8	6	2
P(V = v)	0.1074	0.2684	0.5033	0.1209

$$E(P) = 10 \cdot 0.1074 + 8 \cdot 0.2684 + 6 \cdot 0.5033 + 2 \cdot 0.1209 \approx 6.48$$

### 44a)

$$P(X \text{ ser par}) = P(X = 2) + P(X = 4) + \dots = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^1 \cdot \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} + \dots = \frac{1/4}{1-1/4} = \frac{1}{3}$$

44b)

$$P(X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

44c)

$$P(X > 10) = \frac{1}{2^{11}} + \frac{1}{2^{12}} + \dots = \frac{\frac{1}{2^{11}}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2^{10}}$$

55c)

Primeiro, observe que:

$$P(x > t) = \sum_{i=t}^{\infty} (1-p)^i p = (1-p)^t p + (1-p)^{t+1} p + \dots = \frac{(1-p)^t p}{1 - (1-p)} = (1-p)^t$$

Agora trabalhando o lado esquerdo...

$$\begin{aligned} P(X > s+t | X > s) &= \frac{P(X > s+t) \cap (X > s)}{P(X > s)} = \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} = \\ &= \frac{(1-p)^{s+t} p + (1-p)^{s+t+1} p + \dots}{(1-p)^s p + (1-p)^{s+1} p + \dots} = \frac{p(1-p)^t ((1-p)^s + (1-p)^{s+1} + \dots)}{p((1-p)^s + (1-p)^{s+1} + \dots)} = \\ &= (1-p)^t = P(X > t) \end{aligned}$$

## Exercícios Adicionais

1)

Seja D o número de dezenas acertadas, vamos calcular a probabilidade de não acertarmos nenhuma dezena:

$$P(D = 0) = \frac{\binom{5}{0} \cdot \binom{45}{7}}{\binom{50}{7}} = 0.454321396$$

Note que também poderíamos ter calculado

$$P(D = 0) = \frac{\binom{7}{0} \cdot \binom{43}{5}}{\binom{50}{5}}$$

Sugestão: Faça as contas e verifique que chegamos na mesma probabilidade. Pelo complementar, a probabilidade de acertarmos pelo menos 1 dezena é  $1 -$

$0.4543 = 0.5457$  Para obter o valor de  $E(D)$ , vamos fazer a tabela de distribuição de probabilidade de  $D$ . Mas, antes calculemos as respectivas probabilidades:

$$P(D = 1) = \frac{\binom{5}{1} \cdot \binom{45}{6}}{\binom{50}{7}} = 0.407724329, P(D = 2) = \frac{\binom{5}{2} \cdot \binom{45}{5}}{\binom{50}{7}} = 0.122317299$$

$$P(D = 3) = \frac{\binom{5}{3} \cdot \binom{45}{3}}{\binom{50}{7}} = 0.001420642, P(D = 4) = \frac{\binom{5}{4} \cdot \binom{45}{2}}{\binom{50}{7}} = 0.000710321$$

$$P(D = 5) = \frac{\binom{5}{5} \cdot \binom{45}{2}}{\binom{50}{7}} = 0.000009911$$

$$E(D) = 0 \cdot 0.454321396 + 1 \cdot 0.122317299 + \dots + 5 \cdot 0.000009911 = 0.6595511692$$

## 2a)

A probabilidade é

$$\frac{\binom{7}{2} \binom{13}{2}}{\binom{20}{4}} \approx 0.3381$$

## 2b)

Observe que o fato de o cliente ter que tirar no máximo dois cupons de 50 reais não impede de ele tirar mais que 2 cupons de 100 reais, por exemplo, desde que se totalizem 4 cupons está tudo nos conformes. Assim, a probabilidade procurada é:

$$\frac{\binom{5}{0} \cdot \binom{15}{4} + \binom{5}{1} \cdot \binom{15}{3} + \binom{5}{2} \cdot \binom{15}{2}}{\binom{20}{4}} \approx 0.968$$

## 2c)

Seja  $C$  a variável aleatória que representa o número de cupons de prêmio 100 reais obtidos na compra de 4 potes:

$$P(C = 0) = \frac{\binom{2}{0} \cdot \binom{18}{4}}{\binom{20}{4}} = 0.6316$$

$$P(C = 1) = \frac{\binom{2}{1} \cdot \binom{18}{3}}{\binom{20}{4}} = 0.3368$$

$$P(C = 2) = \frac{\binom{2}{2} \cdot \binom{18}{2}}{\binom{20}{4}} = 0.0316$$

$$E(C) = 0 \cdot 0.6316 + 1 \cdot 0.3368 + 2 \cdot 0.0316 = 0.4$$



**3)**

Cada numero natural entre U e V tem uma probailidade k de ser sorteado. Se a probabilidade de sortearmos um número entre U e 5 inclusive é 0.15 e entre 17 e V inclusive é 0.30, logo, a probailidade de sortearmos um número entre 6 e 16 inclusive é  $1 - 0.15 - 0.3 = 0.55$ . Temos  $16 - 6 + 1 = 11$  números nesse intervalo, então:

$$11k = 0.55 \implies k = 0.05$$

Assim, podemos calcular

$$P(10 < X \leq 13) = P(X = 11) + P(X = 12) + P(X = 13) = 3 \cdot 0.05 = 0.15$$