socrative
A showbie PRODUCT

BSI aula 8

9 Questions

1. Para encontrar a moda de um conjunto de dados em R, qual pacote pode ajudar?

23/36 **A** modeest

0/36 **B** stats

10/36 **C** mod

3/36 **D** math

2. Qual função usaria para obter informações resumidas sobre um data frame em R?

1/36 **A** total(df)

3/36 **B** analyse(df)

25/36 **C** summary(df)

7/36 **D** info(df)

3. Em R, como você calcula a amplitude de um conjunto de dados x?

3/36 **A** dif(x)

1/36 **B** espaco(x)

4/36 **C** diff(x)

28/36 **D** max(x) - min(x)

4. Qual função em R é utilizada para achar a correlação entre dois conjuntos de dados x e y?

3/36 **A** correl(x, y)

2/36 **B** correla(x, y)

30/36 **C** cor(x, y)

1/36 **D** corr(x, y)

5. Para calcular a covariância entre dois conjuntos de dados x e y em R, qual função deve ser usada?

1/36 **A** covariancia(x, y)

32/36 **B** cov(x, y)

3/36 **C** cvar(x, y)

0/36 **D** covaria(x, y)

6. Qual é a função correta para a mediana em R?

31/36 **A** median(x)

2/36 **B** media(x)

0/36 **C** meio(x)

3/36 **D** mid(x)

7. Qual função é utilizada para calcular a variância em R?

0/36 **A** dev(x)

35/36 **B** var(x)

0/36 **C** varia(x)

1/36 **D** variância(x)

8. Qual é a função para calcular o desvio padrão em R?

4/36 **A** stdev(x)

28/36 **B** sd(x)

1/36 **C** desvio(x)

3/36 **D** var(x)

9. Como calcular a média amostral de uma lista de números em R?

1/36 **A** média(x)

3/36 **B** sum(x)/2

29/36 **C** mean(x)

3/36 **D** avg(x)