

cutaquir®

Inmunoglobulina Humana Normal (SCIg)
165 mg/ml de Solución para infusión

Dosis recomendada

Cutaquir® puede administrarse a intervalos regulares, desde diariamente hasta cada dos semanas.

Inmunodeficiencia primaria: puede ser necesaria una dosis de carga de al menos 0,2 a 0,5 g/kg de peso corporal. Puede ser necesario dividirla en varios días, con una dosis diaria máxima de 0,1 a 0,15 g/kg. Las dosis de mantenimiento se administran a intervalos repetidos hasta alcanzar una dosis mensual acumulada de 0,4 a 0,8 g/kg.

Inmunodeficiencia secundaria: las dosis se administran a intervalos repetidos (aproximadamente una vez por semana) hasta alcanzar una dosis mensual acumulada de 0,2-0,4 g/kg.

Volumen de infusión recomendado

La cantidad de cutaquir® infundida en un sitio en particular varía. En lactantes y niños, el sitio de infusión puede cambiarse cada 5-15 ml. En adultos, las dosis superiores a 30 ml pueden dividirse según la preferencia del paciente. No hay límite en el número de sitios de infusión. Los sitios de infusión deben estar separados por al menos 5 cm.

Tasas de infusión recomendadas

Para las primeras seis infusiones: 15 ml/hora/sitio
30 ml/hora para todos los sitios combinados

Infusiones posteriores: 25 ml/hora/sitio
Para todos los sitios combinados, aumentar gradualmente a 50 ml/hora, luego 80 ml/hora

Conversión de una dosis de cutaquir® (g) en un volumen de infusión (ml)

Dosis de cutaquir® calculada (g) x 6 = volumen de infusión (ml)

Condiciones de almacenamiento

Cutaquir® puede almacenarse a temperatura ambiente normal (**hasta 25°C**, por lo que las personas no necesitan guardarlo en la nevera) hasta 6 meses y después debe desecharse. Sin embargo, para un almacenamiento a largo plazo, cutaquir® debe guardarse en una nevera a 2°C - 8°C. Antes de su uso, cutaquir® debe ponerse a temperatura ambiente o corporal.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

No congelar. Conserve los viales de cutaquir® en la caja exterior para protegerlos de la luz. Mantenga cutaquir® en un lugar seguro, fuera del alcance y la vista de los niños.

Información del producto

Cutaquir® es un preparado de inmunoglobulina subcutánea líquida (SCIg) al 16,5% de inmunoglobulina G (IgG) altamente purificada.

Indicaciones y uso clínico

Cutaquir® está indicado para el tratamiento de personas con inmunodeficiencia primaria (PID) e inmunodeficiencia secundaria (SID)* que requieren terapia de sustitución con inmunoglobulinas.

Contraindicaciones

Cutaquir® está contraindicado en personas hipersensibles a este medicamento o a cualquier ingrediente de su formulación. No infundir en un vaso sanguíneo.

▼ Este medicamento está sujeto a un monitoreo adicional.

*Inmunodeficiencias secundarias (SID) en personas que padecen infecciones graves o recurrentes, tratamiento antimicrobiano ineficaz e insuficiencia demostrada de anticuerpos específicos (PSAF) o nivel sérico de IgG <4g/l. PSAF = fallo en la obtención de un aumento de al menos 2 veces en el título de anticuerpos IgG frente a las vacunas neumocócicas de polisacáridos y antígenos polipeptídicos.

octapharma

cutaquig[®]

Inmunoglobulina Humana normal (SCIg)
165 mg/ml de solución para infusión

Por favor, introduzca el peso (kg) del paciente y la dosis prescrita (g/kg/semana)

Peso del Paciente kg

Dosis g/Kg/semana

Calcular

Gramos por semana g

Volumen por semana ml

Gramos por mes g

Volumen por mes ml

Por favor, consulte la guía de infusión de cutaquig[®] para más detalles sobre cómo infundir su tratamiento.

Seleccione los tamaños de vial que se ajusten convenientemente al programa de dosificación semanal preferido por el paciente.

Están disponibles los siguientes tamaños de vial
1 g/6 ml, 2 g/12 ml, 4 g/24 ml, 8 g/48 ml



Cómo utilizar esta calculadora de dosis

1. Introduzca el peso del paciente en kg
2. Introduzca la dosis prescrita (g/kg/semana).
3. Seleccione el botón calcular
4. Seleccione los tamaños de vial que se ajusten convenientemente al programa de dosificación semanal preferido por el paciente
5. Puede imprimir o guardar el resultado como PDF seleccionando imprimir

Datos de contacto

Para obtener información completa sobre seguridad, por favor, consulte el Resumen de las Características del Producto de cutaquig[®]. Deben notificarse los acontecimientos adversos. Por favor, utilice los formularios de notificación de su país. Los efectos adversos deben notificarse también a Octapharma. www.octapharma.com.

Imprimir

Información del Producto

Cutaquig[®] es un preparado de inmunoglobulina subcutánea líquida (SCIg) al 16,5% de inmunoglobulina G (IgG) altamente purificada.

Indicaciones y uso clínico

Cutaquig[®] está indicado para el tratamiento de personas con inmunodeficiencia primaria (PID) e inmunodeficiencia secundaria (SID)* que requieren terapia de sustitución con inmunoglobulinas.

Contraindicaciones

Cutaquig[®] está contraindicado en personas hipersensibles a este medicamento o a cualquier ingrediente de su formulación. No infundir en un vaso sanguíneo.

octapharma

*Inmunodeficiencias secundarias (SID) en personas que padecen infecciones graves o recurrentes, tratamiento antimicrobiano ineficaz e insuficiencia demostrada de anticuerpos específicos (PSAF) o nivel sérico de IgG <4g/l. PSAF = fallo en la obtención de un aumento de al menos 2 veces en el título de anticuerpos IgG frente a las vacunas neumocócicas de polisacáridos y antígenos polipeptídicos.

Peso del Paciente:

kg

Dosis:

g/Kg/semana

Gramos por semana:

g

Gramos por mes:

g

Volumen por semana:

ml

Volumen por mes:

ml

Seleccione los tamaños de vial que se ajusten convenientemente al programa de dosificación semanal preferido por el paciente.



Información de Seguridad

▼ Este medicamento está sujeto a un monitoreo adicional.

Información abreviada para la prescripción de cutaqui® (165 mg/ml, Inmunoglobulina Humana Normal).

Esta información está diseñada para uso internacional y puede diferir de la información del producto válida en su país. Por favor, consulte el Resumen de las Características del Producto (SmPC) de su país antes de prescribirlo.

Presentación: Solución inyectable que contiene 165 mg/ml de inmunoglobulina humana normal, de la que $\geq 95\%$ es IgG. Contenido de IgA $\leq 0,6$ mg/ml.

Indicaciones: Terapia de sustitución en adultos, niños y adolescentes (0-18 años) con síndromes de inmunodeficiencia primaria (PID) con producción de anticuerpos alterada; inmunodeficiencias secundarias (SID) en personas que padecen infecciones graves o recurrentes, tratamiento antimicrobiano ineficaz e insuficiencia demostrada de anticuerpos específicos (PSAF)* o nivel sérico de IgG < 4 g/l. (*PSAF = fallo en la obtención de al menos 2 veces en el título de anticuerpos IgG frente a las vacunas neumocócicas de polisacáridos y antígeno polipeptídico).

Dosis y método de administración: La infusión subcutánea para el tratamiento domiciliario debe ser iniciada y supervisada por un profesional sanitario con experiencia en la orientación de personas para el tratamiento domiciliario. El paciente y/o un tutor deben ser instruidos adecuadamente. Para uso subcutáneo. La dosis debe individualizarse en función de la farmacocinética y la respuesta clínica para alcanzar un nivel sostenido de IgG de al menos 5 a 6 g/l y procurar estar dentro del intervalo de referencia de IgG sérica para la edad. Cutaqui® puede administrarse a intervalos regulares, desde diariamente hasta cada dos semanas. Terapia de sustitución en síndromes de inmunodeficiencia primaria: Puede ser necesaria una dosis de carga de al menos 0,2 - 0,5 g/kg para alcanzar el estado estacionario. Puede ser necesario dividirla en varios días, con una dosis diaria máxima de 0,1 a 0,15 g/kg. Dosis de mantenimiento a intervalos repetidos hasta alcanzar una dosis mensual acumulada de 0,4-0,8 g/kg. Puede ser necesario administrar la dosis diaria en más de un sitio de inyección. Terapia de sustitución en inmunodeficiencias secundarias: La dosis recomendada administrada a intervalos repetidos es para alcanzar una dosis mensual acumulada del orden de 0,2-0,4 g/kg (1,2 - 2,4 ml/kg). Puede ser necesario inyectar cada dosis única en diferentes sitios anatómicos. La tasa de infusión y el volumen de infusión por sitio se basan en la tolerabilidad del sujeto. Tasa de administración inicial: 15 ml/h/sitio. A partir de la infusión 7, si se tolera bien, aumentar gradualmente a 25 ml/h/sitio. Tasa de infusión por hora para todos los sitios combinados: 30 ml/h durante las 6 primeras infusiones, después, si se tolera bien, aumentar gradualmente hasta un máximo de 80 ml/h para todos los sitios. La cantidad de producto infundido en un sitio en particular varía. En lactantes y niños, el sitio de infusión puede cambiarse cada 5-15 ml. En adultos, las dosis superiores a 30 ml pueden dividirse según la preferencia del paciente. No hay límite en el número de sitios de infusión. Los sitios de infusión deben estar separados por al menos 5 cm.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. No administrar por vía intravenosa. No administrar por vía intramuscular en caso de trombocitopenia grave u otros trastornos de la hemostasia.

Advertencias y precauciones especiales: Cutaqui® contiene 90 mg de maltosa por ml. La interferencia de la maltosa con determinados análisis de glucosa en sangre puede dar lugar a lecturas de glucosa falsamente elevadas y a la administración inadecuada de insulina, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia y muerte. Lea siempre la información del producto de su sistema de prueba de glucosa en sangre. Anote el nombre y el número de lote de cada infusión. Riesgo de shock si se administra accidentalmente en un vaso sanguíneo. Pueden producirse reacciones adversas con mayor frecuencia si se administra a una tasa de infusión elevada, en personas nuevas a la inmunoglobulina humana normal, en personas que cambian de producto o cuando ha transcurrido un largo intervalo desde la infusión anterior. En caso de reacción adversa, disminuya la tasa de administración o interrumpa la infusión. El tratamiento adicional depende de la naturaleza y gravedad de la reacción adversa. Las reacciones de hipersensibilidad son raras. La anafilaxia puede desarrollarse en personas con IgA indetectable que tienen anticuerpos anti-IgA o en personas que habían tolerado un tratamiento previo con inmunoglobulina humana normal. En caso de shock, debe aplicarse el tratamiento médico estándar para el shock. Existen pruebas clínicas de una asociación entre la administración de inmunoglobulina y acontecimientos tromboembólicos como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (incluido el ictus), embolia pulmonar y trombosis venosa profunda. Los factores de riesgo asociados a acontecimientos tromboembólicos son la obesidad y, por ejemplo, la edad avanzada, la hipertensión, la diabetes mellitus, antecedentes de enfermedad vascular o episodios trombóticos, trastornos trombofílicos adquiridos o hereditarios o períodos prolongados de inmovilización, hipovolemia grave, enfermedades que aumentan la viscosidad de la sangre. Existe evidencia clínica de asociación entre la administración de inmunoglobulinas y la insuficiencia renal aguda. Los factores de riesgo asociados a complicaciones renales son, por ejemplo, insuficiencia renal preexistente, diabetes mellitus, hipovolemia, sobrepeso, medicamentos nefrotóxicos concomitantes, sepsis, hiperviscosidad, paraproteinemias o edad superior a los 65 años. Se han notificado casos de síndrome de meningitis aséptica (AMS) en relación con el tratamiento con inmunoglobulinas. El aumento transitorio de anticuerpos transferidos pasivamente durante/después de la inyección de inmunoglobulina puede dar lugar a resultados positivos engañosos en las pruebas serológicas. Cuando se administran medicamentos preparados a partir de sangre o plasma humanos, no puede excluirse totalmente la posibilidad de transmisión de agentes infecciosos. Esto también se aplica a los virus desconocidos o emergentes y a otros agentes patógenos. Los productos de IgG pueden contener anticuerpos del grupo sanguíneo que pueden actuar como hemolisinas e inducir el recubrimiento in vivo de los glóbulos rojos (RBCs) con inmunoglobulina, causando un resultado positivo en la prueba de antiglobulina directa (Coombs') y, raramente, pueden causar hemólisis. Este medicamento contiene 33,1 mg de sodio por vial de 48 ml y 13,8 mg de sodio por vial de 20 ml.

Interacciones: La administración de inmunoglobulinas puede mermar durante un período de al menos 6 semanas y hasta 3 meses (hasta 1 año en caso de sarampión) la eficacia de las vacunas con virus vivos atenuados como el sarampión, la rubéola, las paperas y la varicela.

Efectos indeseables: Pueden producirse con frecuencia reacciones en el sitio de la inyección. Ocasionalmente pueden producirse escalofríos, dolor de cabeza, mareos, fiebre, vómitos, reacciones alérgicas, náuseas, artalgia, hipotensión arterial y lumbalgia moderada. En raras ocasiones, las inmunoglobulinas humanas normales pueden provocar una caída brusca de la tensión arterial y, en casos aislados, un shock anafiláctico. Para consultar la lista completa de efectos indeseables, véase la sección 4.8 del SmPC local.

Precauciones especiales de desecho y almacenamiento: La vida útil es de 3 años a $+2$ a $+8^{\circ}\text{C}$. Dentro de su vida útil, el producto puede almacenarse a temperatura ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) durante un máximo de 6 meses sin volver a refrigerarlo y debe desecharse si no se utiliza después. No congelar. Proteger de la luz. El producto debe ponerse a temperatura ambiente o corporal antes de su uso.

Categoría Legal: POM.

Número de Autorización de Comercialización: Consulte la información pertinente en su país.

Titular de la Autorización de Comercialización: Octapharma AG, Seidenstrasse 2, CH-8853 Lachen, Suiza

Este prospecto está dirigido a los profesionales sanitarios. Fecha de elaboración: Enero 2023.

Los efectos adversos deben notificarse a safetyreporting@octapharma.com.

Referencia

Cutaqui® Resumen de las Características del Producto. Enero 2023.

octapharma

Octapharma AG, Seidenstrasse 2
8853 Lachen, Suiza

www.octapharma.com

Copyright © 2023.

Todos los derechos reservados.