

EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $2 + 10$

4. 8×6

2. $56 \div 8$

5. $3 + 6$

3. $8 - 2$

6. $15 \div 5$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $64 \div (x + 5)$

2. $16 \div (4 - x)$

3. $8 \div (9 - x)$

4. $25 \div (10 - x)$

5. $6 + 8x$

6. $20 \div (7 - x)$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(6 + x) \times (14 - y)$

2. $(7 - x) \times (11 - y)$

3. $18 \div y + 8 \div x$

4. $(50 - x) \div (17 - y)$

5. $(7 + x) \div (12 - y)$

6. $2x + 2y$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(12 - y) \times (5 + 10x)$

2. $(9 - y) \times (7 + 6x)$

3. $(17 - y) \times (7 + 6x)$

4. $(9 - y) \times (4 + 7x)$

5. $8x + 35y \div 5$

6. $(779 + x) \div (8 \times (5 + y))$

EX

1

1. $2 + 10$ s'écrit : **la somme de 2 et de 10.**
2. $56 \div 8$ s'écrit : **le quotient de 56 par 8.**
3. $8 - 2$ s'écrit : **la différence entre 8 et 2.**
4. 8×6 s'écrit : **le produit de 8 par 6.**
5. $3 + 6$ s'écrit : **la somme de 3 et de 6.**
6. $15 \div 5$ s'écrit : **le quotient de 15 par 5.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $64 \div (x + 5) = 64 \div (3 + 5) = 64 \div 8 = 8$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $64 \div (x + 5)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $16 \div (4 - x) = 16 \div (4 - 2) = 16 \div 2 = 8$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $16 \div (4 - x)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
3. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $8 \div (9 - x) = 8 \div (9 - 5) = 8 \div 4 = 2$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $8 \div (9 - x)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
4. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $25 \div (10 - x) = 25 \div (10 - 5) = 25 \div 5 = 5$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $25 \div (10 - x)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
5. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $6 + 8x = 6 + 8 \times 2 = 6 + 16 = 22$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $6 + 8x$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.



6. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $20 \div (7 - x) = 20 \div (7 - 5) = 20 \div 2 = 10$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $20 \div (7 - x)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX
3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(6 + x) \times (14 - y) = (6 + 3) \times (14 - 7) = 9 \times 7 = 63$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(6 + x) \times (14 - y)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $(7 - x) \times (11 - y) = (7 - 2) \times (11 - 8) = 5 \times 3 = 15$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(7 - x) \times (11 - y)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
3. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $18 \div y + 8 \div x = 18 \div 6 + 8 \div 4 = 3 + 2 = 5$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $18 \div y + 8 \div x$ est une undefined.
Cette expression est donc undefined.
4. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $(50 - x) \div (17 - y) = (50 - 2) \div (17 - 9) = 48 \div 8 = 6$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(50 - x) \div (17 - y)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
5. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(7 + x) \div (12 - y) = (7 + 5) \div (12 - 6) = 12 \div 6 = 2$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(7 + x) \div (12 - y)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
6. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $2x + 2y = 2 \times 4 + 2 \times 9 = 8 + 18 = 26$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $2x + 2y$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $(12 - y) \times (5 + 10x) = (12 - 9) \times (5 + 10 \times 2) = 3(5 + 20) = 3 \times 25 = 75$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(12 - y) \times (5 + 10x)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(9 - y) \times (7 + 6x) = (9 - 7) \times (7 + 6 \times 2) = 2(7 + 12) = 2 \times 19 = 38$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(9 - y) \times (7 + 6x)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
3. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $(17 - y) \times (7 + 6x) = (17 - 9) \times (7 + 6 \times 4) = 8(7 + 24) = 8 \times 31 = 248$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(17 - y) \times (7 + 6x)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
4. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(9 - y) \times (4 + 7x) = (9 - 6) \times (4 + 7 \times 3) = 3(4 + 21) = 3 \times 25 = 75$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(9 - y) \times (4 + 7x)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
5. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $8x + 35y \div 5 = 8 \times 2 + 35 \times 9 \div 5 = 16 + 315 \div 5 = 16 + 63 = 79$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $8x + 35y \div 5$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
6. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $(779 + x) \div (8 \times (5 + y)) = (779 + 5) \div (8 \times (5 + 9)) = 784 \div (8 \times 14) = 784 \div 112 = 7$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(779 + x) \div (8 \times (5 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.