



EX
1



1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .



EX


1




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX


2



1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
1

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1



1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
2



1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .




EX
1




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
2



1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
2

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .



EX


1




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX


2




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
1

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
2



1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
2

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .



EX


1




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX


2



1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
1

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
2



1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
1

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
2




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
2

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .



EX


1



1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX

2




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
2




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1


1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .


EX
2

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .



EX


1




1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX


2



1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
1

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .

EX
2

1. Déterminer l'expression de la fonction f_1 représentée par la droite (d_1) .
2. Déterminer l'expression de la fonction f_2 représentée par la droite (d_2) .



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_1(1) = -3 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -3 + 1 = -2$. Ainsi $f_1(x) = -2x - 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -5)$ donc $f_2(1) = -5 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -5 + 2 = -3$. Ainsi $f_2(x) = -3x - 2$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 0,5)$ donc $f_1(1) = 0,5 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 0,5 - 1 = -0,5$. Ainsi $f_1(x) = -0,5x + 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_2(1) = 3 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 3 - 1 = 2$. Ainsi $f_2(x) = 2x + 1$.

EX
1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_1(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_1(x) = -x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $4 = 0 + b$ donc $b = 4$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 7)$ donc $f_2(1) = 7 = a \times 1 + 4 = a + 4$ donc $a = 7 - 4 = 3$. Ainsi $f_2(x) = 3x + 4$.

EX
2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-3 = 0 + b$ donc $b = -3$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -6)$ donc $f_1(1) = -6 = a \times 1 - 3 = a - 3$ donc $a = -6 + 3 = -3$. Ainsi $f_1(x) = -3x - 3$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 5,5)$ donc $f_2(1) = 5,5 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 5,5 - 3 = 2,5$. Ainsi $f_2(x) = 2,5x + 3$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_1(1) = 3 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 3 - 2 = 1$. Ainsi $f_1(x) = x + 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-4 = 0 + b$ donc $b = -4$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -7)$ donc $f_2(1) = -7 = a \times 1 - 4 = a - 4$ donc $a = -7 + 4 = -3$. Ainsi $f_2(x) = -3x - 4$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 3,75)$ donc $f_1(1) = 3,75 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 3,75 - 2 = 1,75$. Ainsi $f_1(x) = 1,75x + 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -3 + 1 = -2$. Ainsi $f_2(x) = -2x - 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_1(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_1(x) = -x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-4 = 0 + b$ donc $b = -4$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -7)$ donc $f_2(1) = -7 = a \times 1 - 4 = a - 4$ donc $a = -7 + 4 = -3$. Ainsi $f_2(x) = -3x - 4$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -0,75)$ donc $f_1(1) = -0,75 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -0,75 + 1 = 0,25$. Ainsi $f_1(x) = 0,25x - 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 0,5)$ donc $f_2(1) = 0,5 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 0,5 - 1 = -0,5$. Ainsi $f_2(x) = -0,5x + 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_1(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_1(x) = -x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -3 + 1 = -2$. Ainsi $f_2(x) = -2x - 1$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 2)$ donc $f_1(1) = 2 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 2 - 1 = 1$. Ainsi $f_1(x) = x + 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -2,25)$ donc $f_2(1) = -2,25 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -2,25 + 1 = -1,25$. Ainsi $f_2(x) = -1,25x - 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -5)$ donc $f_1(1) = -5 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -5 + 2 = -3$. Ainsi $f_1(x) = -3x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_2(1) = 3 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 3 - 2 = 1$. Ainsi $f_2(x) = x + 2$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 6)$ donc $f_1(1) = 6 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 6 - 3 = 3$. Ainsi $f_1(x) = 3x + 3$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -2,25)$ donc $f_2(1) = -2,25 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -2,25 + 1 = -1,25$. Ainsi $f_2(x) = -1,25x - 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-4 = 0 + b$ donc $b = -4$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -7)$ donc $f_1(1) = -7 = a \times 1 - 4 = a - 4$ donc $a = -7 + 4 = -3$. Ainsi $f_1(x) = -3x - 4$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-3 = 0 + b$ donc $b = -3$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -5)$ donc $f_2(1) = -5 = a \times 1 - 3 = a - 3$ donc $a = -5 + 3 = -2$. Ainsi $f_2(x) = -2x - 3$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 4,75)$ donc $f_1(1) = 4,75 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 4,75 - 3 = 1,75$. Ainsi $f_1(x) = 1,75x + 3$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 2,25)$ donc $f_2(1) = 2,25 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 2,25 - 1 = 1,25$. Ainsi $f_2(x) = 1,25x + 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-4 = 0 + b$ donc $b = -4$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -7)$ donc $f_1(1) = -7 = a \times 1 - 4 = a - 4$ donc $a = -7 + 4 = -3$. Ainsi $f_1(x) = -3x - 4$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_2(1) = 3 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 3 - 2 = 1$. Ainsi $f_2(x) = x + 2$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $4 = 0 + b$ donc $b = 4$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 6,75)$ donc $f_1(1) = 6,75 = a \times 1 + 4 = a + 4$ donc $a = 6,75 - 4 = 2,75$. Ainsi $f_1(x) = 2,75x + 4$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 1,5)$ donc $f_2(1) = 1,5 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 1,5 - 1 = 0,5$. Ainsi $f_2(x) = 0,5x + 1$.

EX
1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $4 = 0 + b$ donc $b = 4$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 7)$ donc $f_1(1) = 7 = a \times 1 + 4 = a + 4$ donc $a = 7 - 4 = 3$. Ainsi $f_1(x) = 3x + 4$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_2(1) = 3 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 3 - 2 = 1$. Ainsi $f_2(x) = x + 2$.

EX
2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 2,5)$ donc $f_1(1) = 2,5 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 2,5 - 1 = 1,5$. Ainsi $f_1(x) = 1,5x + 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3,75)$ donc $f_2(1) = -3,75 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3,75 + 2 = -1,75$. Ainsi $f_2(x) = -1,75x - 2$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 5)$ donc $f_1(1) = 5 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 5 - 3 = 2$. Ainsi $f_1(x) = 2x + 3$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_2(x) = -x - 2$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $4 = 0 + b$ donc $b = 4$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 7)$ donc $f_1(1) = 7 = a \times 1 + 4 = a + 4$ donc $a = 7 - 4 = 3$. Ainsi $f_1(x) = 3x + 4$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 4,75)$ donc $f_2(1) = 4,75 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 4,75 - 3 = 1,75$. Ainsi $f_2(x) = 1,75x + 3$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 5)$ donc $f_1(1) = 5 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 5 - 2 = 3$. Ainsi $f_1(x) = 3x + 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-4 = 0 + b$ donc $b = -4$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -7)$ donc $f_2(1) = -7 = a \times 1 - 4 = a - 4$ donc $a = -7 + 4 = -3$. Ainsi $f_2(x) = -3x - 4$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 5,25)$ donc $f_1(1) = 5,25 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 5,25 - 3 = 2,25$. Ainsi $f_1(x) = 2,25x + 3$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -0,75)$ donc $f_2(1) = -0,75 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -0,75 + 1 = 0,25$. Ainsi $f_2(x) = 0,25x - 1$.

EX
1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_1(1) = 3 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 3 - 2 = 1$. Ainsi $f_1(x) = x + 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-4 = 0 + b$ donc $b = -4$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -7)$ donc $f_2(1) = -7 = a \times 1 - 4 = a - 4$ donc $a = -7 + 4 = -3$. Ainsi $f_2(x) = -3x - 4$.

EX
2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -5)$ donc $f_1(1) = -5 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -5 + 2 = -3$. Ainsi $f_1(x) = -3x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -2)$ donc $f_2(1) = -2 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -2 + 1 = -1$. Ainsi $f_2(x) = -x - 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_1(1) = -3 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -3 + 1 = -2$. Ainsi $f_1(x) = -2x - 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_2(x) = -x - 2$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 5,25)$ donc $f_1(1) = 5,25 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 5,25 - 3 = 2,25$. Ainsi $f_1(x) = 2,25x + 3$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 5,5)$ donc $f_2(1) = 5,5 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 5,5 - 3 = 2,5$. Ainsi $f_2(x) = 2,5x + 3$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_1(1) = 3 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 3 - 2 = 1$. Ainsi $f_1(x) = x + 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 5)$ donc $f_2(1) = 5 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 5 - 3 = 2$. Ainsi $f_2(x) = 2x + 3$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 1,75)$ donc $f_1(1) = 1,75 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 1,75 - 1 = 0,75$. Ainsi $f_1(x) = 0,75x + 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3,5)$ donc $f_2(1) = -3,5 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -3,5 + 1 = -2,5$. Ainsi $f_2(x) = -2,5x - 1$.

EX
1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 5)$ donc $f_1(1) = 5 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 5 - 2 = 3$. Ainsi $f_1(x) = 3x + 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_2(1) = 3 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 3 - 1 = 2$. Ainsi $f_2(x) = 2x + 1$.

EX
2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3,75)$ donc $f_1(1) = -3,75 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3,75 + 2 = -1,75$. Ainsi $f_1(x) = -1,75x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 3,25)$ donc $f_2(1) = 3,25 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 3,25 - 1 = 2,25$. Ainsi $f_2(x) = 2,25x + 1$.

EX
1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 5)$ donc $f_1(1) = 5 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 5 - 2 = 3$. Ainsi $f_1(x) = 3x + 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 5)$ donc $f_2(1) = 5 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 5 - 3 = 2$. Ainsi $f_2(x) = 2x + 3$.

EX
2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $4 = 0 + b$ donc $b = 4$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 6,5)$ donc $f_1(1) = 6,5 = a \times 1 + 4 = a + 4$ donc $a = 6,5 - 4 = 2,5$. Ainsi $f_1(x) = 2,5x + 4$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 4,25)$ donc $f_2(1) = 4,25 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 4,25 - 2 = 2,25$. Ainsi $f_2(x) = 2,25x + 2$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-3 = 0 + b$ donc $b = -3$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -5)$ donc $f_1(1) = -5 = a \times 1 - 3 = a - 3$ donc $a = -5 + 3 = -2$. Ainsi $f_1(x) = -2x - 3$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_2(x) = -x - 2$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 2)$ donc $f_1(1) = 2 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 2 - 1 = 1$. Ainsi $f_1(x) = x + 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -2)$ donc $f_2(1) = -2 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -2 + 1 = -1$. Ainsi $f_2(x) = -x - 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_1(1) = -3 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -3 + 1 = -2$. Ainsi $f_1(x) = -2x - 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_2(x) = -x - 2$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 2)$ donc $f_1(1) = 2 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 2 - 1 = 1$. Ainsi $f_1(x) = x + 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 5,25)$ donc $f_2(1) = 5,25 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 5,25 - 3 = 2,25$. Ainsi $f_2(x) = 2,25x + 3$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $4 = 0 + b$ donc $b = 4$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 7)$ donc $f_1(1) = 7 = a \times 1 + 4 = a + 4$ donc $a = 7 - 4 = 3$. Ainsi $f_1(x) = 3x + 4$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -5)$ donc $f_2(1) = -5 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -5 + 2 = -3$. Ainsi $f_2(x) = -3x - 2$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3,25)$ donc $f_1(1) = -3,25 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3,25 + 2 = -1,25$. Ainsi $f_1(x) = -1,25x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 2,75)$ donc $f_2(1) = 2,75 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 2,75 - 2 = 0,75$. Ainsi $f_2(x) = 0,75x + 2$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 5)$ donc $f_1(1) = 5 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 5 - 2 = 3$. Ainsi $f_1(x) = 3x + 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_2(1) = 3 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 3 - 1 = 2$. Ainsi $f_2(x) = 2x + 1$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 0,75)$ donc $f_1(1) = 0,75 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 0,75 - 1 = -0,25$. Ainsi $f_1(x) = -0,25x + 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 2,75)$ donc $f_2(1) = 2,75 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 2,75 - 1 = 1,75$. Ainsi $f_2(x) = 1,75x + 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_1(1) = 3 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 3 - 1 = 2$. Ainsi $f_1(x) = 2x + 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 5)$ donc $f_2(1) = 5 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 5 - 2 = 3$. Ainsi $f_2(x) = 3x + 2$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-4 = 0 + b$ donc $b = -4$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -7)$ donc $f_1(1) = -7 = a \times 1 - 4 = a - 4$ donc $a = -7 + 4 = -3$. Ainsi $f_1(x) = -3x - 4$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_2(x) = -x - 2$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_1(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_1(x) = -x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -3 + 1 = -2$. Ainsi $f_2(x) = -2x - 1$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3,5)$ donc $f_1(1) = -3,5 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3,5 + 2 = -1,5$. Ainsi $f_1(x) = -1,5x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -2,25)$ donc $f_2(1) = -2,25 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -2,25 + 1 = -1,25$. Ainsi $f_2(x) = -1,25x - 1$.

EX
1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 5)$ donc $f_1(1) = 5 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 5 - 2 = 3$. Ainsi $f_1(x) = 3x + 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 5)$ donc $f_2(1) = 5 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 5 - 3 = 2$. Ainsi $f_2(x) = 2x + 3$.

EX
2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-3 = 0 + b$ donc $b = -3$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -4,75)$ donc $f_1(1) = -4,75 = a \times 1 - 3 = a - 3$ donc $a = -4,75 + 3 = -1,75$. Ainsi $f_1(x) = -1,75x - 3$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -4,75)$ donc $f_2(1) = -4,75 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -4,75 + 2 = -2,75$. Ainsi $f_2(x) = -2,75x - 2$.

EX
1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_1(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_1(x) = -x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $4 = 0 + b$ donc $b = 4$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 7)$ donc $f_2(1) = 7 = a \times 1 + 4 = a + 4$ donc $a = 7 - 4 = 3$. Ainsi $f_2(x) = 3x + 4$.

EX
2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 4,75)$ donc $f_1(1) = 4,75 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 4,75 - 2 = 2,75$. Ainsi $f_1(x) = 2,75x + 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 2)$ donc $f_2(1) = 2 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 2 - 1 = 1$. Ainsi $f_2(x) = x + 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_1(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_1(x) = -x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-4 = 0 + b$ donc $b = -4$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -7)$ donc $f_2(1) = -7 = a \times 1 - 4 = a - 4$ donc $a = -7 + 4 = -3$. Ainsi $f_2(x) = -3x - 4$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 5,75)$ donc $f_1(1) = 5,75 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 5,75 - 3 = 2,75$. Ainsi $f_1(x) = 2,75x + 3$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -2)$ donc $f_2(1) = -2 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -2 + 1 = -1$. Ainsi $f_2(x) = -x - 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_1(1) = 3 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 3 - 1 = 2$. Ainsi $f_1(x) = 2x + 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_2(x) = -x - 2$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $3 = 0 + b$ donc $b = 3$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 6)$ donc $f_1(1) = 6 = a \times 1 + 3 = a + 3$ donc $a = 6 - 3 = 3$. Ainsi $f_1(x) = 3x + 3$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 4,25)$ donc $f_2(1) = 4,25 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 4,25 - 2 = 2,25$. Ainsi $f_2(x) = 2,25x + 2$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_1(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_1(x) = -x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-4 = 0 + b$ donc $b = -4$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -7)$ donc $f_2(1) = -7 = a \times 1 - 4 = a - 4$ donc $a = -7 + 4 = -3$. Ainsi $f_2(x) = -3x - 4$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 3)$ donc $f_1(1) = 3 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 3 - 2 = 1$. Ainsi $f_1(x) = x + 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $2 = 0 + b$ donc $b = 2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 3,25)$ donc $f_2(1) = 3,25 = a \times 1 + 2 = a + 2$ donc $a = 3,25 - 2 = 1,25$. Ainsi $f_2(x) = 1,25x + 2$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -5)$ donc $f_1(1) = -5 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -5 + 2 = -3$. Ainsi $f_1(x) = -3x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -3)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-3 = 0 + b$ donc $b = -3$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -5)$ donc $f_2(1) = -5 = a \times 1 - 3 = a - 3$ donc $a = -5 + 3 = -2$. Ainsi $f_2(x) = -2x - 3$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 2,75)$ donc $f_1(1) = 2,75 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 2,75 - 1 = 1,75$. Ainsi $f_1(x) = 1,75x + 1$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -2)$ donc $f_2(1) = -2 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -2 + 1 = -1$. Ainsi $f_2(x) = -x - 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_1(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_1(x) = -x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -3 + 1 = -2$. Ainsi $f_2(x) = -2x - 1$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $4 = 0 + b$ donc $b = 4$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 6,75)$ donc $f_1(1) = 6,75 = a \times 1 + 4 = a + 4$ donc $a = 6,75 - 4 = 2,75$. Ainsi $f_1(x) = 2,75x + 4$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-1 = 0 + b$ donc $b = -1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 1 = a - 1$ donc $a = -3 + 1 = -2$. Ainsi $f_2(x) = -2x - 1$.



EX

1

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; -5)$ donc $f_1(1) = -5 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -5 + 2 = -3$. Ainsi $f_1(x) = -3x - 2$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; -2)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $-2 = 0 + b$ donc $b = -2$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; -3)$ donc $f_2(1) = -3 = a \times 1 - 2 = a - 2$ donc $a = -3 + 2 = -1$. Ainsi $f_2(x) = -x - 2$.

EX

2

1. La droite d_1 passe par le point de coordonnées $(0; 4)$. Elle représente donc la fonction affine $f_1(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_1(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $4 = 0 + b$ donc $b = 4$.
De plus (d_1) passe par le point de coordonnées $(1; 6,75)$ donc $f_1(1) = 6,75 = a \times 1 + 4 = a + 4$ donc $a = 6,75 - 4 = 2,75$. Ainsi $f_1(x) = 2,75x + 4$.
2. La droite d_2 passe par le point de coordonnées $(0; 1)$. Elle représente donc la fonction affine $f_2(x) = ax + b$ dont la constante b est égale à $f_2(0) = a \times 0 + b$, c'est-à-dire $1 = 0 + b$ donc $b = 1$.
De plus (d_2) passe par le point de coordonnées $(1; 2)$ donc $f_2(1) = 2 = a \times 1 + 1 = a + 1$ donc $a = 2 - 1 = 1$. Ainsi $f_2(x) = x + 1$.