



Test 6P14

EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.

Un cycliste parcourt en moyenne 126 km en 7 heures.

Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 12 heures?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.

a. Calculer le coefficient de proportionnalité.

b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	30	...	80
Grandeur B	...	56	640

↗ $\times \dots$





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Il est indiqué sur la bouteille de sirop qu'il faut 24 cL de sirop pour 6 L d'eau.
On veut utiliser 11 L d'eau.
Quel volume de sirop doit-on prévoir?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	...	50
Grandeur B	210	120	300

↗ $\times \dots$





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Béatrice a repéré, au supermarché local, des assiettes qui l'intéressent.
Elle lit que 9 assiettes coûtent 45€. Elle veut en acheter 11.
Combien va-t-elle dépenser?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	15	20
Grandeur B	48	...	120

↗ $\times \dots$





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.

Il est indiqué sur la bouteille de médicament qu'il faut 18 mL de médicament pour 6 dL d'eau.

On veut utiliser 11 dL d'eau.

Quel volume de médicament doit-on prévoir?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.

a. Calculer le coefficient de proportionnalité.

b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	9	...
Grandeur B	120	18	48

↗ $\times \dots$





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Sur une carte sur laquelle 7 cm représente 21 km dans la réalité, Julie mesure son trajet et elle trouve une distance de 11 cm. À quelle distance cela correspond dans la réalité?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	50	12	80
Grandeur B	...	...	480

× ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.

Carine a repéré, dans la boutique du musée, des jeux de société qui l'intéressent.

Elle lit que 7 jeux de société coûtent 21€. Elle veut en acheter 13.

Combien va-t-elle dépenser?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.

a. Calculer le coefficient de proportionnalité.

b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	70	8	15
Grandeur B	...	80	...

↗ $\times \dots$





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Nawel doit acheter du carrelage.
Sur la notice, il est indiqué de prévoir 15 carreaux pour 3 m².
Combien doit-elle en acheter pour une surface de 7 m² ?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	30	35	...
Grandeur B	180	...	48

↗ × ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Vanessa a repéré, au supermarché local, des packs de lait qui l'intéressent.
Elle lit que 9 packs de lait coûtent 36 €. Elle veut en acheter 11.
Combien va-t-elle dépenser ?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	...	40
Grandeur B	540	42	240

↗ × ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.

Il est indiqué sur la bouteille de sirop qu'il faut 28 cL de sirop pour 7 L d'eau.

On veut utiliser 9 L d'eau.

Quel volume de sirop doit-on prévoir?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.

a. Calculer le coefficient de proportionnalité.

b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	24	25	9
Grandeur B	...	...	36

↗ $\times \dots$





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.

Béatrice doit acheter du carrelage.

Sur la notice, il est indiqué de prévoir 21 carreaux pour 7 m^2 .

Combien doit-elle en acheter pour une surface de 10 m^2 ?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.

a. Calculer le coefficient de proportionnalité.

b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	25	...	40
Grandeur B	...	160	400

↗ $\times \dots$





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Julie lit sur sa recette de gâteau pour 7 personnes qu'il faut 70 g de beurre.
Elle veut adapter sa recette pour 9 personnes.
Quelle masse de beurre doit-elle prévoir?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	50	40	...
Grandeur B	...	160	28

↗ × ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.

Il est indiqué sur la bouteille de médicament qu'il faut 36 mL de médicament pour 9 dL d'eau.

On veut utiliser 11 dL d'eau.

Quel volume de médicament doit-on prévoir?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.

a. Calculer le coefficient de proportionnalité.

b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	9	...	12
Grandeur B	72	128	...

↗ $\times \dots$





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Nawel a repéré, au supermarché local, des packs de lait qui l'intéressent.
Elle lit que 7 packs de lait coûtent 21€. Elle veut en acheter 13.
Combien va-t-elle dépenser?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	...	12
Grandeur B	280	72	96

↗ × ...





EX 1

Répondre à la question posée en justifiant.
Béatrice lit sur sa recette de flan pour 11 personnes qu'il faut 385 g de chocolat.
Elle veut adapter sa recette pour 12 personnes.
Quelle masse de chocolat doit-elle prévoir?

EX 2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	50	...	...
Grandeur B	400	560	128

↗ $\times \dots$





Test 6P14

EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Un piéton parcourt en moyenne 12 km en 3 heures.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 7 heures?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	30	40	...
Grandeur B	...	240	144

↗ × ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Sur une carte sur laquelle 3 cm représente 12 km dans la réalité, Magalie mesure son trajet et elle trouve une distance de 11 cm. À quelle distance cela correspond dans la réalité?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	16	12	10
Grandeur B	...	72	...

× ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Nadia a repéré, à l'épicerie, des pots de cancoillotte qui l'intéressent.
Elle lit que 9 pots de cancoillotte coûtent 27 €. Elle veut en acheter 12.
Combien va-t-elle dépenser ?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	40	...	12
Grandeur B	320	200	...

↗ $\times \dots$





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Sur une carte sur laquelle 6 cm représente 12 km dans la réalité,
Dalila mesure son trajet et elle trouve une distance de 13 cm.
À quelle distance cela correspond dans la réalité?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	3	16	7
Grandeur B	18	...	...

× ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Sur une carte sur laquelle 7 cm représente 35 km dans la réalité, Yasmine mesure son trajet et elle trouve une distance de 13 cm. À quelle distance cela correspond dans la réalité?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	60	70	80
Grandeur B	...	...	640

× ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Nawel doit acheter du carrelage.
Sur la notice, il est indiqué de prévoir 30 carreaux pour 6 m^2 .
Combien doit-elle en acheter pour une surface de 7 m^2 ?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	60	...	50
Grandeur B	...	80	500

↗ $\times \dots$



**EX 1**

Répondre à la question posée en justifiant.

Il est indiqué sur la bouteille de produit pour piscine qu'il faut 28 L de produit pour piscine pour 7 dizaines de mètres cubes d'eau.

On veut utiliser 8 dizaines de mètres cubes d'eau.

Quel volume de produit pour piscine doit-on prévoir?

EX 2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.

a. Calculer le coefficient de proportionnalité.

b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	7	25	60
Grandeur B	56	...	...

↗ $\times \dots$



EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Elsa a repéré, au supermarché local, des paquets de pâtes qui l'intéressent.
Elle lit que 9 paquets de pâtes coûtent 27 €. Elle veut en acheter 13.
Combien va-t-elle dépenser ?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	...	20
Grandeur B	700	160	200

↗ × ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Marina doit acheter du carrelage.
Sur la notice, il est indiqué de prévoir 60 carreaux pour 12 m^2 .
Combien doit-elle en acheter pour une surface de 13 m^2 ?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	...	9
Grandeur B	500	150	90

↗ $\times \dots$





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Un camion parcourt en moyenne 225 km en 3 heures.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 4 heures?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	35	...
Grandeur B	400	280	24

↗ × ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Karole a repéré, dans une animalerie, des phasmes qui l'intéressent.
Elle lit que 11 phasmes coûtent 33€. Elle veut en acheter 12.
Combien va-t-elle dépenser?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	...	9
Grandeur B	240	200	36

↗ $\times \dots$





Test 6P14

EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Un piéton parcourt en moyenne 15 km en 3 heures.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 5 heures?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	90	...	8
Grandeur B	...	300	48

↗ × ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Un train parcourt en moyenne 875 km en 7 heures.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 8 heures?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	9	7	...
Grandeur B	72	...	64

↗ × ...



**EX 1**

Répondre à la question posée en justifiant.

Manon lit sur sa recette de pain perdu pour 11 personnes qu'il faut 330 g de sucre.

Elle veut adapter sa recette pour 13 personnes.

Quelle masse de sucre doit-elle prévoir?

EX 2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.

a. Calculer le coefficient de proportionnalité.

b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	8	...	...
Grandeur B	64	280	200

↗ $\times \dots$



EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Un train parcourt en moyenne 2340 km en 12 heures.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 13 heures?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	...	24
Grandeur B	72	160	192

↗ × ...





EX
1

Répondre à la question posée en justifiant.
Aude doit acheter du carrelage.
Sur la notice, il est indiqué de prévoir 28 carreaux pour 7 m^2 .
Combien doit-elle en acheter pour une surface de 12 m^2 ?

EX
2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
a. Calculer le coefficient de proportionnalité.
b. Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	35	15	12
Grandeur B	...	60	...

↗ $\times \dots$



**EX 1**

Commençons par trouver quelle est la distance parcourue en 1h.
1 h, c'est 7 fois moins que 7 h. En 1 h, le cycliste parcourt donc une distance 7 fois moins grande qu'en 7 h.

$$126 \text{ km} \div 7 = 18 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : en 1h, le cycliste parcourt 18 km.

Cherchons maintenant la distance parcourue en 12 h.

12 h, c'est 12 fois 1 h. Le cycliste parcourt donc 12 fois plus de distance qu'en 1 h.

$$18 \text{ km} \times 12 = 216 \text{ km}$$

Conclusion : le cycliste parcourra en moyenne 216 km en 12 h.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 640 par 80, soit $\frac{640}{80} = 8$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $30 \times 8 = 240$.

Pour la colonne 2, on calcule : $56 \div 8 = 7$.

Grandeur A	30	7	80
Grandeur B	240	56	640

× 8

**EX 1**

Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de sirop pour 1 L d'eau. 6 L d'eau, c'est 6 fois 1 L d'eau. Pour 1 L d'eau, il faut donc 6 fois moins que 24 cL.

$$24 \text{ cL} \div 6 = 4 \text{ cL}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 4 cL de sirop pour 1 L d'eau.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 11 L d'eau.

11 L d'eau, c'est 11 fois 1 L d'eau. Il faut donc 11 fois plus de sirop que 4 cL :

$$4 \text{ cL} \times 11 = 44 \text{ cL}$$

Conclusion : il faut prévoir 44 cL de sirop.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 300 par 50, soit $\frac{300}{50} = 6$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $210 \div 6 = 35$.

Pour la colonne 2, on calcule : $120 \div 6 = 20$.

Grandeur A	35	20	50
Grandeur B	210	120	300

× 6

**EX 1**

Commençons par trouver le prix d'une seule assiette.

Si 9 assiettes coûtent 45 €, alors une seule assiette coûte 9 fois moins cher.

$$45 \text{ €} \div 9 = 5 \text{ €}$$

Conclusion intermédiaire : une seule assiette coûte 5 €.

Cherchons maintenant le prix de 11 assiettes.

11 assiettes, c'est 11 fois plus qu'une seule assiette.

11 assiettes coûtent donc 11 fois plus que 5 €, le prix d'une seule assiette.

$$5 \text{ €} \times 11 = 55 \text{ €}$$

Conclusion : 11 assiettes coûtent 55 €.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 120 par

20, soit $\frac{120}{20} = 6$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $48 \div 6 = 8$.

Pour la colonne 2, on calcule : $15 \times 6 = 90$.

Grandeur A	8	15	20
Grandeur B	48	90	120

) × 6

**EX 1**

Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de médicament pour 1 dL d'eau.

6 dL d'eau, c'est 6 fois 1 dL d'eau. Pour 1 dL d'eau, il faut donc 6 fois moins que 18 mL.

$$18 \text{ mL} \div 6 = 3 \text{ mL}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 3 mL de médicament pour 1 dL d'eau. Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 11 dL d'eau.

11 dL d'eau, c'est 11 fois 1 dL d'eau. Il faut donc 11 fois plus de médicament que 3 mL :

$$3 \text{ mL} \times 11 = 33 \text{ mL}$$

Conclusion : il faut prévoir 33 mL de médicament.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 18 par 9, soit $\frac{18}{9} = 2$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $120 \div 2 = 60$.

Pour la colonne 3, on calcule : $48 \div 2 = 24$.

Grandeur A	60	9	24
Grandeur B	120	18	48

↖ × 2

**EX 1**

Commençons par trouver à combien de km dans la réalité, 1 cm sur la carte correspond.

1 cm, c'est 7 fois moins que 7 cm.

$$21 \text{ km} \div 7 = 3 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : 1 cm sur la carte correspond donc à 3 km dans la réalité.

Cherchons maintenant la distance réelle de son trajet.

11 cm, c'est 11 fois 1 cm.

$$3 \text{ km} \times 11 = 33 \text{ km}$$

Conclusion : son trajet correspond en réalité à une distance de 33 km.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 480 par

80, soit $\frac{480}{80} = 6$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $50 \times 6 = 300$.

Pour la colonne 2, on calcule : $12 \times 6 = 72$.

Grandeur A	50	12	80
Grandeur B	300	72	480

× 6

**EX 1**

Commençons par trouver le prix d'un seul jeu de société.

Si 7 jeux de société coûtent 21€, alors un seul jeu de société coûte 7 fois moins cher.

$$21\text{€} \div 7 = 3\text{€}$$

Conclusion intermédiaire : un seul jeu de société coûte 3€.

Cherchons maintenant le prix de 13 jeux de société.

13 jeux de société, c'est 13 fois plus qu'un seul jeu de société.

13 jeux de société coûtent donc 13 fois plus que 3€, le prix d'un seul jeu de société.

$$3\text{€} \times 13 = 39\text{€}$$

Conclusion : 13 jeux de société coûtent 39€.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 80 par 8, soit $\frac{80}{8} = 10$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $70 \times 10 = 700$.

Pour la colonne 3, on calcule : $15 \times 10 = 150$.

Grandeur A	70	8	15
Grandeur B	700	80	150

× 10

**EX 1**

Commençons par trouver combien de carreaux il faut prévoir pour 1 m².
1 m², c'est 3 fois moins que 3 m².

15 carreaux ÷ 3 = 5 carreaux

Conclusion intermédiaire : on a donc besoin de 5 carreaux pour recouvrir 1 m².

Cherchons maintenant la quantité de carreaux nécessaire pour recouvrir 7 m².

7 m², c'est 7 fois plus que 1 m².

5 carreaux × 7 = 35 carreaux

Conclusion : Nawel aura besoin de 35 carreaux pour recouvrir 7 m².

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 180 par 30, soit $\frac{180}{30} = 6$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 2, on calcule : $35 \times 6 = 210$.

Pour la colonne 3, on calcule : $48 \div 6 = 8$.

Grandeur A	30	35	8
Grandeur B	180	210	48

× 6

**EX 1**

Commençons par trouver le prix d'un seul pack de lait.

Si 9 packs de lait coûtent 36€, alors un seul pack de lait coûte 9 fois moins cher.

$$36\text{€} \div 9 = 4\text{€}$$

Conclusion intermédiaire : un seul pack de lait coûte 4€.

Cherchons maintenant le prix de 11 packs de lait.

11 packs de lait, c'est 11 fois plus qu'un seul pack de lait.

11 packs de lait coûtent donc 11 fois plus que 4€, le prix d'un seul pack de lait.

$$4\text{€} \times 11 = 44\text{€}$$

Conclusion : 11 packs de lait coûtent 44€.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 240 par 40, soit $\frac{240}{40} = 6$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $540 \div 6 = 90$.

Pour la colonne 2, on calcule : $42 \div 6 = 7$.

Grandeur A	90	7	40
Grandeur B	540	42	240

↖ × 6

**EX 1**

Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de sirop pour 1 L d'eau. 7 L d'eau, c'est 7 fois 1 L d'eau. Pour 1 L d'eau, il faut donc 7 fois moins que 28 cL.

$$28 \text{ cL} \div 7 = 4 \text{ cL}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 4 cL de sirop pour 1 L d'eau.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 9 L d'eau.

9 L d'eau, c'est 9 fois 1 L d'eau. Il faut donc 9 fois plus de sirop que 4 cL :

$$4 \text{ cL} \times 9 = 36 \text{ cL}$$

Conclusion : il faut prévoir 36 cL de sirop.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 36 par 9, soit $\frac{36}{9} = 4$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $24 \times 4 = 96$.

Pour la colonne 2, on calcule : $25 \times 4 = 100$.

Grandeur A	24	25	9
Grandeur B	96	100	36

× 4

**EX 1**

Commençons par trouver combien de carreaux il faut prévoir pour 1 m².
1 m², c'est 7 fois moins que 7 m².

21 carreaux ÷ 7 = 3 carreaux

Conclusion intermédiaire : on a donc besoin de 3 carreaux pour recouvrir 1 m².

Cherchons maintenant la quantité de carreaux nécessaire pour recouvrir 10 m².

10 m², c'est 10 fois plus que 1 m².

3 carreaux × 10 = 30 carreaux

Conclusion : Béatrice aura besoin de 30 carreaux pour recouvrir 10 m².

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 400 par 40, soit $\frac{400}{40} = 10$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $25 \times 10 = 250$.

Pour la colonne 2, on calcule : $160 \div 10 = 16$.

Grandeur A	25	16	40
Grandeur B	250	160	400

× 10



EX

1

Commençons par trouver la masse de beurre pour une personne.

7 personnes, c'est 7 fois 1 personne. il faut donc 7 fois moins que 70 g pour 1 personne.

$$70 \text{ g} \div 7 = 10 \text{ g}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 10 g de beurre pour 1 personne.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 9 personnes.

9 personnes, c'est 9 fois 1 personne.

Donc, il faut 9 fois plus que 10 g de beurre que pour 1 personne pour faire sa recette.

$$10 \text{ g} \times 9 = 90 \text{ g}$$

Conclusion : Julie doit utiliser 90 g de beurre pour 9 personnes.

EX

2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 160 par 40, soit $\frac{160}{40} = 4$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $50 \times 4 = 200$.

Pour la colonne 3, on calcule : $28 \div 4 = 7$.

Grandeur A	50	40	7
Grandeur B	200	160	28

× 4

**EX 1**

Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de médicament pour 1 dL d'eau.

9 dL d'eau, c'est 9 fois 1 dL d'eau. Pour 1 dL d'eau, il faut donc 9 fois moins que 36 mL.

$$36 \text{ mL} \div 9 = 4 \text{ mL}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 4 mL de médicament pour 1 dL d'eau. Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 11 dL d'eau.

11 dL d'eau, c'est 11 fois 1 dL d'eau. Il faut donc 11 fois plus de médicament que 4 mL :

$$4 \text{ mL} \times 11 = 44 \text{ mL}$$

Conclusion : il faut prévoir 44 mL de médicament.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 72 par 9, soit $\frac{72}{9} = 8$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 2, on calcule : $128 \div 8 = 16$.

Pour la colonne 3, on calcule : $12 \times 8 = 96$.

Grandeur A	9	16	12
Grandeur B	72	128	96

× 8

**EX 1**

Commençons par trouver le prix d'un seul pack de lait.

Si 7 packs de lait coûtent 21€, alors un seul pack de lait coûte 7 fois moins cher.

$$21\text{€} \div 7 = 3\text{€}$$

Conclusion intermédiaire : un seul pack de lait coûte 3€.

Cherchons maintenant le prix de 13 packs de lait.

13 packs de lait, c'est 13 fois plus qu'un seul pack de lait.

13 packs de lait coûtent donc 13 fois plus que 3€, le prix d'un seul pack de lait.

$$3\text{€} \times 13 = 39\text{€}$$

Conclusion : 13 packs de lait coûtent 39€.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 96 par 12, soit $\frac{96}{12} = 8$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $280 \div 8 = 35$.

Pour la colonne 2, on calcule : $72 \div 8 = 9$.

Grandeur A	35	9	12
Grandeur B	280	72	96

↖ x 8



EX

1

Commençons par trouver la masse de chocolat pour une personne.

11 personnes, c'est 11 fois 1 personne. il faut donc 11 fois moins que 385 g pour 1 personne.

$$385 \text{ g} \div 11 = 35 \text{ g}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 35 g de chocolat pour 1 personne.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 12 personnes.

12 personnes, c'est 12 fois 1 personne.

Donc, il faut 12 fois plus que 35 g de chocolat que pour 1 personne pour faire sa recette.

$$35 \text{ g} \times 12 = 420 \text{ g}$$

Conclusion : Béatrice doit utiliser 420 g de chocolat pour 12 personnes.

EX

2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 400 par

50, soit $\frac{400}{50} = 8$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 2, on calcule : $560 \div 8 = 70$.

Pour la colonne 3, on calcule : $128 \div 8 = 16$.

Grandeur A	50	70	16
Grandeur B	400	560	128

× 8

**EX 1**

Commençons par trouver quelle est la distance parcourue en 1h.

1 h, c'est 3 fois moins que 3 h. En 1 h, le piéton parcourt donc une distance 3 fois moins grande qu'en 3 h.

$$12 \text{ km} \div 3 = 4 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : en 1h, le piéton parcourt 4 km.

Cherchons maintenant la distance parcourue en 7 h.

7 h, c'est 7 fois 1 h. Le piéton parcourt donc 7 fois plus de distance qu'en 1 h.

$$4 \text{ km} \times 7 = 28 \text{ km}$$

Conclusion : le piéton parcourra en moyenne 28 km en 7 h.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 240 par

40, soit $\frac{240}{40} = 6$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $30 \times 6 = 180$.

Pour la colonne 3, on calcule : $144 \div 6 = 24$.

Grandeur A	30	40	24
Grandeur B	180	240	144

× 6

**EX 1**

Commençons par trouver à combien de km dans la réalité, 1 cm sur la carte correspond.

1 cm, c'est 3 fois moins que 3 cm.

$$12 \text{ km} \div 3 = 4 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : 1 cm sur la carte correspond donc à 4 km dans la réalité.

Cherchons maintenant la distance réelle de son trajet.

11 cm, c'est 11 fois 1 cm.

$$4 \text{ km} \times 11 = 44 \text{ km}$$

Conclusion : son trajet correspond en réalité à une distance de 44 km.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 72 par 12, soit $\frac{72}{12} = 6$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $16 \times 6 = 96$.

Pour la colonne 3, on calcule : $10 \times 6 = 60$.

Grandeur A	16	12	10
Grandeur B	96	72	60

× 6

**EX 1**

Commençons par trouver le prix d'un seul pot de cancoillotte.

Si 9 pots de cancoillotte coûtent 27€, alors un seul pot de cancoillotte coûte 9 fois moins cher.

$$27\text{€} \div 9 = 3\text{€}$$

Conclusion intermédiaire : un seul pot de cancoillotte coûte 3€.

Cherchons maintenant le prix de 12 pots de cancoillotte.

12 pots de cancoillotte, c'est 12 fois plus qu'un seul pot de cancoillotte.

12 pots de cancoillotte coûtent donc 12 fois plus que 3€, le prix d'un seul pot de cancoillotte.

$$3\text{€} \times 12 = 36\text{€}$$

Conclusion : 12 pots de cancoillotte coûtent 36€.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 320 par 40, soit $\frac{320}{40} = 8$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 2, on calcule : $200 \div 8 = 25$.

Pour la colonne 3, on calcule : $12 \times 8 = 96$.

Grandeur A	40	25	12
Grandeur B	320	200	96

× 8

**EX 1**

Commençons par trouver à combien de km dans la réalité, 1 cm sur la carte correspond.

1 cm, c'est 6 fois moins que 6 cm.

$$12 \text{ km} \div 6 = 2 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : 1 cm sur la carte correspond donc à 2 km dans la réalité.

Cherchons maintenant la distance réelle de son trajet.

13 cm, c'est 13 fois 1 cm.

$$2 \text{ km} \times 13 = 26 \text{ km}$$

Conclusion : son trajet correspond en réalité à une distance de 26 km.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 18 par

$$3, \text{ soit } \frac{18}{3} = 6.$$

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 2, on calcule : $16 \times 6 = 96$.

Pour la colonne 3, on calcule : $7 \times 6 = 42$.

Grandeur A	3	16	7
Grandeur B	18	96	42

× 6

**EX 1**

Commençons par trouver à combien de km dans la réalité, 1 cm sur la carte correspond.

1 cm, c'est 7 fois moins que 7 cm.

$$35 \text{ km} \div 7 = 5 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : 1 cm sur la carte correspond donc à 5 km dans la réalité.

Cherchons maintenant la distance réelle de son trajet.

13 cm, c'est 13 fois 1 cm.

$$5 \text{ km} \times 13 = 65 \text{ km}$$

Conclusion : son trajet correspond en réalité à une distance de 65 km.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 640 par 80, soit $\frac{640}{80} = 8$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $60 \times 8 = 480$.

Pour la colonne 2, on calcule : $70 \times 8 = 560$.

Grandeur A	60	70	80
Grandeur B	480	560	640

× 8

**EX 1**

Commençons par trouver combien de carreaux il faut prévoir pour 1 m².
1 m², c'est 6 fois moins que 6 m².

30 carreaux ÷ 6 = 5 carreaux

Conclusion intermédiaire : on a donc besoin de 5 carreaux pour recouvrir 1 m².

Cherchons maintenant la quantité de carreaux nécessaire pour recouvrir 7 m².

7 m², c'est 7 fois plus que 1 m².

5 carreaux × 7 = 35 carreaux

Conclusion : Nawel aura besoin de 35 carreaux pour recouvrir 7 m².

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 500 par 50, soit $\frac{500}{50} = 10$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $60 \times 10 = 600$.

Pour la colonne 2, on calcule : $80 \div 10 = 8$.

Grandeur A	60	8	50
Grandeur B	600	80	500

× 10

**EX 1**

Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de produit pour piscine pour 1 dizaine de mètres cubes d'eau.

7 dizaines de mètres cubes d'eau, c'est 7 fois 1 dizaine de mètres cubes d'eau. Pour 1 dizaine de mètres cubes d'eau, il faut donc 7 fois moins que 28 L.

$$28 \text{ L} \div 7 = 4 \text{ L}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 4 L de produit pour piscine pour 1 dizaine de mètres cubes d'eau.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 8 dizaines de mètres cubes d'eau.

8 dizaines de mètres cubes d'eau, c'est 8 fois 1 dizaine de mètres cubes d'eau. Il faut donc 8 fois plus de produit pour piscine que 4 L :

$$4 \text{ L} \times 8 = 32 \text{ L}$$

Conclusion : il faut prévoir 32 L de produit pour piscine.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 56 par 7, soit $\frac{56}{7} = 8$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 2, on calcule : $25 \times 8 = 200$.

Pour la colonne 3, on calcule : $60 \times 8 = 480$.

Grandeur A	7	25	60
Grandeur B	56	200	480

) × 8

**EX 1**

Commençons par trouver le prix d'un seul paquet de pâtes.

Si 9 paquets de pâtes coûtent 27 €, alors un seul paquet de pâtes coûte 9 fois moins cher.

$$27 \text{ €} \div 9 = 3 \text{ €}$$

Conclusion intermédiaire : un seul paquet de pâtes coûte 3 €.

Cherchons maintenant le prix de 13 paquets de pâtes.

13 paquets de pâtes, c'est 13 fois plus qu'un seul paquet de pâtes.

13 paquets de pâtes coûtent donc 13 fois plus que 3 €, le prix d'un seul paquet de pâtes.

$$3 \text{ €} \times 13 = 39 \text{ €}$$

Conclusion : 13 paquets de pâtes coûtent 39 €.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 200 par 20, soit $\frac{200}{20} = 10$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $700 \div 10 = 70$.

Pour la colonne 2, on calcule : $160 \div 10 = 16$.

Grandeur A	70	16	20
Grandeur B	700	160	200

× 10

**EX 1**

Commençons par trouver combien de carreaux il faut prévoir pour 1 m².
1 m², c'est 12 fois moins que 12 m².

60 carreaux ÷ 12 = 5 carreaux

Conclusion intermédiaire : on a donc besoin de 5 carreaux pour recouvrir 1 m².

Cherchons maintenant la quantité de carreaux nécessaire pour recouvrir 13 m².

13 m², c'est 13 fois plus que 1 m².

5 carreaux × 13 = 65 carreaux

Conclusion : Marina aura besoin de 65 carreaux pour recouvrir 13 m².

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 90 par 9, soit $\frac{90}{9} = 10$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $500 \div 10 = 50$.

Pour la colonne 2, on calcule : $150 \div 10 = 15$.

Grandeur A	50	15	9
Grandeur B	500	150	90

× 10

**EX 1**

Commençons par trouver quelle est la distance parcourue en 1h.
1 h, c'est 3 fois moins que 3 h. En 1 h, le camion parcourt donc une distance 3 fois moins grande qu'en 3 h.

$$225 \text{ km} \div 3 = 75 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : en 1h, le camion parcourt 75 km.

Cherchons maintenant la distance parcourue en 4 h.

4 h, c'est 4 fois 1 h. Le camion parcourt donc 4 fois plus de distance qu'en 1 h.

$$75 \text{ km} \times 4 = 300 \text{ km}$$

Conclusion : le camion parcourra en moyenne 300 km en 4 h.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 280 par 35, soit $\frac{280}{35} = 8$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $400 \div 8 = 50$.

Pour la colonne 3, on calcule : $24 \div 8 = 3$.

Grandeur A	50	35	3
Grandeur B	400	280	24

× 8

**EX 1**

Commençons par trouver le prix d'un seul phasme.

Si 11 phasmes coûtent 33€, alors un seul phasme coûte 11 fois moins cher.

$$33\text{€} \div 11 = 3\text{€}$$

Conclusion intermédiaire : un seul phasme coûte 3€.

Cherchons maintenant le prix de 12 phasmes.

12 phasmes, c'est 12 fois plus qu'un seul phasme.

12 phasmes coûtent donc 12 fois plus que 3€, le prix d'un seul phasme.

$$3\text{€} \times 12 = 36\text{€}$$

Conclusion : 12 phasmes coûtent 36€.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 36 par 9, soit $\frac{36}{9} = 4$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $240 \div 4 = 60$.

Pour la colonne 2, on calcule : $200 \div 4 = 50$.

Grandeur A	60	50	9
Grandeur B	240	200	36

× 4



EX

1

Commençons par trouver quelle est la distance parcourue en 1h.

1 h, c'est 3 fois moins que 3 h. En 1 h, le piéton parcourt donc une distance 3 fois moins grande qu'en 3 h.

$$15 \text{ km} \div 3 = 5 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : en 1h, le piéton parcourt 5 km.

Cherchons maintenant la distance parcourue en 5 h.

5 h, c'est 5 fois 1 h. Le piéton parcourt donc 5 fois plus de distance qu'en 1 h.

$$5 \text{ km} \times 5 = 25 \text{ km}$$

Conclusion : le piéton parcourra en moyenne 25 km en 5 h.

EX

2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 48 par

8, soit $\frac{48}{8} = 6$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $90 \times 6 = 540$.

Pour la colonne 2, on calcule : $300 \div 6 = 50$.

Grandeur A	90	50	8
Grandeur B	540	300	48

× 6

**EX 1**

Commençons par trouver quelle est la distance parcourue en 1h.
1 h, c'est 7 fois moins que 7 h. En 1 h, le train parcourt donc une distance 7 fois moins grande qu'en 7 h.

$$875 \text{ km} \div 7 = 125 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : en 1h, le train parcourt 125 km.

Cherchons maintenant la distance parcourue en 8 h.

8 h, c'est 8 fois 1 h. Le train parcourt donc 8 fois plus de distance qu'en 1 h.

$$125 \text{ km} \times 8 = 1000 \text{ km}$$

Conclusion : le train parcourra en moyenne 1000 km en 8 h.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 72 par 9, soit $\frac{72}{9} = 8$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 2, on calcule : $7 \times 8 = 56$.

Pour la colonne 3, on calcule : $64 \div 8 = 8$.

Grandeur A	9	7	8
Grandeur B	72	56	64

× 8

**EX 1**

Commençons par trouver la masse de sucre pour une personne.

11 personnes, c'est 11 fois 1 personne. il faut donc 11 fois moins que 330 g pour 1 personne.

$$330 \text{ g} \div 11 = 30 \text{ g}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 30 g de sucre pour 1 personne.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 13 personnes.

13 personnes, c'est 13 fois 1 personne.

Donc, il faut 13 fois plus que 30 g de sucre que pour 1 personne pour faire sa recette.

$$30 \text{ g} \times 13 = 390 \text{ g}$$

Conclusion : Manon doit utiliser 390 g de sucre pour 13 personnes.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 64 par 8, soit $\frac{64}{8} = 8$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 2, on calcule : $280 \div 8 = 35$.

Pour la colonne 3, on calcule : $200 \div 8 = 25$.

Grandeur A	8	35	25
Grandeur B	64	280	200

× 8

**EX 1**

Commençons par trouver quelle est la distance parcourue en 1h.

1 h, c'est 12 fois moins que 12 h. En 1 h, le train parcourt donc une distance 12 fois moins grande qu'en 12 h.

$$2340 \text{ km} \div 12 = 195 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : en 1h, le train parcourt 195 km.

Cherchons maintenant la distance parcourue en 13 h.

13 h, c'est 13 fois 1 h. Le train parcourt donc 13 fois plus de distance qu'en 1 h.

$$195 \text{ km} \times 13 = 2535 \text{ km}$$

Conclusion : le train parcourra en moyenne 2535 km en 13 h.

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 192 par

24, soit $\frac{192}{24} = 8$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $72 \div 8 = 9$.

Pour la colonne 2, on calcule : $160 \div 8 = 20$.

Grandeur A	9	20	24
Grandeur B	72	160	192

× 8

**EX 1**

Commençons par trouver combien de carreaux il faut prévoir pour 1 m².
1 m², c'est 7 fois moins que 7 m².

28 carreaux ÷ 7 = 4 carreaux

Conclusion intermédiaire : on a donc besoin de 4 carreaux pour recouvrir 1 m².

Cherchons maintenant la quantité de carreaux nécessaire pour recouvrir 12 m².

12 m², c'est 12 fois plus que 1 m².

4 carreaux × 12 = 48 carreaux

Conclusion : Aude aura besoin de 48 carreaux pour recouvrir 12 m².

EX 2

a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 60 par 15, soit $\frac{60}{15} = 4$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $35 \times 4 = 140$.

Pour la colonne 3, on calcule : $12 \times 4 = 48$.

Grandeur A	35	15	12
Grandeur B	140	60	48

× 4