


EX
1

1. Les points A' , Z' et Q' sont les images respectives de A , Z et Q par la translation qui transforme F en D .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[AZ]$ et passe par le point Q .


Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme F en D en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



2. Les points X' et D' sont les images respectives de X et D par la translation qui transforme W en L .

L'angle $\widehat{XDQ}$ mesure 73° .


Compléter l'image du triangle XDQ par la translation qui transforme W en L en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.




3. Les points G' , N' et D' sont les images respectives de G , N et D par la translation qui transforme L en A .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[GN]$ et passe par le point D .


Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme L en A en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



4. Les points D' et E' sont les images respectives de D et E par la translation qui transforme B en A .
 L'angle $\widehat{DEI}$ mesure 95° .
 Compléter l'image du triangle DEI par la translation qui transforme B en A en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.




5. Les points I' et A' sont les images respectives de I et A par la translation qui transforme P en L .
 L'angle $\widehat{IAM}$ mesure 55° .
 Compléter l'image du triangle IAM par la translation qui transforme P en L en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.



6. Les points L' , R' et E' sont les images respectives de L , R et E par la translation qui transforme Y en I .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[LR]$ et passe par le point E .

Compléter l'image de la droite (d_1) par la translation qui transforme Y en I en utilisant les propriétés de conservation de la translation et en justifiant ses démarches.





EX


1

1. Les points A' , Z' et Q' sont les images respectives de A , Z et Q par la translation qui transforme F en D .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[AZ]$ et passe par le point Q .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[A'Z']$ et passe par le point Q' .





2. Les points X' et D' sont les images respectives de X et D par la translation qui transforme W en L .

L'angle $\widehat{XDQ}$ mesure 73° .




Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{X'D'Q'}$ mesure lui aussi 73° .

Le segment $[DQ]$ mesure 4 cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[D'Q']$ mesure lui aussi 4 cm.






3. Les points G' , N' et D' sont les images respectives de G , N et D par la translation qui transforme L en A .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[GN]$ et passe par le point D .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[G'N']$ et passe par le point D' .





4. Les points D' et E' sont les images respectives de D et E par la translation qui transforme B en A .

L'angle $\widehat{DEI}$ mesure 95° .




Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{D'E'I'}$ mesure lui aussi 95° .

Le segment $[EI]$ mesure $4,1$ cm.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[E'I']$ mesure lui aussi $4,1$ cm.





5. Les points I' et A' sont les images respectives de I et A par la translation qui transforme P en L .

L'angle $\widehat{IAM}$ mesure 55° .




Or, la translation conserve les angles.

Donc l'angle $\widehat{I'A'M'}$ mesure lui aussi 55° .

Le segment $[AM]$ mesure $4,4\text{ cm}$.

Or, la translation conserve les longueurs.

Donc le segment $[A'M']$ mesure lui aussi $4,4\text{ cm}$.





6. Les points L' , R' et E' sont les images respectives de L , R et E par la translation qui transforme Y en I .

La droite (d_1) est parallèle au segment $[LR]$ et passe par le point E .

Or, la translation conserve le parallélisme.

Donc la droite (d'_1) est parallèle au segment $[L'R']$ et passe par le point E' .

