

EX
1

1. En juin 2003, à Rome, on a relevé les températures suivantes.

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	23	24	24	26	28	28	29	28	26	27	26	27	29	28	30

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	28	27	28	29	27	25	27	26	28	30	30	28	30	30	30

Calculer la fréquence de la température 30°C.

2. En janvier 1980, à Bruxelles, on a relevé les températures suivantes.

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	6	7	9	8	10	9	10	8	6	4	6	5	6	5	7	7

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	9	9	11	12	13	15	17	18	18	16	16	16	16	17	16

Calculer la fréquence de la température 8°C.

3. En février 2002, à Rome, on a relevé les températures suivantes.


Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Température en °C	2	0	2	2	1	1	2	2	3	2	2	3	4	5

Jour	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Température en °C	6	6	8	8	10	11	9	7	9	8	6	6	4	2

Calculer la fréquence de la température 11°C.

EX
2

Dans le parc naturel de Swordbreak, il y a des animaux. Certains sont des quadrupèdes (servals, hyènes, guépards), et d'autres sont des oiseaux (vautours, hérons). Voici un diagramme en barres qui donne le nombre d'individus pour chaque espèce.



a. Quel est l'effectif des servals?

b. Calculer la fréquence des hyènes. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage arrondi, si besoin, à 0,1% près.

c. Calculer l'effectif des quadrupèdes.

d. Calculer la fréquence des oiseaux. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage arrondi, si besoin, à 0,1% près.

EX
1

1. En juin 2003, à Paris, la température 30°C a été relevée 6 fois.
Il y a 30 jours ce mois-ci.
La fréquence de la température 30°C est :
 $\frac{6}{30} = 0,2$
Soit 20 %.
2. En janvier 1980, à Berlin, la température 8°C a été relevée 2 fois.
Il y a 31 jours ce mois-ci.
La fréquence de la température 8°C est :
 $\frac{2}{31} \approx 0,065$
Soit environ 6,5 %.
3. En février 2002, à Moscou, la température 11°C a été relevée 1 fois.
Il y a 28 jours ce mois-ci.
La fréquence de la température 11°C est :
 $\frac{1}{28} \approx 0,036$
Soit environ 3,6 %.

EX
2

1. a. **D'après le graphique, il y a 6 servals.**
b. L'effectif total des animaux est : $6 + 9 + 5 + 3 + 2 = 25$. D'après le graphique, il y a 9 hyènes.
La fréquence (ou la proportion) de hyènes est : $\frac{9}{25} = 0,36$.
La fréquence des hyènes est donc : 36%.
c. On fait la somme des effectifs de chaque espèce de quadrupèdes : $6 + 9 + 5$.
L'effectif des quadrupèdes est donc : 20.
d. L'effectif total des oiseaux est : $3 + 2 = 5$. L'effectif total des animaux est : 25.
La fréquence (ou la proportion) d'oiseaux est : $\frac{5}{25} = 0,2$.
La fréquence des oiseaux est donc : 20%.