Addendum N°1: mediana sin ningún riego y malla antimaleza

Complementa la Respuesta a consultas N°1 (Rev. C). Se emite **Rev. D** de L-01, L-02, DWG y DXF · 28 de octubre de 2026

1. Opción sin ningún riego para la mediana S/R

La Rev. C dejaba la mediana con 4 especies de secano que necesitaban 2 años de riego manual de establecimiento. La Rev. D elimina todo riego: la mediana pasa a ser un **jardín mineral** de gravilla natural y rocas del sitio, con sólo las dos especies que pueden establecerse con la lluvia de Tongoy.



Figura 1. Mediana S/R en L-01 Rev. D.

Especie	Alt.	Por qué sobrevive sin riego	Cant.
Copiapoa coquimbana (CC) · cactácea endémica de la costa de Atacama-Coquimbo	0,3 m	Vive en forma natural sólo de lluvia y neblina; acumula agua en el tallo	14
Alstroemeria magnifica (AM) · lirio del campo, endémica	0,6-0,8 m	Geófita: rebrota con las lluvias de invierno y pasa el verano en reposo bajo tierra	19

Grupos de 2-3 plantas alternados con tramos de gravilla; Copiapoa en los extremos (lo más bajo, por visibilidad) y a 0,25 m o más del borde. Cobertura desarrollada ~28 %; el resto es gravilla de 10 cm y rocas sueltas del sitio (15-40 cm, semienterradas, §3.3.7).

Condiciones para que funcione sin regar

- **Plantar con la lluvia, no con manguera.** Copiapoa entre marzo y mayo; el lirio en mayo-junio, después de la primera lluvia de 5-10 mm. Plantar fuera de esa ventana obliga a regar.
- **Plantas de vivero bien enraizadas:** Copiapoa en maceta de 10-14 cm (de semilla, con respaldo de origen) y lirio en bolsa, ambos aclimatados a pleno sol.
- **Hoyaduras:** Copiapoa con 50 % de arena gruesa o gravilla de 3-6 mm, 40 % de suelo del sitio y 10 % de compost, plantada en montículo con el cuello 3-5 cm sobre el nivel terminado; lirio con suelo del sitio y 20 % de compost (§3.2.3.4).
- **Opcional:** si al plantar no ha llovido, un único riego de asentamiento con bidón (2-3 L por lirio; nada a los cactus). El diseño no depende de él.
- **Pérdidas esperables:** en un año muy seco puede perderse parte de los lirios, que vuelven a brotar si el rizoma sobrevive. Lo que muera se repone en otoño, también sin riego.

Comparación con la Rev. C y cumplimiento

	Rev. C (secano con riego de establecimiento)	Rev. D (sin ningún riego)
Especies / plantas	4 / 53	2 / 33
Cobertura desarrollada	60 %	~28 %
Riego	Manual 2 años (~4 m³) + contingencia	Ninguno
Aspecto	Franja vegetada continua, florida en primavera	Gravilla con acentos de cactus; lirio florido sep-nov y sin follaje en verano
Desviaciones del Manual	Riego manual (cap. 4)	2 especies en vez de 4 (§3.3.2) y cobertura bajo el ~60 % (§3.2.2)

La Rev. D cambia una desviación por otra: elimina el riego, pero queda con menos especies y menos cobertura de lo que pide el Manual, que además prioriza vegetación por sobre superficies sólo de gravilla cuando hay poca agua (§3.2.2). En un sector de 16,8 m² sin agua es una excepción razonable, pero **debe validarla COPEC** (§1.4). El resto del

proyecto queda igual que en la Rev. C.

2. ¿Seguro que no se necesita malla antimaleza?

Es razonable la duda: en Chile la malla bajo la gravilla es práctica habitual, y el estándar de licitación de COPEC de julio de 2025 la exigía bajo todos los áridos. La respuesta precisa es esta:

- **Qué dice el Manual.** La versión vigente (25/09/2026) no prohíbe la malla con esas palabras. Pide coberturas permeables que no sellen el suelo (§3.2.2.3), suelo vivo (§3.2.3) y regeneración espontánea de especies compatibles (§6.1.7). Una versión de trabajo anterior (14/09/2026, §3.3.7) sí lo decía: "No se incorporará geotextil como solución estándar", porque en terreno el desplazamiento de la gravilla lo deja expuesto. La recomendación de no usarla es, por lo tanto, una decisión de diseño coherente con el Manual, no una cita textual de la versión vigente.
- **Lo que la malla sí hace bien:** reduce las malezas los primeros 1-2 años y evita que la gravilla se hunda en el suelo.
- **Por qué no conviene en los jardines plantados:** el polvo del maicillo y de la ruta se deposita sobre ella y en 1-2 años las malezas crecen encima, enraizadas en la malla; no detiene kikuyo ni correhuela; impide que los cubresuelos (verbena, hierba del salitre) enraícen y que las nativas se autosiembren; hay que cortarla en cada planta, gotero y reposición, y las malezas salen justo por esos cortes; donde la gravilla se adelgaza queda a la vista.
- **Lo que la reemplaza:** retirar las malezas perennes con raíz y hacer una falsa siembra antes de instalar, poner la gravilla en capa continua de 10 cm y hacer la revisión mensual de la Tabla 20.

Excepción razonable: la mediana sin riego de la Rev. D. Ahí casi todo es gravilla, no hay cubresuelos que deban enraizar y la presión de malezas es baja (sin riego, sólo nacen con la lluvia). Si COPEC lo prefiere, en ese sector se puede usar un **geotextil no tejido permeable** (no la malla tejida de polipropileno), calado en cada planta y cubierto por los 10 cm de gravilla, que queda contenida entre soleras. En el resto del jardín se mantiene sin malla.