- ♦ 전체 : 선택형 15문항(70점), 서답형 5문항(30점)
- ♦ 배점 : 문항 옆에 배점 표시
- ♦ 선택형은 답안 카드에 컴퓨터용 사인펜으로 정확히 마킹하 고, 서답형은 반드시 검정볼펜으로 기입하시오.

선택형

- 1. 중심의 좌표가 (3, -4) 이고 반지름의 길이가 3인 원의 방정식을 구하면? [3.2점]
 - (1) $x^2 + y^2 + 6x 8y + 16 = 0$
 - (2) $x^2 + y^2 6x + 8y + 16 = 0$
 - (3) $x^2 + y^2 + 3x 4y + 16 = 0$
 - $4 x^2 + y^2 3x + 4y + 16 = 0$
 - (5) $(x+3)^2 (y-4)^2 = 9$

- **2.** 사차방정식 $x^4 2x^2 15 = 0$ 의 모든 해의 곱을 구하면? [3.3점]
 - (T) 15
- (2) 2
- (3) 0
- (4) -2
- (5) -15

- **4.** 두 점 A(-2, -3), B(1, -8) 을 지나는 직선의 방정식을 구하면? [3.5점]
 - (1) 5x + 3y + 19 = 0
 - (2) 5x 3y + 1 = 0
 - (3) 3x + 5y + 37 = 0
 - (4) 3x 5y 9 = 0
 - (5) 5x 3y 29 = 0

- **5.** 연립부등식 -5 < x 3 < -x + 9 의 해를 구하면? [3.7] 점]
 - (1) -3 < x < 4
- (2) -2 < x < 5
- (3) -2 < x < 6
- (4) -3 < x < 6
- (5) -4 < x < 6

- 3. 점 (1,-5) 를 지나고 기울기가 -2인 직선의 방정식을 구하면? [3.4점]

 - (1) y = 2x 7 (2) y = 2x + 5
- (3) y = -2x 3
- (4) y = -2x + 1 (5) y = -2x + 3

- **6.** 다음 직선 $\frac{1}{5}$ $\frac{1$ [3.9점]
 - (1) 4 = 2x + 4
- ② 직선 4x 6y + 5 = 0
- ③ 점 (-1,3) 을 지나고 기울기가 $\frac{3}{2}$ 인 직선
- ④ 두 점 (5,2), (-1,6) 을 지나는 직선
- (5) 점 (1,4) 를 지나고 $y = \frac{2}{3}x 2$ 와 수직인 직선

- 7. 부등식 $|x-10| < \frac{7}{4}a 15$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 자연수 a의 개수를 구하면? [4.5점]
 - $8(\Gamma)$
- (2) 9
- ③ 10
- **(4)** 11
- (5) 12

- 8. 세 점 A(3,5), B(-5,11), C(9,13) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA 의 중점을 각각 P,Q,R이라 하자. 삼각형 PQR의 무게중심의 좌표를 G(a,b)라 할 때, a+b 의 값을 구하면? [4.9점]

- ① $\frac{37}{3}$ ② 12 ③ $\frac{35}{3}$ ④ $\frac{34}{3}$

- 9. 연립부등식 $\begin{cases} x^2 2x 3 \ge 0 \\ x^2 (2+a)x + 2a < 0 \end{cases}$ 을 동시에 만 족시키는 정수 x가 -1 뿐일 때, 실수 a의 값의 범위를
- 구하면? [5.0점]
- (1) $-1 \le a \le 0$ (2) $-1 \le a < 0$ (3) $-2 \le a \le -1$
- (4) $-2 \le a < -1$ (5) $-2 < a \le -1$

10. 다음은 수직선 위의 두 점 A, B 에 대하여 선분 AB를 m: n (m > n > 0) 으로 내분하는 점을 P, 외분하는 점을 Q라 할 때, 선분 \overline{AP} , \overline{AQ} , \overline{AB} 의 관계를 설명한 것이다.

_ <설 명> .

두 점 A, B = A(a), B(b) (a < b) 라 하면

선분 AB를 m:n 으로 내분하는 점 P의 좌표는 $\frac{mb+na}{m+n}$, 선분 AB를 m:n 으로 내분하는 점 Q의 좌표는 $\frac{mb-na}{m-n}$ 이다.

이때, $\overline{AP} = (7)$ 이고, $\overline{AQ} = (4)$ 이다. 그러므로 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{\overline{AP}} + \frac{1}{\overline{AQ}} = \boxed{(\Box)}$$

위 설명에서 (가), (나), (다) 에 들어갈 식으로 알맞은 것은? [5.0점]

- (가)
- (나)
- (다)

- m(b-a)(1)m+n
- m(b-a)m-n

m(b-a)m+n

m(b-a)

m(b-a)m-n

n(b-a)

 $\overline{b-a}$

- m+nn(b-a)m+n
- m-nm(b-a)m-n

- n(b-a)m+n
- n(b-a)
- 11. 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 4x + b = 0$ 의 한 근이 3 + i 일 때, 나머지 두 근의 곱을 구하면? (단, a,b는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$ 이다.) [5.5점]
- (1) 9-3i (2) 6-2i (3) -6+2i (4) 3-i

- (5) -3 + i

- **12.** 삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라고 하고, **15.** 점 P(2,-1) 에서 직선 3x-4y+1+k(x-2y)=0[5.5점]

- ① $5\sqrt{2}$ ② $\sqrt{51}$ ③ $2\sqrt{13}$ ④ $\sqrt{53}$ ⑤ $3\sqrt{6}$
- $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{AM} = 7$ 일 때, \overline{AC} 의 길이를 구하면? 까지의 거리가 최대가 되도록 하는 실수 k값을 구하면? [5.7점]
 - ① $-\frac{21}{11}$ ② $-\frac{18}{11}$ ③ $-\frac{15}{11}$ ④ $-\frac{12}{11}$ ⑤ $-\frac{9}{11}$

- **13.** 사차방정식 $x^4 + 3x^3 + 4x^2 + x 10 = 0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, $\omega^3 + \omega^2 + 3\omega$ 의 값을 구하면? [5.6점]
- (1) 2
- (2) 3 (3) 4

- **(4)** 5 **(5)** 6

- **14.** 두 점 A(-1,-2), B(2,-1) 을 이은 선분 AB 의 연장선 위의 점 C에 대하여 $5\overline{AB} = 3\overline{AC}$ 일 때, 점 C(p,q)의 좌표를 구하면? (단, *p* > -1) [6.3점]

- $\textcircled{4}\left(\frac{13}{2},\frac{1}{2}\right) \qquad \qquad \textcircled{5}\left(4,-\frac{1}{3}\right)$

단답형 1. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=4 \\ & \text{의 모든 해를 구하} \\ xy=-5 \end{cases}$ 시오. [4점]

단답형 2. <보기>의 점 A,B,C 에 대하여 $\angle ABC$ 의 이등 분선의 방정식을 구하시오. [6점]

A(0,6), B(3,4), C(-1,10)

행하고, 직선 ax + by + 3 = 0에 수직이다. 실수 a, b 값을 는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오. (변의 길 각각 구하시오. [5점]

서술형 1. 직선 3x-2y-4=0은 직선 -6x+ay=0에 평 **서술형 3.** 세 점 A(2,6), B(8,8), C(4,4) 를 꼭짓점으로 하 이나 각의 크기에 대한 내용을 모두 언급할 것) [7점]

서술형 2. 부등식 |x-1|+|2x+5| > 5 를 푸시오. [8점]