- ♦ 전체 : 선택형 15문항(70점), 서답형 6문항(30점)
- ♦ 배점 : 문항 옆에 배점 표시
- ♦ 선택형은 답안 카드에 컴퓨터용 사인펜으로 정확히 마킹하고, 서 답형은 반드시 검정볼펜으로 기입하시오.

선택형

1. 세 다항식

 $A = 2x^2 - 4x - 2$, B = 3x + 3, $C = -3x^2 + 5$


에 대하여 A + (B - 2C)를 간단히 한 것은? [3점]

- (1) $8x^2 5$
- ② $8x^2 x 5$ ③ $8x^2 x 9$
- (4) $8x^2 + 7 9$ (5) $8x^2 + 7 5$

- 2. $\frac{2-i}{1+2i}$ = a+bi의 꼴로 옳게 나타낸 것은? (단, a,b,는 실수이다.) [4점]

 - (1) -i (2) -i+1 (3) i-2 (4) 2i-1 (5) 2i+2

4. 다음은 다항식을 나누는 과정이다. 상수 $\frac{b}{a}$ 의 값은? (단, *a*, *b*는 상수이다.) [4점]



- \bigcirc 7
- (2)8
- (3)9
- **4**) 10
- (5) 11

- **5.** 이차함수 $y = -x^2 + 2x + k$ 의 그래프와 x축이 한 점에서 만날 때 실수 *k*의 값은? [4.5점]
- (1) -2 (2) -1 (3) 0
- (4) 1
- (5) 2

6. *x*의 값에 관계없이 등식

$$3x^2 + x + a = b(x-1)(x+1) + c(x+1)$$

가 항상 성립할 때, 상수 a,b,c에 대하여 a+b+c의 값은? [4.7 점]

- (1) -2 (2) -1 (3) 0

- (4)1
- (5) 2

- **3.** $\sqrt{-2}\sqrt{-2} + \sqrt{6}\sqrt{-6} + \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{-4}} = a + bi$ 일 때, 실수 a,b에 대하여 a+b의 값은?[4.5점]
- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8
- (5)10

각각의 세 다항식의 합이 $3x^2 - 6x + 9$ 와 같도록 나머지 칸에 넣으려 할 때, (r) 에 알맞은 다항식은 f(x)이다. 이때, f(1)의 값은? [4.7점]



- ①6
- 2)7
- 3 8
- **4** 9
- **(5)** 10

- 8. 다음 중 $x^4 + 3x^3 3x^2 11x 6$ 의 인수인 것은? [4.8점]
- (1) x (2) x-1 (3) x+2
- (4) x + 3 (5) x 3

- 7. 세 다항식 $2x^3 + 3x^2 + 5$, $x^2 2x + 3$, $-x^2 + x + 3$ 을 그림과 같 9. 이차함수 $y = 2x^2 + 3x m$ 의 그래프는 직선 y = 5x 3이 한 칸에 하나씩 써 넣었다. 가로, 세로, 대각선으로 배열된 | 과 만나지 않고, 직선 y = -x - 1과는 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 m의 값의 범위가 a < x < b일 때, 상수 a,b에 대하여 *a* + *b*의 값은? [4.8점]
- $\bigcirc -\frac{1}{2}$ $\bigcirc 0$ $\bigcirc \frac{1}{2}$ $\bigcirc 1$
- $(5) \frac{3}{2}$

- **10.** 이차방정식 $x^2 + 2x 4 = 0$ 의 서로 다른 두근을 α, β 라고 할 때, $\frac{1}{\alpha^2+3\alpha}+\frac{1}{\beta^2+3\beta}$ 의 값은 $\frac{p}{q}$ 이다. p+q의 값은? (단, *p*, *q*는 서로소인 자연수이다.) [5점]
- (I) 3
- **(2)** 5 **(3)** 7
- (4)9
- **(5)** 11

- 10일 때, 양수 *a*의 값은? [4.9점]
- (1) $\sqrt{3}$ (2) $\sqrt{6}$
- ③3
- (4) $2\sqrt{3}$ (5) $\sqrt{15}$
- 11. $-a \le x \le a$ 에서 이차함수 $y = 3x^2 2ax 5$ 의 최댓값이 13. 상수 a, b, c에 대하여 이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 는 $x = ax^2 + bx + c$ 2에 대하여 대칭이고 f(-1) < f(1)을 만족하고, 함수 g(x) = $cx^2 + bx + a$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은? [5.2점]

____ <보기>_

- $\neg . f(3) > f(4)$
- L. f(x) = 0의 두 근이 α, β 이면 g(x) = 0의 두근은 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$ 이다.
- \Box . 모든 실수 x에 대하여 f(x) < k인 k가 존재한다.
- ① 7
- 2) L
- 3) 7, L

- (4) L, T (5) 7, L, T

- **12.** 이차함수 y = f(x)의 그래프가 x축과 만나고, f(1) = f(5)를 만족할 때, f(x) = 0의 두 실근의 곱의 최댓값은? [5점]

- ① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13
- (5)15

14. 다항식 P(x)를 5x + 2로 나누었을 때의 몫을 Q(x), 나머지를 R라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은? [5.4점]

<보기>

- ㄱ. xP(x)를 $x + \frac{2}{5}$ 로 나누었을 때의 몫은 5xQ(x) + R이다. ㄴ. $x^2P(x)$ 를 $x + \frac{2}{5}$ 로 나누었을 때의 몫은 $5x^2Q(x) + Rx - \frac{2}{5}R$ 이다.
- ㄷ. P(x+1)을 $x+\frac{7}{5}$ 로 나누었을 때의 몫은 5Q(x)이다.
- ① 7
- (2) L
- (3) 7,∟

- **④** ∟,⊏
- (5) 7,L,E

15. 복소수 $z = \frac{\sqrt{2}}{1+i}$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, $i = \sqrt{-1}$, \overline{z} 는 z의 켤레복소수이다.) [5.5점]

____ <보기> ___

$$\exists z + \overline{z} = -1$$

$$L. z\overline{z} = 1$$

$$\Box \cdot \frac{\overline{z}}{z^3} + \frac{(\overline{z})^2}{z^2} + \frac{(\overline{z})^3}{z} = -3$$

- (Ī) ¬
- 2) L
- (3) ⊏

- (4) 7,L
- (5) し,に


서답형

단답형 1. 다항식 $P(x) = x^3 - 2x^2 + ax + 4$ 가 x - 2로 나누어떨어질 때, 상수 a의 값을 구하시오. [3점]

단답형 2. 이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 의 그래프가 x축과 두 점 (-2,0), (3,0)에서 만날 때, 상수 a,b에 대하여 ab의 값을 구하 시오. [3점]

단답형 3. 등식 $z(3+i)+\overline{z}(1-i)=4i$ 를 만족하는 복소수 z를 구하시오. (단, \overline{z} 는 z의 켤레복소수이다.) [4점]

서술형 1. 아래 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 x + a, y + a 인 정사각형 모양의 패치워크 A, B가 있다. 색칠된 부분 C는 가로, 세로의 길이가 각각 x, y인 직사각형 모양으로 두 패치워크가 겹치는 부분이다. C를 제외한 두 패치워크 A, B의 넓이의 차를 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, x > y이다.) [6점]



서술형 2. 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 3 + i일 때, **서술형 3.** O(0,0), A(2,0), B(a,2a)를 세 꼭짓점으로 하고 선 2a, a + b를 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 구 하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, *a*, *b*는 실수이다.) [7점]

분 OA를 밑변으로 하는 등변사다리꼴의 넓이의 최댓값을 구 하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, $0 < a \le \frac{3}{4}$ 인 실수이다.) [7 점]