

고혈압 약, 미루지 말아야 하는 이유

혈압약은 혈압 숫자가 아니라 혈압이 만드는 합병증(뇌·심장·신장·눈·대혈관)을 막기 위해 먹습니다. 운동·식이·체중관리는 약과 함께 가는 동반자입니다.

왜 지금 시작해야 하나요? (Key Numbers)

치료 안 한 고혈압 · 뇌졸중 위험

2~3배

정상혈압 대비

위 혈압 10 낮추면 · 심혈관 사건

약 20%↓

수축기 10mmHg · 여러 연구 종합

위 혈압 10 낮추면 · 뇌졸중

약 27%↓

같은 분석 · 심부전은 약 28%↓

✦ 혈압을 방치하면 — 증상 없이 진행되는 5대 합병증



뇌 · 눈 · 심장 · 콩팥 · 대혈관

합병증	어떻게 진행하나요
🧠 뇌졸중 · 혈관성 치매	갑자기 마비·언어장애·의식소실 — 고혈압이 가장 큰 위험인자
👁️ 고혈압성 망막병증	시야 흐림·출혈 — 본인은 못 느끼고 안저검사로 발견
💓 심근경색 · 심부전	흉통·호흡곤란 — 심장 벽이 두꺼워지고 굳음
💧 만성콩팥병 · 투석	단백뇨·기능 저하 → 투석 (당뇨와 함께 양대 원인)
대동맥 박리 · 동맥류	혈관 벽이 찢어지는 응급 — 갑작스러운 가슴·등 통증

❓ 흔한 오해 vs 바로 알기

자주 듣는 오해	바로 알기
"지금 증상 없으니 괜찮다"	합병증은 증상 없이 진행합니다.
"운동·영양제로 잡을 수 있다"	140/90 이상이 계속되면 생활관리만으로는 부족한 경우가 많습니다.
"평생 먹어야 하니 늦게 시작하겠다"	미룬 기간만큼 혈관 손상이 쌓입니다. 용량은 진료에서 함께 조정합니다.
"약이 신장·간에 부담을 준다"	오히려 신장을 보호 합니다. 치료하지 않는 쪽이 더 위험합니다.

🗣️ 근거 있는 접근 · FACT

1. 약이 필요하다고 판단되면 **미루지 않고 생활관리와 함께** — 위험이 낮은 1기 고혈압은 생활관리를 먼저 해 보기도 합니다
2. 가정혈압 매일 측정 — 아침·자기 전 (재는 법: 「혈압, 이렇게 재야 정확합니다」)
3. 저염식 + 유산소 30분 + 체중 5kg 감량 — 약 효과 ↑
4. 3개월마다 정기 진료 — 약 조정 + 합병증 조기 발견

📅 약은 언제까지 먹나요? — 조정 로드맵

0~3개월 · 함께 시작	3~12개월 · 목표 유지 확인	1년 이상 · 유지하며 조정
약으로 혈압을 안정시키고 가정혈압 측정·식이·운동을 습관으로 만듭니다.	가정혈압 기준은 대부분 135/85 미만 . 당뇨·콩팥병·심뇌혈관질환이 있으면 담당 의사가 더 낮게 정합니다.	대부분 약을 이어 갑니다. 혈압이 충분히 낮게 유지되면 용량 조정을 의사와 상의합니다. 스스로 줄이거나 끊지 않습니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한고혈압학회 고혈압 진료지침 (2022) · 2023 ESH · 2025 AHA/ACC 고혈압 지침 · Ettehad 등, Lancet 2016 (혈압 강하 효과 메타분석)

함께 보기 — 이미 약을 드시는 분: 「혈압약, 먹었다 말았다 하면 안 되는 이유」

edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/htn-daily-adherence/

본 자료는 일반 안내이며 개인의 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.



복용 중 안내

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/htn-why-start/