

적게 먹되, 부실하게 먹지 않기

식욕이 줄어드는 것은 기회이지만, 무작정 굶으면 근육·수분·미량영양소가 같이 흔들립니다. 접시 구성을 단순하게 바꿉니다.

한 접시 공식은 단순할수록 오래 갑니다

단백질, 채소, 탄수화물을 모두 남기되 양과 순서를 조절합니다.

식욕이 줄었다고 한 종류만 먹으면 오래 못 갑니다. **단백질 먼저, 채소 충분히, 탄수화물은 작게**가 기본 공식입니다.

PROTEIN

매끼 단백질

달걀·생선·두부·살코기·콩류 중 하나를 먼저 듭니다.

VEG

채소와 섬유질

변비 예방과 포만감 안정에 도움이 됩니다.

CARB

탄수화물


밥·빵·면은 굵기보다 양을 줄이고 천천히 먹습니다.



균형 식판

배가 빨리 부를수록 먹는 순서가 중요합니다

식사량이 줄 때 영양 우선순위를 잘못 잡으면 피로와 근손실이 생길 수 있습니다.



식사 순서

처음 5분은 단백질과 채소에 씁니다. 그 뒤 밥을 천천히 먹으면 포만감이 올라와도 필요한 영양을 먼저 확보할 수 있습니다.

FIRST

첫 입

국물보다 단백질을 먼저 먹습니다.

PACE

속도

한 숟가락 내려놓기, 15-20분 식사 시간을 목표로 합니다.

STOP

멈춤 기준

배가 불편해지기 전, 70-80% 포만감에서 멈춥니다.

굶기와 튀김은 서로 다른 방식으로 치료를 방해합니다

굶으면 근육이 빠지고, 기름진 식사는 오심·역류를 키울 수 있습니다.

GLP-1 치료 중 위 배출이 느려질 수 있어 기름진 음식, 과식, 야식은 더 오래 불편할 수 있습니다. 반대로 굶기는 요요와 근손실을 부릅니다.

AVOID

줄이기

튀김, 크림소스, 과식, 야식, 빠른 식사.

DO NOT


굶기 금지

하루 한 끼만 먹는 방식은 근육과 담낭 건강에 불리할 수 있습니다.

SMART

대체

죽·수프만 오래 먹기보다 단백질을 작게라도 포함합니다.



위장 부담 줄이기

외식은 실패가 아니라 설계가 필요한 상황입니다

약 때문에 많이 못 먹는 날일수록 무엇을 남길지보다 무엇을 먼저 먹을지 정합니다.



외식 전략

회식·외식에서는 처음부터 절반만 덜어두고 단백질과 채소를 먼저 먹습니다. 남기는 연습도 치료 기술입니다.

ORDER

주문

구이·찜·국물 적은 메뉴를 우선합니다.

PLATE

덜어먹기

처음부터 작은 접시에 나눠 담아 속도를 낮춥니다.

DRINK

음주 주의

술은 탈수, 저혈당, 과식, 위장 증상을 모두 키울 수 있습니다.

이번 회차는 접시를 바꾸기

이번 주는 칼로리 계산보다 식사 순서와 접시 구성을 먼저 잡습니다.

01 식욕 감소는 기회지만, **영양 결핍**이 되면 안 됩니다.

03 굵기와 기름진 과식은 모두 피해야 합니다.

02 단백질을 먼저 먹고 탄수화물은 작게 남깁니다.

04 외식은 양보다 순서와 속도를 설계합니다.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요