

아이가 자꾸 배가 아파요 검사는 정상인데, 왜 그럴까요?

소아 기능성 복통·과민성 장 증후군 (FAP · IBS)과 가정용 가이드 최면치료 — 약 없이 더 빨리
편안해지는 근거 기반 접근

대부분의 아이는 1년 안에 좋아집니다

검사에서 이상이 없는 반복성 복통은 위험한 병이 아니며, 시간이 지나며 대다수가 호전됩니다

79.5%

1년 뒤 복통이 "적절히 호전"된 아이의 비율 — 치료를 받든 안 받든 대다수가 좋아집니다. (두 치료군의 정확한 비교는 뒤에서 다룹니다)

WHY REASSURANCE COMES FIRST


소아 기능성 복통(FAP)과 과민성 장 증후군(IRS)은 혈액검사·내시경에서 이상이 보이지 않지만 반복되는 복통을 일으키는 흔한 상태입니다. 장이 망가진 것이 아니라 뇌와 장을 잇는 신경망(뇌-장 축)이 예민해진 것으로, *암이나 염증성 장 질환(IRD)으로 진행하지 않습니다*. 다만 통증이 반복되면 아이의 불안·수면·학교생활이 힘들 수 있어, 잘 이해하고 관리하는 것이 중요합니다.

기능성 복통과 IBS — 뇌-장 축의 문제입니다

검사에 나오지 않는 '진짜' 통증 (Disorders of Gut-Brain Interaction)

장의 신경이 예민해지면, 정상적인 장 운동이나 가스도 뇌에서 **심한 통증**으로 느껴집니다. 이것을 '장이 예민해진 상태(내장 과민성)'라고 합니다.

"예민한 성격"이나 "괴병" 때문이 아니라 의학적으로 입증된 뇌-장 신경의 반응 변화이며, 부모의 잘못도 아닙니다. 스트레스·긴장·불규칙한 생활·수면 부족이 통증을 더 자주, 더 세게 만드는 '방아쇠'가 될 수 있습니다. 그래서 장 자체를 고치기보다 뇌-장 축의 과민 반응을 가라앉히는 접근이 더 효과적입니다.



반복되는 복통이 아이에게 남기는 것들

통증 그 자체보다, 아이의 일상과 마음에 미치는 영향이 더 클 수 있습니다

BURDEN · 01

불안 (Anxiety)

"또 아프면 어쩌지" 걱정하며 예민해지고, 배가 아플 만한 상황을 피하려 합니다. 불안은 다시 통증을 키우는 악순환을 만듭니다.

BURDEN · 02

우울감 (Low mood)

하고 싶은 활동을 못 하며 위축되고 기분이 가라앉기 쉽습니다. 통증과 기분은 서로 영향을 주고받습니다.

BURDEN · 03

학교 결석 (School absence)

복통으로 등교를 못 하거나 조퇴가 잦아지면 학습과 교우관계에 영향을 주고, 결석 자체가 불안을 더 키웁니다.

BURDEN · 04

삶의 질 저하 (Reduced QoL)

놀이·식사·여행 등 또래가 누리는 일상 활동이 제한되어, 아이의 전반적인 삶의 질이 떨어집니다.

BURDEN · 05

수면 문제 (Sleep)

잠들기 어렵거나 자다 깨는 일이 늘면 피로가 쌓이고, 피로는 다시 통증에 더 민감하게 만듭니다.

BURDEN · 06

가족의 걱정 (Family burden)

부모의 불안과 잦은 병원 방문·반복 검사가 아이에게도 전해져, 온 가족이 함께 지칩니다.

장-지향 최면요법 — 마술이 아닙니다

앞의 부담을 약 없이 줄이는 한 가지 방법 — 편안한 상태에서 뇌-장의 과민 신호를 가라앉히는 장-지향 최면요법입니다

아이를 깊이 이완시킨 뒤, **편안한 장(腸)**을 떠올리는
심상과 부드러운 암시로 뇌가 장의 신호를 덜 위협적으로
해석하도록 훈련합니다.

최면요법은 의식을 잃거나 조종당하는 것이 아니라, 집중된 이완 상태에서 스스로 몸의 감각을
다스리는 법을 배우는 과정입니다. 전문 병원의 장-지향 최면요법은 소아 IBS·기능성 복통에서
근거가 비교적 확립돼 있고, 이 연구는 그것을 집에서 웹으로 옮긴 시도입니다 (장기 효과는
아직 검증 중).

작용점

뇌-장 축

약물

불필요

안전성

부작용 낮음



이 근거는 어디서 왔나요? — 연구 한눈에

네덜란드 1차의료(동네 병원)에서 진행된 실용적 무작위 대조 연구 (pragmatic RCT)

PARTICIPANTS · 대상

7-17세 소아 152명

동네 병원 의사(GP)가 진단한 기능성 복통(FAP) 또는 과민성 장 증후군(IRS) 소아·청소년을 대상으로 했습니다. 전문 병원이 아닌 1차의료 현장에서 모집했다는 점이 특징입니다.

INTERVENTION · 중재

가정용 웹 최면치료 3개월

개입군은 웹사이트로 집에서 하는 가이드 최면치료를 3개월간 받고, 여기에 통상치료(care as usual)를 더했습니다. 병원을 자주 오갈 필요 없이 집에서 진행합니다.

COMPARISON · 비교

통상치료만 (대조군)

대조군은 최면치료 없이 평소대로의 통상치료(생활 조언, 필요 시 약물 등)만 받았습니다. 두 군을 무작위로 배정해 공정하게 비교했습니다.

OUTCOME · 결과·추적

12개월 '적절한 완화'

복통·불편감이 적절히 완화되었는지를 12개월간 추적하며 3·6·12개월 시점에 비교했습니다. 실제 진료와 가깝게 설계한 실용적(pragmatic) 연구입니다.

최면치료를 더하면 '더 빨리' 편안해집니다

막대가 높을수록 그 시점에 최면치료를 더한 아이들이 더 많이 편안해졌다는 뜻입니다 (통계값 aOR·신뢰구간은 막대 아래 표기)



읽는 법

막대가 높을수록, 그 시점에 최면치료를 더한 아이들이 **'적절한 완화'에 이른 비율**이 더 높았다는 뜻입니다. 숫자(오즈비)는 효과 크기를 나타내는 통계값이며 '몇 배 더 잘 낫는다'는 의미는 아닙니다.

핵심 메시지

3·6개월엔 더 일찍 편안해졌지만, **이 연구의 주요(1차) 평가 시점인 12개월에는 두 군 차이가 확인되지 않았습니다** — 둘 다 좋아집니다. 강점은 회복을 앞당기는 데 있습니다.

* 이 연구는 통상의 95%보다 다소 느슨한 **90%** 신뢰구간을 사용했습니다.

1년 뒤엔 양쪽 모두 좋아집니다 — 그래서 안심입니다

12개월 '적절한 완화' 비율은 두 군 모두 높았고, 통계적 차이는 없었습니다 (자연 호전으로 수렴)

최면치료 추가군 58 / 73명

79.5%



통상치료군 52 / 70명

74.3%



해석 12개월에는 두 군의 차이가 통계적으로 뚜렷하지 않았습니다 — 장기적으로는 대부분 자연히 좋아집니다. 최면치료의 가치는 그 과정을 앞당기고, 아래 증상들을 더 편하게 하는 데 있습니다.



복통 강도
덜 아파요



복통 빈도
덜 자주



통증의 위협감
덜 무섭게




더 빨리 잠들
수면 개선

우리 아이에게 어떻게 적용할까요?

앞서 본 근거를 우리 아이에게는 어떻게? — 경고 신호(10페이지)가 없다면, 검사·약물에 앞서 단계적으로 시도합니다

- 1 **안심과 이해**
의사가 기질적 원인을 배제해 '기능성'으로 확인한 뒤, 위험한 병이 아님을 함께 이해하고 통증 일기로 방아쇠를 관찰합니다.
- 2 **생활 리듬**
규칙적 식사·수면과 등교 유지가 기본입니다. 통증에 온 가족이 과도하게 반응하지 않는 것도 중요합니다.
- 3 **가이드 최면·이완**
매일 정한 시간에 편안한 장소에서 이완·심상 훈련(오디오 가이드)을 약 3개월간 꾸준히 이어갑니다.
- 4 **안 나아지면? 진료실 연계**
몇 달 해도 나아지지 않거나 경고 증상이 있으면 의사와 상의해 약물·전문 치료로 조정합니다.



안내 연구의 웹 프로그램은 네덜란드어라 그대로 쓰긴 어렵지만 원리는 같습니다. 원내에서 한국어 이완·최면 자료와 방법을 함께 정해 드립니다.

이런 신호가 있으면, 최면치료보다 검사가 먼저입니다

아래 중 하나라도 있으면 기능성으로 단정하지 말고 반드시 추가 평가가 필요합니다



체중 감소 · 성장 지연

다이어트 없이 빠지는 체중, 키·몸무게 성장 곡선의 이탈은 기질적 원인 평가와 정밀 검사가 필요합니다.



혈변 · 야간 통증 · 반복 발열

대변에 피가 섞이거나, 잠을 깨우는 야간 통증·야간 설사, 반복되는 발열은 기능성 복통에서는 드문 경고 신호입니다.



가족력 · 삼킴곤란 · 지속 구토

염증성 장 질환(IBD)·셀리악병 가족력, 삼키기 힘들, 반복되는 구토는 기질적 질환을 시사하므로 검사를 우선합니다.

오늘 꼭 기억할 7가지

소아 기능성 복통·IBS는 이해와 단계적 관리로 충분히 좋아집니다

01 아이 앞에서 걱정을 드러내기보다 **"괜찮아질 거야"**라고 안심시켜 주세요

02 기능성 복통·IBS는 **뇌-장 축의 문제** — 궤병도, 부모 잘못도 아닙니다

03 **통증 일기**로 스트레스·식사·수면 등 방아쇠를 함께 찾아봅니다

04 **규칙적 생활과 등교 유지**가 회복의 기본입니다

05 가이드 최면·이완을 **매일 정한 시간에** 꾸준히 — 치료 초반 몇 달에 특히 도움이 됩니다

06 시간이 지나면 대부분 좋아지니 **조급해하지 말고** 3개월은 꾸준히 이어가세요

07 **체중감소·혈변·성장지연** 등 경고 증상은 즉시 진료·검사로 확인합니다

대부분 좋아집니다 — 최면치료가 더 빨리 편하게 해줄 수 있습니다

안심과 이해에서 시작해, 아이에게 맞는 비약물 관리를 함께 찾아가겠습니다 — 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요